

Операции с множества:

$$A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$$

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C, A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

Експеримент, възможни изходи - елементарни събития (пространство S), събития ($A \subseteq S$), вероятност.

Пример: Хвърляне на два зара. Какви са възможните изходи? Как се дефинира вероятност върху тях?

Свойства на вероятността:

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

$$P(S) = 1$$

$$P(\emptyset) = 0$$

$$A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

$$A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i A_j) + \sum_{i < j < k} P(A_i A_j A_k) + \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \dots A_n)$$

Пример: Секретарка напечатва n писма и n плика. В бързината тя поставя случайно във всеки плик по едно писмо. Каква е вероятността поне едно писмо да е в правилния плик? Отг.: $\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 - \frac{1}{e}$.

Условна вероятност:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

Пример: При хвърляне на два зара сумата от точките е нечетна. Каква е вероятността тя да е по-малка от 8? *Отг.: 2/3.*

Пример: В кош има r червени и b сини топки. Каква е вероятността да изтеглим последователно червена, синя, синя, червена топка? *Отг.: $\frac{r}{r+b} \frac{b}{r+b-1} \frac{b-1}{r+b-2} \frac{r-1}{r+b-3}$.*

Независимост: ако $P(A|B) = P(A)$ то A и B са независими и $P(A)P(B) = P(AB)$.

Пример: Стените на четиристенен зар са оцветени - едната в червено, втората в синьо и третата в зелено, а четвъртата е оцветена и с трите цвята. Независими ли са събитията да се падне всеки от цветовете? *Отг.: независими две по две и зависими в съвкупност.*

Пълна вероятност: ако B_1, B_2, \dots, B_n е разбиване на S , т.е. $B_i \cap B_j = \emptyset$ за всяко i, j и $B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = S$, то

$$P(A) = \sum_{k=1}^n P(AB_k) = \sum_{k=1}^n P(A|B_k)P(B_k)$$

Пример: В една кутия има 60 дълги пирона и 40 къси, а в друга - 10 дълги и 15 къси. Каква е вероятността случайно избран пирон от случайно избрана кутия да е къс? *Отг.: 1/2.*

Формула на Бейс:

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_iA)}{P(A)} = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{k=1}^n P(A|B_k)P(B_k)}$$

Пример: Медицински тест е 90% сигурен (т.е. вероятността да е позитивен, при условие че наистина има заболяване е 0.9, а вероятността да е позитивен, при условие, че няма заболяване е 0.1). Вероятността даден човек да е болен е 1 на 10 000. Ако тестът е позитивен, каква е вероятността човекът наистина да е болен? *Отг.: 0.0009*

ЗАДАЧИ:

- Нека разпределението на видовете кръвни групи е следното: A - 41%, B - 9%, AB - 4%, O - 46%. Каква е вероятността кръвта на случайно избран човек да съдържа антиген A? А да съдържа антиген B? А да съдържа антиген нито A, нито B? Проучване показва, че 39% от гените, определящи Rh фактора са отрицателни.

Всеки индивид наследява един ген от бащата и един ген от майката, като Rh факторът е отрицателен когато и двата наследени гена са отрицателни. Каква е вероятността случайно избран човек да има отрицателен резус фактор? Кръвната група и резус факторът са независими. Каква е вероятността човек да е от АВ- група? *Отг.: 45%; 13%; 46%; 0, 39²; 0, 39².0, 04.*

2. Космически кораб има два двигателя, които работят паралелно. Ако главния двигател има сигурност 95%, резервния - 80%, а за цялата система сигурността е 99%, каква е вероятността и двата двигателя да работят едновременно? Вярно ли е, че $P[\text{резервният двигател работи}] = P[\text{резервният работи} \mid \text{главният не работи}]$? Независими ли са събитията A_1 : „резервният двигател работи“ и A_1 : „главният двигател изключва“? *Отг.: 0, 76; да.*
3. Генератор на случаини числа работи по следния начин: за да се симулира генерирането на двуцифрен число, генераторът се активира два пъти за всяка от цифрите, като теоретично всяка цифра има еднаква вероятност да бъде избрана. Колко такива случаини двуцифрени числа са възможни? Колко от тях започват с 2? Колко завършват на 9? Колко започват с 2 и завършват на 9? Каква е вероятността такова число да завърши на 9, при условие, че започва с 2? *Отг.: 100; 10; 10; 1; 1/10.*
4. Проведен е следният експеримент за изследване на паметта: показва се запис на кола, която се движжи по междуградски път. На записа няма склад. След това на человека, който е гледал записа се задават поредица въпроси. Половината от хората са запитани „Колко бързо се движеше колата, когато мина покрай склада?“. На другата половина този въпрос не е зададен. По-късно всеки е попитан „Имаше ли склад във филма?“. От тези, на които е бил зададен и първия въпрос, 17% отговарят с „да“, само 3% от останалите отговарят с „да“. Каква е вероятността случайно избран участник в експеримента да отговори положително? Такъв отговор независим ли е от задаването на първия въпрос? *Отг.: 1/10; не.*
5. Вероятността дадена банка кръв да е дарена от платен донор е 0.67. Ако донорът е бил платен, вероятността да е заразена с хепатит е

0.0144, а ако не е платен - 0.0012. Каква е вероятността случайно избрана банка да е заразена с хепатит? *Отг.:* $0,0094 \approx 0.01$.

6. Докажете, че невъзможното събитие е независимо от всяко друго събитие.
7. Докажете, че ако A_1 и A_2 са независими, то и A_1 и A_2^c са независими. Също и за A_1^c и A_2^c .
8. Докажете, че ако две събития (с ненулева вероятност) са взаимно изключващи се, то те не са независими, както и обратното.
9. Половината от произвежданите компютърни чипове са дефектни. Проверка на легалния пазар на чипове показва че дефектните са 5%. За съжаление преди да стигнат до пазара част от чиповете се крадат (и се продават нелегално). Ако 1% от чиповете се крадат, намерете вероятността да бъде откраднат чип, ако той е дефектен. *Отг.:* $0,09$.
10. Дадено електронно съобщение се кодира с таен криптиращ ключ преди да бъде изпратено, но ключът може да бъде „откраднат“. Нека 95% от получените съобщения са автентични. 0.1% от неавтентичните съобщения са криптирани с правилния ключ и всички автентични съобщения са кодирани с правилния ключ. Намерете вероятността едно съобщение да е автентично, при условие, че е използван правилния ключ. *Отг.:* $0,9995$.
11. Три двуцифрени числа се генерираят случайно, като вероятността за всяка от стойностите 00, 01, ..., 99 е една и съща. Каква е вероятността такова число да е по-малко от 50? Каква е вероятността всяко от трите числа да е по-малко от 50? *Отг.:* $1/2; 1/8$.
12. В компютърен център има три принтера A, Б и В, които работят с различна скорост. Заявките за печат се изпращат към първия свободен принтер. Вероятността заявка да бъде изпратена към A, Б или В са съответно 0.6, 0.3 и 0.1. Вероятността за всеки от принтерите да се „задави“ и да провали печатането е съответно 0.01, 0.05 и 0.04 съответно. Ако печатането на даден документ се прекрати, каква е вероятността това да е по вина на всеки от трите принтера? *Отг.:* $0.24; 0.6; 0.16$.

13. Намерете $C_1 \cup C_2$ и $C_1 \cap C_2$ ако $C_1 = \{(x, y) : 0 < x < 2, 1 < y < 2\}$, $C_2 = \{(x, y) : 1 < x < 3, 1 < y < 3\}$. Отг.: $\{(x, y) : 1 < x < 2, 1 < y < 2\}$.
14. Намерете допълнението на C спрямо \mathcal{C} , ако $\mathcal{C} = \{(x, y) : |x| + |y| \leq 2\}$, $C = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 2\}$. Отг.: начертайте графиките.
15. Ако C_1, C_2, C_3, \dots са множества, такива че $C_k \subset C_{k+1}, k = 1, 2, 3, \dots$, $\lim_{k \rightarrow \infty} C_k$ се дефинира като обединението $C_1 \cup C_2 \cup C_3 \cup \dots$. Намерете $\lim_{k \rightarrow \infty} C_k$ ако $C_k = \{x : 1/k \leq x \leq 3 - 1/k\}, k = 1, 2, 3, \dots$. Отг.: $\{x : 0 < x < 3\}$.
16. Ако C_1, C_2, C_3, \dots са множества, такива че $C_k \supset C_{k+1}, k = 1, 2, 3, \dots$, $\lim_{k \rightarrow \infty} C_k$ се дефинира като сечението $C_1 \cap C_2 \cap C_3 \cap \dots$. Намерете $\lim_{k \rightarrow \infty} C_k$ ако $C_k = \{x : 2 - 1/k < x \leq 2\}$ и $\lim_{k \rightarrow \infty} C_k$ ако $C_k = \{x : 2 < x \leq 2 + 1/k\}, k = 1, 2, 3, \dots$. Отг.: $\{x = 2\}; \emptyset$.
17. Картите от две тестета се обръщат едновременно една по една. Казваме, че имаме пълно съвпадение, ако едновременно обрънатите карти от двете тестета са идентични. Нека p_M е вероятността да имаме поне едно пълно съвпадение. Покажете, че $p_M = 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} + \dots - \frac{1}{52!}$. Покажете, че p_M е приблизително равно на $1 - e^{-1} = 0.632$.
18. Пресметнете вероятността от едно тесте да бъде изтеглена ръка от 13 карти, състояща се от (а) 6 пики, 4 купи, 2 кари и 1 спация; (б) 13 карти от една боя. Каква е вероятността да има поне три попа, при условие, че ръката съдържа поне два? Отг.: $\binom{13}{6} \binom{13}{4} \binom{13}{2} \binom{13}{1} / \binom{52}{13}; 4 / \binom{52}{13}; 11 / 37$.
19. В кутия с 50 електрически крушки има 2 дефектни. Инспектор по контрол на качеството преглежда 5 крушки, които се избират случайно и без връщане. Намерете вероятността поне една от дефектните крушки да е сред петте. Колко крушки трябва да бъдат прегледани, така че тази вероятност да премине $1/2$? Отг.: 14.
20. Провеждаме експеримент да изберем случайно едно реално число от интервала $(0, 1)$. За всеки подинтервал $(a, b) \subset (0, 1)$ смислено изглежда да определим вероятността $P[(a, b)] = b - a$, т.е. вероятността избраното число да е от даден подинтервал е пропорционална на

дължината на подинтервала. Изберете подходяща редица от подинтервали, така че да покажете, че за всяко $a \in (0, 1)$, $P[(a)] = 0$. Отг.:
 $C_n = \{x : a - 1/n < x \leq a\}$.

21. Двойка зарове се хвърлят докато се падне седем или осем. Докажете, че вероятността да се падне седем преди осем е $6/11$. Ако заровете се хвърлят докато се паднат две седмици или шест и осем поне по веднъж, докажете, че вероятността да се падне шест и осем преди седмиците е 0.546.
22. Урна съдържа три червени (Ч) и седем бели (Б) топки с еднакви размери и тегло. Ако избираме последователно и с връщане като събитията „бяла топка на n-ти път“ се считат за независими, какви са вероятностите за избор на следните последователности от четири опита: (а) ББЧБ, (б) ЧБББ, (в) БББЧ, (г) БЧББ. Каква е вероятността за точно една червена топка от четири опита? Отг.: $4(0.7)^3(0.3)$.
23. Теглят се карти от обикновено тесте с връщане до изтеглянето на пика. Каква е вероятността да са необходими поне 4 тегления? Ако се теглят без връщане? Отг.: 0,42; 0,41.
24. Човек отговаря на всеки от два въпроса с по четири възможни отговора като избира случайно. Каква е вероятността и двата отговора да са верни, при условие че единият е верен. Отг.: 1/7.
25. Зар се хвърля шест пъти. Имаме съвпадение, ако на i-тия път се пада i. Каква е вероятността за поне едно съвпадение? Каква е вероятността за n-стенен зар, който се хвърля n пъти при $n \rightarrow \infty$. Отг.: $1 - (5/6)^6$; $1 - e^{-1}$.
26. А хвърля зар и печели при падането на 6. Ако той не спечели, Б хвърля и печели, ако се падне 5 или 6. След това А печели на 4, 5 или 6 и т.н. Каква е вероятността за всеки играч да спечели? Отг.: 0.52; 0.48.
27. Нека C_1, C_2, C_3 са независими събития с вероятности съответно $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$. Колко е $P(C_1 \cup C_2 \cup C_3)$? Отг.: 3/4.
28. Всяко чувалче в един сандък съдържа по 25 луковици на лалета. Знае се, че 60% от чувалчетата съдържат по 5 луковици за червени

и 20 за жълти лалета, а останалите по 15 за червени и 10 за жълти. Случайно се избира едно чувалче и от него една луковица. Каква е вероятността тя да е за жълто лале? При условие, че лалето е жълто, каква е вероятността да е взета от първия вид чувалчета?

Отг.: 16/25; 3/4.

29. Играч залага 1 лев срещу b лева за това, че може да изтегли две карти от едно тесте и те да са от една боя. Намерете b , така че залогът да е справедлив? *Отг.: 13/4.*
30. Приблизително една трета от всички близнаци са еднояйчни, а две трети са двояйчни. Еднояйчните близнаци винаги са от един пол като вероятността за мъжки и женски пол е еднаква, а при двояйчните една четвърт са момичета, една четвърт са момчета и половината са смесени. Сред всички раждания близнациите са едно на 90. Определете следните събития: A = „раждат се двойка близнаци момичета“, B = „раждат се еднояйчни близнаци“, C = „раждат се близнаци“. Кое е събитието $A \cap B \cap C$? Намерете $P(A \cap B \cap C)$. *Отг.: 1/540.*
31. Две монети се хвърлят едновременно и независимо една от друга, като вероятността за „ези“ на първата е u , а на втората е w . Определете $p_0 = P(0 \text{ „ези“})$, $p_1 = P(1 \text{ „ези“})$, $p_2 = P(2 \text{ „ези“})$. Може ли да изберем u и w , така че $p_0 = p_1 = p_2$? *Отг.: не.*
32. Ако $P(A) = 1/3$ и $P(B^c) = 1/4$, може ли A и B да са несъвместими? *Отг.: не.*
33. В шкафа има n чифта чорапи. Ако $2r$ чорапа са избрани случайно, каква е вероятността между тях да няма нито един чифт? *Отг.: $\binom{n}{2r} 2^{2r} / \binom{2n}{2r}$.*
34. В лотария се теглят дните от годината (включително 29 февруари). Каква е вероятността първите 180 изтеглени дни да са разпределени поравно между месеците на годината? Каква е вероятността първите 30 изтеглени дни да не са от месец септември? *Отг.: 0, 167.10^{-8}; \binom{336}{30} / \binom{366}{30}.*
35. Двама души едновременно хвърлят монети n пъти. Каква е вероятността те да хвърлят равен брой „ези“? *Отг.: (\frac{1}{4})^n \binom{2n}{n}.*

36. Двама играчи A и B хвърлят монета последователно независимо един от друг, като първия, който хвърли „ези“ печели. Нека A хвърля пръв. Ако монетата е правилна, каква е вероятността да спечели A ? Ако вероятността за „ези“ е p , каква е вероятността A да спечели? Докажете, че за всяко p , вероятността A да спечели е по-голяма от $1/2$. Отг.: $2/3$; $\frac{p}{1-(1-p)^2}$.
37. Семейство има две деца. Поне едно от тях е момче. Каква е вероятността и двете да са момчета? Отг.: $1/3$.
38. Правилен зар се хвърля докато се падне 6. Каква е вероятността да са необходими повече от 5 хвърляния за това? Отг.: $(5/6)^5$.
39. Работодател наема един от N кандидати, като потенциала на всеки кандидат се оценява по скала от 1 до N . Изборът на кандидат се осъществява по следния начин: 1. Всеки кандидат се явява последователно и се решава дали той да бъде нает или не. 2. Ако са отхвърлени $m-1$ кандидата, работодателя може да наеме m -тия кандидат само ако той е по-добър от предишните. Ако е избран i -тия кандидат, каква е вероятността той да е най-добрый? Отг.: .
40. Двоично съобщение може да има грешка (инверсия) във всеки бит с вероятност $1/4$ от 0 в 1 и $1/3$ от 1 в 0. Пропорцията на из pratene 0-и и 1-и е $3 : 4$. Ако е получена 1, каква е вероятността да е била из pratena 1? Ако е получено съобщение 00, какво е разпределението на възможните из prateni съобщения? Отг.: .
41. Стандартизиран тест съдържа 20 въпроса, всеки с по 4 възможни отговора. Ако студент отговаря случајно и независимо на всички въпроси, каква е вероятността да е отговорил правилно на поне 10 въпроса? Отг.: .
42. На опашка за билети с цена 10 лева са наредени $m + n$ души, от които m имат в себе си банкноти по 10 лева и n имат банкноти по 20 лева. Намерете вероятността никой да не чака за ресто, ако в началото в касата няма пари? Отг.: $\frac{n-m+1}{n+1}$.