

**Е. Любенова П. Недевски К. Николов**  
**Л. Николова В. Попов**

**РЪКОВОДСТВО  
ПО МАТЕМАТИЧЕСКИ  
АНАЛИЗ**

**Първа част**



**София · 1991**

Ръководството съдържа задачи от първата част на математическия анализ: граници на редици, интеграл, редове и др. В началото на всяка глава са изложени необходимите теоретични сведения. Голяма част от задачите са решени, а за останалите са посочени отговорите им.

Изданието е предназначено главно за студентите от Факултета по математика и информатика при Софийския университет „Климент Охридски“, но може да се използва и от студенти от други факултети и висши учебни заведения, както и за самостоятелна работа.

## Съдържание

Предварителни сведения (глава 0)	7
§ 1. Основни свойства на числата	10
§ 2. Геометрична прогресия	11
§ 3. Математическа индукция	19
§ 4. Полиноми. Прицип за сравняване на коефициентите	23
§ 5. Нютонев бином	27
§ 6. Обратни кръгови функции. Полиноми на Чебишов	39
Глава 1. Числови редици	
§ 1. Основни свойства на числовите редици	51
§ 2. Монотонни числови редици	59
§ 3. Рекурентни редици	65
§ 4. Сходимост в смисъл на Чезаро. Теорема на Шолц	70
§ 5. Горна и долна точка на събиране	74
Глава 2. Граници и непрекъснатост на функции	
§ 1. Основни дефиниции и някои техни приложения	103
§ 2. Премагане на някоя граница	140
§ 3. Глобални свойства на непрекъснатите функции	160
Глава 3. Производни	
§ 1. Техника на диференцирането	172
§ 2. Повторно диференциране	185
§ 3. Геометричен смисъл и първи приложения на производната	191
§ 4. Диференциал	199
§ 5. Теорема на Ферма	203
§ 6. Теорема за средните стойности	213
§ 7. Основна теорема на интегралното смятане	220
§ 8. Монотонност и екстремуми	224
§ 9. Монотонност и неравенства	232
§ 10. Изпъкналост и неравенства	235
§ 11. Правилно на Лопитал	244
§ 12. Формула на Тейлор — Пеано	255
§ 13. Графики на функции	268
§ 14. Криви, зададени параметрично	274
§ 15. Криви, зададени в полярни координати	278
§ 16. Формула на Тейлор	3

© Елена Тодорова Любенова-Тонева  
Петър Спирidonov Неделски  
Красимир Иванов Николов  
Людмила Йорданова Николова  
Владимир Атанасов Попов

1991

с/о Jusaator, Sofia

# Предговор

§ 17. Изследване на стационарни точки с помощта на производни от по-висок ред . . . . .	289
§ 18. Задачи за числено пресмятане . . . . .	291
<b>Глава 4. Неопределен интеграл</b>	
§ 1. Неопосредствено интегриране . . . . .	295
§ 2. Интегриране чрез вписане под знака на диференциала . . . . .	298
§ 3. Интегриране по части . . . . .	311
§ 4. Интегриране чрез субституции . . . . .	323
§ 5. Интегриране на рационални функции . . . . .	331
§ 6. Интегриране на рационални функции на $x$ и на радикали от една и съща дробно-линейна функция на $x$ . . . . .	349
§ 7. Субституции на Ойлер . . . . .	351
§ 8. Интеграл от диференциален бинომ . . . . .	354
§ 9. Интегриране на трансцендентни функции . . . . .	357
§ 10. Общи задачи върху интегриране . . . . .	363
<b>Глава 5. Риманов определен интеграл</b>	
§ 1. Интегруемост. Изчисляване на определени интегрални чрез интегрални суми . . . . .	366
§ 2. Изчисляване на определени интегрални посредством неопределени . . . . .	375
§ 3. Смяна на променливите . . . . .	391
§ 4. Някои приложения на определените интегрални . . . . .	400
§ 5. Изчисляване на лица на равнинни фигури, дължини на равнинни дъги и обеми на тела посредством определени интегрални . . . . .	407
<b>Глава 6. Числови редове</b>	
§ 1. Числови редове. Прищипи за сравняване на редове с положителни членове . . . . .	413
§ 2. Критерии на Даламбер и Коши . . . . .	422
§ 3. Критерии на Гаабе — Дюамел и Гаус . . . . .	429
§ 4. Абсолютно и условно сходящи редове . . . . .	437
§ 5. Умножение на редове . . . . .	452
§ 6. Безкрайни произведения . . . . .	456
<b>Отговори</b>	
Глава 0. Предварителни сведения . . . . .	466
Глава 1. Числови редни . . . . .	466
Глава 2. Граници и непрекъснатост на функции . . . . .	467
Глава 3. Производни . . . . .	471
Глава 4. Неопределен интеграл . . . . .	489
Глава 5. Риманов определен интеграл . . . . .	497
Глава 6. Числови редове . . . . .	497
Литература . . . . .	499

Първата част на *Ръководството по математически анализ* съдържа задачи от граници на редици, граници и непрекъснатост на функции, производни, неопределени и определени интегрални редове и др. и е съобразена с програмите за студентите от първи курс на всички специалности във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Климент Охридски“. Същевременно ръководството е отражение на традициите, създадени в сектора по реален и функционален анализ под ръководството на проф. Ярослав Тагамлишки. Първият опит за систематизиране на материала, разглеждан на упражненията по диференциално и интегрално смятане, бяха циклостилните записки от 1970—1972 г. По-късно бе издаден известният *Сборник по диференциално и интегрално смятане* с автори Ив. Проданов, Н. Хадживанов и Ив. Чобанов.

Настоящото ръководство започва с уводна глава („Предварителни сведения“), която помага на читателите да преодолеят бариерата между средното и висшето образование. Във всяка глава накратко е изложен използваният теоретичен материал (без доказателства). При необходимост от допълнителни сведения могат да се използват учебниците по диференциално и интегрално смятане на Я. Тагамлишки и *Математически анализ* на Илин, Садовничи и Сендов. По-голямата част от задачите са подробно решени, а за останалите са дадени упътвания или отговори (в края на книгата).

Изложението е съвсем подробно и сборникът може да се използва от всички студенти, които изучават математически анализ или желаят да задълбочат знанията си в тази област, а също и за самостоятелна работа.

Задачите са подредени с двойна номерация — на първо място е поставен номерът на параграфа в съответната глава, а на второ — номерът на задачата в този параграф.



Изложеният материал е подбран и обсъждан от целия авторски колектив, а отделните глави са написани, както следва: нулевата и първата глава — от Е. Любенова, втората — от П. Недевски, третата — от Вл. Попов, четвъртата и петата — от Кр. Николов и шестата — от Л. Николова.

Авторите изказват благодарност на рецензентите и на редакторите, които допринесоха много за подобряването и окончателното оформяне на ръкописа.

Май 1989 г.

Авторите

## Предварителни сведения

### § 1. Основни свойства на числата

Ще предполагаме, че понятието реално число е известно. Множеството на реалните числа ще означаваме с  $\mathbf{R}$ . Ще припомним основните свойства на операциите събиране и умножение в  $\mathbf{R}$ :

- C 1. Комутативност на събирането:  $a + b = b + a$ .
- C 2. Асоциативност на събирането:  $a + (b + c) = (a + b) + c$ .
- C 3. Съществуване на нулев елемент (0):  $a + 0 = a$ .
- C 4. Съществуване на противоположен елемент  $(-a)$ :  $a + (-a) = 0$ .
- C 5. Комутативност на умножението:  $ab = ba$ .
- C 6. Асоциативност на умножението:  $a(bc) = (ab)c$ .
- C 7. Съществуване на единица (1):  $a \cdot 1 = a$ .
- C 8. Съществуване на обратен елемент  $(a^{-1})$  за всеки ненулев елемент  $a$ :

$$a^{-1} = \frac{1}{a}, \quad aa^{-1} = 1.$$

C 9. Дистрибутивен закон:  $a(b + c) = ab + ac$ .

Част от реалните числа наричаме положителни.

C 10. Нулата не е положително число.

C 11. Ако  $a \neq 0$ , то точно едно от числата  $a$  и  $(-a)$  е положително. Число, което не е положително, наричаме отрицателно.

C 12. Ако  $a$  и  $b$  са положителни, то  $a + b$  и  $a \cdot b$  също са положителни.

Ако  $a - b$  е положително число, казваме, че  $a$  е по-голямо от  $b$ , и означаваме  $a > b$ . Ако  $a - b$  е положително или нула, казваме, че  $a - b$  е неотрицателно, и записваме  $a \geq b$ .

Лесно се виждат следните свойства на неравенствата: ако  $a \geq b$ , то  $a + c \geq b + c$ ,  $c \in \mathbf{R}$ ; ако  $a \geq b$  и  $c \geq 0$ , то  $ac \geq bc$ ; ако  $a \geq b$  и  $b \geq c$ , то  $a \geq c$ , като последното неравенство е строго, ако поне едно от предишните две е строго ( $a > b$  наричаме строго неравенство, а  $a \geq b$  — нестрого).

По-голямото от числата  $a$  и  $(-a)$  се нарича модул или абсолютна стойност на  $a$  и се означава с  $|a|$ .

Множество от вида  $\{x \in \mathbf{R} : a < x < b\} = (a, b)$  наричаме отворен интервал, а  $\{x \in \mathbf{R} : a \leq x \leq b\} = [a, b]$  — затворен интервал или сегмент. Други отворени интервали са:

$$(a, +\infty) = \{x \in \mathbf{R} : x > a\}, \quad (-\infty, b) = \{x \in \mathbf{R} : x < b\}, \quad (-\infty, +\infty) = \mathbf{R}.$$

Всички отворени интервал, който съдържа  $x$ , наричаме околност на  $x$ . Интервалите



$$[a, b] = \{x \in \mathbf{R} : a \leq x \leq b\}, [a, b) = \{x \in \mathbf{R} : a \leq x < b\},$$

$$(-\infty, b] = \{x \in \mathbf{R} : x \leq b\}, [a, +\infty) = \{x \in \mathbf{R} : x \geq a\}$$

са подуотворени.

Важни подмножества на  $\mathbf{R}$  са:

$\mathbf{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$  — множеството на естествените числа;

$\mathbf{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$  — множеството на целите числа;

$\mathbf{Q}$  — множеството на рационалните числа  $q$ , т.е. числа  $r$ , за които съществуват

$$p, q \in \mathbf{Z} \text{ такива, че } \frac{p}{q} = r.$$

Очевидно  $\mathbf{N} \subset \mathbf{Z} \subset \mathbf{Q} \subset \mathbf{R}$ . Ако числото  $r \in \mathbf{R}$ , но  $r \notin \mathbf{Q}$ , то  $r$  се нарича ирационално.

Едно множество от числа  $M$  е ограничено отгоре, ако съществува такова число  $L$ , че  $x \leq L$  за всяко  $x \in M$ ;  $L$  наричаме горна граница на  $M$ . Аналогично  $M$  е ограничено отдолу, когато съществува такова число  $l$ , че  $l \leq x$  за всяко  $x \in M$ ;  $l$  наричаме долна граница на  $M$ . Множество  $M$  е ограничено, когато е ограничено както отгоре, така и отдолу.

Най-малката от горните граници се нарича точна горна граница. Най-голямата от долните граници се нарича точна долна граница.

**С 13** (принцип за непрекъснатост). Всяко непразно ограничено отгоре множество от реални числа  $M$  има точна горна граница, която се означава със  $\sup M$ .

Нека  $M$  е ограничено отдолу множество от реални числа. Като приложим **С 13** към множеството  $-M = \{-x \in M\}$ , получаваме, че  $M$  има точна долна граница, която ще означаваме с  $\inf M$ .

От **С 13** следва, че множеството  $\mathbf{N}$  на естествените числа не е ограничено отгоре (принцип на Архимед).

Ще докажем, че **С 13** не е в сила за множеството на рационалните числа. Нека  $M = \{x \in \mathbf{Q} : x^2 \leq 2\}$ . Числото  $\sqrt{2}$  е горна граница за  $M$ , следователно  $M$  е ограничено отгоре. Нека  $l$  е точната горна граница на  $M$  и да допуснем, че  $l \in \mathbf{Q}$ . Ясно е, че  $l > 1$ . Ще докажем, че  $l^2 < 2$  е невъзможно. И наистина, тогава

$$m = \frac{2+2l}{2+l} \in \mathbf{Q}. \text{ Да разгледаме}$$

$$2 - \left(\frac{2+2l}{2+l}\right)^2 = \frac{2(2+l)^2 - (2+2l)^2}{(2+l)^2} = \frac{2(2-l)^2}{(2+l)^2} > 0.$$

Следователно  $m^2 < 2$  и  $m \in M$ . Но  $m - l = \frac{2-l}{2+l} > 0$ , т.е.  $m > l$ , което показва,

че  $l$  не може да бъде горна граница на  $M$ . Сега да допуснем, че  $l^2 > 2$ . Да разгледаме пак числото  $m = \frac{2+2l}{2+l}$ . Разликата  $m - l = \frac{2-l}{2+l} < 0$ , или  $m < l$ .

Ще докажем, че  $m$  също е горна граница на  $M$ . Нека  $x \in M$  и  $x > 0$ . Разглеждаме

$$m - x = \frac{2+2l}{2+l} - x = \frac{2+2l}{2+l} - \frac{2+2x}{2+x} + \frac{2+2x}{2+x} - x$$


$$= \frac{2(l-x)}{(2+l)(2+x)} + \frac{2-x^2}{2+x} \geq 0.$$

т.е.  $l$  не може да бъде точната горна граница на  $M$ . От полученото противоречие следва, че  $l^2 = 2$ . Но рационално число, чийто квадрат е равен на 2, не съществува. Да допуснем обратното, т.е. че съществуват  $p, q \in \mathbf{Z}$ , които ще предположим взаимно прости:  $\frac{p}{q} = l$ ,  $\frac{p^2}{q^2} = 2$ ,  $p^2 = 2q^2$ .

Следователно  $p$  е четно и  $p = 2p_1$ . Тогава  $4p_1^2 = 2q^2$ ,  $2p_1^2 = q^2$ , а отгук и  $q$  е четно, което противоречи на предположението, че  $p$  и  $q$  са взаимно прости.

Понякога вместо за числа ще говорим за точки, като нямаме предвид разположението на реалните числа върху числовата права, но щекакви други свойства на реалните числа освен произтичащите от **С 1—С 13** няма да използваме.

Както знаем, уравнението  $x^2 = -1$  не се удовлетворява за никое  $x \in \mathbf{R}$ . За да се избегне този недостатък, към  $\mathbf{R}$  се добавя имагинерната единица  $i = \sqrt{-1}$ , за която  $i^2 = -1$ . Така се получава множеството на комплексните числа  $\mathbf{C}$ , което съдържа  $\mathbf{R}$  като подмножество. Ако  $z \in \mathbf{C}$ , то  $z = a + ib$ , като  $a, b \in \mathbf{R}$  и  $a$  се нарича реална част на  $z$ , а  $b$  — имагинерна част на  $z$ . Множество  $\mathbf{C}$  се отъждествява с точките на една равнина (фиг. 1). Абсцисната ос се нарича още



Фиг. 1

реална права и съпада с  $\mathbf{R}$ , съответно ординатната ос — имагинерна права. Началото на координатната система съпада с комплексното число  $z = 0$ .

Абсолютна стойност или модул на  $z$  се нарича числото  $\sqrt{a^2 + b^2}$  и се означава както при реалните числа с  $|z|$ . От фиг. 1 се вижда, че

$$a = |z| \cos \varphi, \quad b = |z| \sin \varphi, \quad z = |z| (\cos \varphi + i \sin \varphi).$$

Нека  $z = a + ib$  и  $u = c + id$ . Сума и произведение на  $z$  и  $u$  се определят съответно така:

$$z + u = (a + c) + i(b + d),$$

$$zu = (ac - bd) + i(ad + bc).$$

Комплексното число  $\bar{z} = a + i(-b)$  се нарича комплексно спрягнатото на  $z$ .

1.1. Нека  $z \neq 0$ . Докажете, че  $\frac{1}{\bar{z}} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$ .

1.2. Проверете, че свойствата С 1—С 9 са в сила за комплексните числа.

1.3. Проверете, че  $z_1 + z_2 = z_1 + z_2$  и  $z_1 z_2 = z_1 z_2$ .

1.4. Нека  $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$  и  $u = \rho(\cos \psi + i \sin \psi)$ . Докажете, че  $zu = r\rho(\cos(\varphi + \psi) + i \sin(\varphi + \psi))$ .

1.5. Докажете, че  $|zu| = |z| \cdot |u|$ ,  $z, u \in \mathbb{C}$ .

1.6. Докажете неравенството на триъгълника:

$$|z + u| \leq |z| + |u|, \quad z, u \in \mathbb{C}.$$

1.7. Докажете, че  $|z + u| \geq |z| - |u|$ ,  $z, u \in \mathbb{C}$ .

1.8. Нека  $x, a \in \mathbb{R}$  и  $\varepsilon > 0$ . Докажете, че неравенството  $|x - a| < \varepsilon$  е еквивалентно на неравенствата

$$a - \varepsilon < x < a + \varepsilon.$$

1.9. Докажете, че ако  $M$  е ограничено подмножество на  $\mathbb{R}$ , съществува константа  $k$  такава, че  $|x| \leq k$  за  $x \in M$ .

1.10. Да разгледаме множеството от числа от вида

$$w = a + ib_1 + jb_2 + kb_3, \quad b_1, b_2, b_3, a \in \mathbb{R},$$

където  $i, j, k$  са „имагинерни единици“, за които

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1, \quad ij = -ji = k, \quad jk = -kj = i, \quad ki = -ik = j.$$

Ако  $u = c + id_1 + jd_2 + kd_3$ , то

$$w + u = (a + c) + i(b_1 + d_1) + j(b_2 + d_2) + k(b_3 + d_3).$$

Произведението  $wu$  получаваме чрез разкриване на скобите и правилата за умножение на имагинерните единици. Така определените числа се наричат кватерниони. Докажете, че свойства С 1—С 9 са в сила за тези числа (с изключение на С 5).

## § 2. Геометрична прогресия

Нека  $a, b \in \mathbb{C}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ . Проверете чрез разкриване на скобите, че

$$(1) \quad (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + b^{n-1}) = a^n - b^n.$$

Събирателите във вторите скоби от лявата страна на (1) са от вида  $a^i b^j$ , като  $k + j = n - 1$ ,  $0 \leq k \leq n - 1$ ,  $0 \leq j \leq n - 1$  и броят им е  $n$ .

Нека в (1) положим  $a = 1$ ,  $b = x \neq 1$ . Получаваме

$$(2) \quad 1 + x + x^2 + \dots + x^{n-1} = \frac{1 - x^n}{1 - x}.$$

Това е формулата за сумата от първите  $n$  члена на геометрична прогресия с частно  $x$  и първи елемент 1.

2.1. Пресметнете сумата  $1 + x^2 + x^4 + \dots + x^{2n}$ ,  $|x| \neq 1$ .

Решение. Съгласно (2) имаме

$$1 + x^2 + x^4 + \dots + x^{2n} = \frac{1 - (x^2)^{(n+1)}}{1 - x^2} = \frac{1 - x^{2n+2}}{1 - x^2}.$$

2.2. Пресметнете сумите:

a)  $1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n$ ,  $x \neq -1$ ;

б)  $x - x^3 + x^5 - \dots + (-1)^{n-1} x^{2n-1}$ ;

в)  $2 - x^3 + \frac{x^6}{2} - \frac{x^9}{2^2} + \dots + \frac{x^{6n}}{2^{n-1}}$ ,  $\frac{x^3}{2} \neq -1$ ;

г)  $ax + ax^2 + \dots + ax^n$ ,  $x \neq 1$ .

2.3. Пресметнете  $S = x + 2x^2 + \dots + nx^n$ ,  $x \neq 1$ . Упътване. Разгледайте разликата  $S - xS$ .

## § 3. Математическа индукция

Естествените числа имат едно забележително свойство, наречено принцип на пълната математическа индукция или, както по-кратко ще казваме, математическа индукция, или даже само индукция:

Нека  $M$  е числово множество. Ако за  $M$  са изпълнени:

1)  $1 \in M$ ,

2) от  $n \in M$  следва, че и  $n + 1 \in M$ ,

то  $M$  съдържа всички естествени числа.

Условието 2) може да се замени с условието

2') ако  $1, 2, \dots, n \in M$ , то и  $n + 1 \in M$ .

3.1. Да разгледаме множеството  $M$  от тези естествени числа  $n$ , за които  $P(n) = n^2 + n + 41$  е просто число. Докажете, че  $1, 2, 3, \dots, 39 \in M$ , но  $40 \notin M$ .

3.2. Нека  $M$  е множеството от естествени числа, за които е изпълнено равенството

$$\cos \varphi + \cos 2\varphi + \dots + \cos n\varphi = \frac{\sin \frac{2n+1}{2}\varphi}{2 \sin \frac{\varphi}{2}}, \quad \varphi \neq 2k\pi.$$



Покажете, че за  $M$  е изпълнено условието 2), но въпреки това  $M$  не съдържа нито едно естествено число.

Решение. Да предположим, че  $n \in M$ . Тогава

$$\cos \varphi + \cos 2\varphi + \dots + \cos n\varphi + \cos(n+1)\varphi = \frac{\sin \frac{2n+1}{2}\varphi}{2 \sin \frac{\varphi}{2}}$$

$$+ \cos(n+1)\varphi = \frac{\sin \frac{2n+1}{2}\varphi + 2 \sin \frac{\varphi}{2} \cos(n+1)\varphi}{2 \sin \frac{\varphi}{2}}$$

$$= \frac{\sin \frac{2n+1}{2}\varphi + \sin\left(\frac{\varphi}{2} + (n+1)\varphi\right) + \sin\left(\frac{\varphi}{2} - (n+1)\varphi\right)}{2 \sin \frac{\varphi}{2}}$$

$$= \frac{\sin \frac{2n+3}{2}\varphi}{2 \sin \frac{\varphi}{2}}$$

$$= \frac{\sin \frac{\varphi}{2}}{2 \sin \frac{\varphi}{2}}$$

Следователно  $n+1 \in M$ . Ще покажем, че  $1 \in M$ . Действително

$$\frac{\sin \frac{3}{2}\varphi}{2 \sin \frac{\varphi}{2}} = \frac{\sin \frac{\varphi}{2} \cos \varphi + \sin \varphi \cos \frac{\varphi}{2}}{2 \sin \frac{\varphi}{2}}$$

$$= \frac{1}{2} \left( \cos \varphi + 2 \cos^2 \frac{\varphi}{2} \right)$$

$$= \cos \varphi + \frac{1}{2} \neq \cos \varphi.$$

Да предположим, че  $M$  съдържа естествени числа, и нека  $k$  е най-малкото от тях. Тъй като  $1 \notin M$ , то  $k > 1$ . Съгласно допускането

$$\cos \varphi + \dots + \cos(k-1)\varphi = \frac{\sin \frac{2k+1}{2}\varphi}{2 \sin \frac{\varphi}{2}} - \cos k\varphi$$

$$= \frac{\sin \frac{2k+1}{2}\varphi - 2 \cos k\varphi \sin \frac{\varphi}{2}}{2 \sin \frac{\varphi}{2}} = \frac{\sin \frac{2k-1}{2}\varphi}{2 \sin \frac{\varphi}{2}}$$

Но отгук следва, че  $k-1 \in M$ , противно на избора на  $k$ . Следователно  $M$  не съдържа естествени числа.

3.3. Докажете, че

$$\frac{1}{2} + \cos \varphi + \cos 2\varphi + \dots + \cos n\varphi = \frac{\sin \frac{2n+1}{2}\varphi}{2 \sin \frac{\varphi}{2}},$$

$$\varphi \neq 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

3.4. Докажете, че  $1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$ .

Решение. Да означим с  $M$  множеството от естествените числа, за които равенството е изпълнено. Очевидно  $1 \in M$ . Да допуснем, че за някое  $k$  имаме  $1 + 3 + \dots + (2k-1) = k^2$ . Тогава

$$1 + 3 + \dots + (2k-1) + (2k+1) = k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2.$$

Съгласно принципа на математическата индукция  $M$  съдържа всички естествени числа, т.е. равенството е вярно за всяко  $n \in \mathbb{N}$ .

3.5. Докажете, че:

а)  $1 + 2 + \dots + n = \frac{1}{2}n(n+1)$ ;

б)  $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$ ;

в)  $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{1}{4}n^2(n+1)^2$ .

3.6. (неравенство на Бернули). За всяко  $n \in \mathbb{N}$  и  $x \geq -1$  е в сила неравенството  $(1+x)^n \geq 1+nx$ .



**Решение.** За  $n = 1$  имаме равенството  $1 + x = 1 + x$ . Нека за някое  $k \in \mathbb{N}$  е изпълнено  $(1 + x)^k \geq 1 + kx$  за всяко  $x \geq -1$ . Да умножим двете страни на това неравенство с  $1 + x \geq 0$ . Получаваме

$$(1 + x)^{k+1} \geq (1 + kx)(1 + x) = 1 + (k + 1)x + kx^2 \geq 1 + (k + 1)x.$$

**3.7.** Нека  $x_1, x_2, \dots, x_n$  са  $n$  положителни числа, за които  $x_1 x_2 \dots x_n = 1$ . Докажете, че  $x_1 + x_2 + \dots + x_n \geq n$  и равенство се достига само за  $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ .

**Решение.** Доказателството ще извършим с индукция по броя  $n$  на числата  $x_1, \dots, x_n$ . Ако  $n = 1$ , по условие имаме  $x_1 = 1$  и твърдението е изпълнено. Да допуснем, че то е вярно за кои да са  $n$  числа, които удовлетворяват условието на задачата. Нека  $x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}$  са  $n + 1$  положителни числа, чието произведение е единица.

**Първи случай.** Нека  $x_1 = x_2 = \dots = x_{n+1} = 1$ . Тогава  $x_1 + x_2 + \dots + x_n + x_{n+1} = n + 1$  и твърдението е доказано.

**Втори случай.** Поне едно от числата е по-голямо от 1. Без ограничение на общността можем да предположим, че  $x_1 > 1$ . Тъй като  $x_1 x_2 \dots x_{n+1} = 1$ , то ще има друго число — нека това е  $x_2$ , за което  $x_2 < 1$ . Тогава

$$(x_1 - 1)(1 - x_2) > 0, \quad x_1 + x_2 - x_1 x_2 - 1 > 0, \quad x_1 + x_2 > 1 + x_1 x_2,$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_{n+1} > 1 + x_1 x_2 + x_3 + \dots + x_{n+1}.$$

Да разгледаме числата  $y_1 = x_1 x_2, y_2 = x_3 \dots, y_n = x_{n+1}$ . Очевидно  $y_1 > 0, y_2 > 0, \dots, y_n > 0, y_1 y_2 \dots y_n = x_1 x_2 \dots x_{n+1} = 1$ . Съгласно индукционното допускане  $y_1 + y_2 + \dots + y_n > n$ . Следователно  $x_1 + x_2 + \dots + x_{n+1} > 1 + y_1 + \dots + y_n \geq 1 + n$ .

**3.8** (неравенство между средното аритметично и средното геометрично — неравенство на Коши). Нека  $a_1, a_2, \dots, a_n$  са  $n$  неотрицателни числа. В сила е неравенството

$$(1) \quad \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}.$$

Равенството се достига само при  $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ .

Числото  $\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$  се нарича средно аритметично, а

$\sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}$  — средно геометрично на числата  $a_1, \dots, a_n$ .

**Решение.** Първи случай. Ако някое от числата  $a_1, a_2, \dots, a_n$  е нула, то  $\sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} = 0 \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$ ,

като равенство има само ако  $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$ .

**Втори случай.** Числата  $a_1, a_2, \dots, a_n$  са положителни. Нека

$$x_1 = \frac{a_1}{\sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}}, \quad x_2 = \frac{a_2}{\sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{a_n}{\sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}}.$$

Имаме  $x_1 > 0, x_2 > 0, \dots, x_n > 0$  и

$$x_1 x_2 \dots x_n = \frac{a_1 a_2 \dots a_n}{(\sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n})^n} = \frac{a_1 a_2 \dots a_n}{a_1 a_2 \dots a_n} = 1.$$

Съгласно зад. 3.7  $x_1 + x_2 + \dots + x_n \geq n$ , т.е.

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{\sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}} \geq n, \quad \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}.$$

Равенството се достига за  $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ , което е възможно само при  $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ .

**3.9.** Нека  $a_1 > 0, a_2 > 0, \dots, a_n > 0$ . Докажете, че

$$\frac{\frac{1}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}}}{n} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}.$$

Числото  $\frac{1}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}}$  се нарича средно хармонично на

$a_1, a_2, \dots, a_n$ .

Упътване. Приложете неравенството между средното аритметично и средното геометрично (зад. 3.8) за числата  $\frac{1}{a_1}, \frac{1}{a_2}, \dots, \frac{1}{a_n}$ .

3.10. Нека  $a \geq 0$  и  $b \geq 0$ . Докажете, че  $n+1 \sqrt[n+1]{ab^n} \leq \frac{a+nb}{n+1}$ .

3.11. Докажете, че:

а) сумата от кубовете на три последователни естествени числа се дели на 9;

б) числото  $n^3+5n$  се дели на 6,  $n \in \mathbf{Z}$ .

3.12. Нека  $M$  е множество от цели числа, за което:

1)  $k_0 \in M$ ;

2) ако  $n \in M$ , то и  $n+1 \in M$ .

Докажете, че  $M$  съдържа всички цели числа, които са по-големи или равни на  $k_0$ .

Да припомним, че  $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$ ,  $n \in \mathbf{N}$  (чете се „ен факториел“), като  $0! = 1$ .

3.13. Докажете, че  $\frac{4^n}{n+1} < \frac{(2n)!}{(n!)^2}$ , където  $n \geq 2$ ,  $n \in \mathbf{N}$ .

Решение. За  $n=2$  получаваме вярното неравенство  $\frac{16}{3} < 6$ .

Нека за естественото  $n$  е изпълнено  $\frac{4^n}{n+1} < \frac{(2n)!}{(n!)^2}$ . За да дока-

жем, че  $\frac{4^{n+1}}{n+2} < \frac{(2(n+1))!}{((n+1)!)^2}$ , достатъчно е да проверим, че

$$\frac{4(2n)!(n+1)}{(n+2)(n!)^2} \leq \frac{(2(n+1))!}{((n+1)!)^2}, \text{ или } \frac{2}{n+2} \leq \frac{2n+1}{(n+1)^2}.$$

Последното е еквивалентно с  $n \geq 0$ .

3.14. Докажете, че  $2^{n-1}(a^n+b^n) > (a+b)^n$ , като  $a+b > 0$ ,  $a \neq b$ ,  $n > 1$ ,  $n \in \mathbf{N}$ .

3.15. Докажете, че  $1 + \frac{k}{n} \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^k < 1 + \frac{k}{n} + \frac{k^2}{n^2}$

за  $k \leq n$ ,  $k, n \in \mathbf{N}$ . Като частен случай се получава неравенството

$$2 \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 3.$$

3.16. Докажете, че  $\left(\frac{n}{3}\right)^n < n! < \left(\frac{n}{2}\right)^n$  за  $n \geq 6$ ,  $n \in \mathbf{N}$ .

Упътване. Използвайте зад. 3.15.

3.17 (Формула на Моавър). Нека  $z = \cos \varphi + i \sin \varphi$ . Докажете, че  $z^n = \cos n\varphi + i \sin n\varphi$ ,  $n \in \mathbf{N}$ .

Решение. За  $n=1$  твърдението е изпълнено. Нека  $z^n = \cos n\varphi + i \sin n\varphi$ . Тогава  $z^{n+1} = z^n z = (\cos n\varphi + i \sin n\varphi)(\cos \varphi + i \sin \varphi) = (\cos n\varphi \cos \varphi - \sin n\varphi \sin \varphi) + i(\sin n\varphi \cos \varphi + \cos n\varphi \sin \varphi) = \cos(n+1)\varphi + i \sin(n+1)\varphi$ .

3.18. Сумирайте  $\sin x + \sin 2x + \dots + \sin nx$ .

Решение. Ако  $x = k\pi$  за някое  $k \in \mathbf{Z}$ , то търсената сума е 0. Нека  $x \neq k\pi$  и  $z = \cos x + i \sin x$ . Тъй като  $x \neq 2k\pi$ ,  $z \neq 1$ , то съгласно (2) от § 2 имаме

$$(2) \quad 1+z+\dots+z^n = \frac{1-z^{n+1}}{1-z}.$$

От формулата на Моавър получаваме

$$1+z+\dots+z^n = (1+\cos x + \dots + \cos nx) + i(\sin x + \dots + \sin nx).$$

От друга страна,

$$\frac{1-z^{n+1}}{1-z} = \frac{(1-z^{n+1})(1-\bar{z})}{|1-\bar{z}|^2} = \frac{1-z^{n+1}-\bar{z}+z^{n+1}\bar{z}}{2(1-\cos x)} = \frac{1-z^{n+1}-\bar{z}+z^n}{2(1-\cos x)}.$$

Като приравним имагинерните части от двете страни на (2), получаваме

$$\sin x + \dots + \sin nx = \frac{\sin nx - \sin(n+1)x + \sin x}{2(1-\cos x)}$$

$$= \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} - 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{2n+1}{2} x + \cos \frac{x}{2} - \cos \frac{2n+1}{2} x}{4 \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \sin \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}}$$

или окончателно

$$(3) \quad \sin x + \sin 2x + \dots + \sin nx = \frac{\sin \frac{n+1}{2} x \sin \frac{n}{2} x}{\sin \frac{x}{2}}.$$

3.19. Докажете (3) по индукция.

3.20. Сумирайте  $\cos x + \cos 2x + \dots + \cos nx$ .

3.21. Пресметнете следните суми:



- а)  $\cos x + \cos 3x + \dots + \cos(2n-1)x$ ,  $x \neq k\pi$ ;  
 б)  $\sin x + \sin 3x + \dots + \sin(2n-1)x$ ,  $x \neq k\pi$ .

3.22. Докажете, че:

$$а) \sin x + 2\sin 2x + \dots + n\sin nx = \frac{(n+1) \sin nx - n \sin(n+1)x}{4 \sin^2 \frac{x}{2}}$$

$x \neq 2k\pi$ ;

$$б) \frac{n+1}{2} + n \cos x + (n-1) \cos 2x + \dots + \cos nx = \frac{1}{2} \left( \frac{\sin(n+1) \frac{x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2$$


$x \neq 2k\pi$ ;

$$в) \cos^2 x + \cos^2 2x + \dots + \cos^2 nx = \frac{2n-1}{4} + \frac{\sin(2n+1)x}{\sin x}, \quad x \neq k\pi.$$

3.23. Намерете  $a_n$  в явен вид, ако:

- а)  $a_1 = \cos x$ ,  $a_2 = \cos 2x$ ,  $a_{n+1} = a_n \cdot 2 \cos x - a_{n-1}$ ,  $n \geq 2$ ;  
 б)  $a_1 = \sin x$ ,  $a_2 = \sin 2x$ ,  $a_{n+1} = a_n \cdot 2 \cos x - a_{n-1}$ ,  $n \geq 2$ .

3.24 (ханойски кули). Разполагаме с три колчета. На първото колче са низани  $n$  концентрични пръстена с намаляващи диаметри (фиг. 2). Покажете, че пръстените могат да се



Фиг. 2

прехвърлят на третото колче с  $2^n - 1$  премествания, като с едно преместване се прехвърля само един пръстен от едно колче на друго, и то само върху пръстен с по-голям диаметър. Покажете, че задачата не може да се реши с по-малко от  $2^n - 1$  премествания.

## § 4. Полиноми. Принципи за сравняване на коефициентите

Функция  $P$  от вида  $P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$  наричаме полином на  $x$ . Числата  $a_0, a_1, \dots, a_n$  наричаме коефициенти на полинома,  $a_0$  е старшият коефициент, а естественото число  $n$  — степен на полинома (разбира се, трябва  $a_0$  да бъде различно от нула, в противен случай степента на полинома е по-малка от  $n$ ). Сума на два полинома е пак полином от каква степен? Произведение на два полинома е също полином (от каква степен и с какъв старши коефициент?). Ако  $P(x) = C$ , където  $C$  е константа, ще казваме, че  $P$  е полином от нулева степен. Ако  $P(x_0) = 0$ , ще казваме, че  $x_0$  е нула на полинома  $P$ .

4.1 (Безу). Нека  $x_0$  е нула на полинома  $P$ . Докажете, че съществува полином  $Q$ , за който е изпълнено

$$P(x) = (x - x_0)Q(x),$$

като  $Q$  има същия старши коефициент и степен, с единица по-ниска от степента на  $P$ .

Решение. Нека  $P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$ . Имаме

$$\begin{aligned} P(x) &= P(x) - P(x_0) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n - (a_0x_0^n + \dots + a_n) \\ &= a_0(x^n - x_0^n) + a_1(x^{n-1} - x_0^{n-1}) + \dots + a_{n-1}(x - x_0) \\ &= (x - x_0)[a_0x^{n-1} + (a_0x_0^{n-1} + a_1)x^{n-2} + \dots \\ &\quad + (a_0x_0^{n-1} + a_1x_0^{n-2} + \dots + a_{n-1})]. \end{aligned}$$

Полиномът в средните скоби е търсеният полином  $Q$ .

4.2. Нека  $P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$  е полином от степен, ненадминаваща  $n$ . Нека  $x_1, x_2, \dots, x_m, x_{m+1}$  са  $n+1$  различни нули на  $P$ . Докажете, че  $P$  е нулев полином, т.е.

$$a_0 = a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0.$$

Решение. Според зад. 4.1  $P(x) = (x - x_1)Q_1(x)$ . Нека  $2 \leq k \leq n+1$ , тогава от равенството  $P(x_k) = (x_k - x_1)Q_1(x_k) = 0$  следва, че  $Q_1(x_k) = 0$  за  $x_k \neq x_1$ . Прилагаме пак зад. 4.1 към  $Q_1(x)$  и  $x_2$  и получаваме  $P(x) = (x - x_1)(x - x_2)Q_2(x)$ , където  $Q_2$  е от степен, ненадминаваща  $n-2$  и със старши коефициент  $a_0$ . Към  $Q_2$  и  $x_3$  пак прилагаме зад. 4.1 и т.н. Стигаме до представянето

$$P(x) = (x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)Q_n(x),$$

където полиномът  $Q_n$  е от нулева степен със старши коефициент  $a_0$ , т.е.  $Q_n(x) = a_0$  и за  $P$  получаваме



$$P(x) = a_0(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n).$$

Но  $P(x_{n+1}) = 0$  и  $a_0(x_{n+1} - x_1)(x_{n+1} - x_2) \dots (x_{n+1} - x_n) = 0$  и тъй като  $x_{n+1}$  е различно от  $x_1, \dots, x_n$ , получаваме  $a_0 = 0$ . Аналогично се вижда, че  $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$ .

**4.3** (принцип за сравняване на коефициентите). Нека  $P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$ ,  $Q(x) = b_0x^n + b_1x^{n-1} + \dots + b_n$ ,  $P(x_1) = Q(x_1)$ ,  $P(x_2) = Q(x_2), \dots, P(x_{n+1}) = Q(x_{n+1})$ , където  $x_1, \dots, x_{n+1}$  са  $n+1$  различни числа. Докажете, че  $a_0 = b_0, a_1 = b_1, \dots, a_n = b_n$  (у пътване). Разгледайте полинома  $R(x) = P(x) - Q(x)$ .

**4.4.** Покажете, че съществуват константи  $A$  и  $B$ , за които равенството

$$\frac{x+2}{x^2-5x+6} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-3}$$

е изпълнено за всяко  $x$ ,  $x \neq 2, x \neq 3$ .

**Решение.** Ако  $A$  и  $B$  са такива константи, за тях е изпълнено равенството  $x+2 = A(x-3) + B(x-2)$  за всяко  $x$ ,  $x \neq 2, x \neq 3$ . Но  $x+2$  и  $A(x-3) + B(x-2)$  са полиноми от първа степен, които приемат равни стойности за безбройно много стойности на  $x$ . Следователно те имат едни и същи коефициенти, т.е.

$$1 = A + B, \quad 2 = -3A - 2B.$$

Тази система има единствено решение:  $A = -4, B = 5$ . Следователно, ако задачата има решение, то е единствено. С непосредствена проверка се вижда, че намерените стойности за  $A$  и  $B$  са решение.

**4.5.** Намерете всички тройки числа  $A, B, C$ , за които

$$\frac{x+2}{x^3-1} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+x+1}$$

при  $x \neq 1$  е тъждество.

**4.6.** Нека  $x_0, x_1, \dots, x_n$  са  $n+1$  различни числа и  $y_0$  е произволно число. Покажете, че съществува единствен полином  $P$  от степен, ненадминаваща  $n$ , за който  $P(x_0) = y_0, P(x_1) = \dots = P(x_n) = 0$ .

**Решение.** Нека  $C$  е константа, която ще определим допълнително. Да разгледаме  $P(x) = C(x-x_1)(x-x_2) \dots (x-x_n)$ . Имаме

$$P(x_1) = P(x_2) = \dots = P(x_n) = 0.$$

Ще дадем на  $C$  такава стойност, че  $P(x_0) = y_0$ . Полиномът

$$P(x) = y_0 \frac{(x-x_1)(x-x_2) \dots (x-x_n)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2) \dots (x_0-x_n)}$$

е търсеният. Той е единствен съгласно зад. 4.3.

**4.7** (Лагранж). Нека  $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$  са  $n+1$  двойки числа, като  $x_0, x_1, \dots, x_n$  са различни. Покажете, че съществува единствен полином  $P$  от степен, ненадминаваща  $n$ , за който  $P(x_0) = y_0, P(x_1) = y_1, \dots, P(x_n) = y_n$ .

**Решение.** Съгласно припича за сравняване на коефициентите (зад. 4.3) повече от един полином с изброените свойства не може да има. Да разгледаме полинома

$$P(x) = y_0 \frac{(x-x_1)(x-x_2) \dots (x-x_n)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2) \dots (x_0-x_n)} + y_1 \frac{(x-x_0)(x-x_2) \dots (x-x_n)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2) \dots (x_1-x_n)} + \dots + y_k \frac{(x-x_1) \dots (x-x_{k-1})(x-x_{k+1}) \dots (x-x_n)}{(x_k-x_1)(x_k-x_2) \dots (x_k-x_n)} + \dots + y_n \frac{(x-x_0) \dots (x-x_{n-1})}{(x_n-x_0) \dots (x_n-x_{n-1})}.$$

Очевидно  $P(x_0) = y_0, P(x_1) = y_1, \dots, P(x_n) = y_n$ , т.е. това е търсеният полином. Той се нарича интерполационен полином на Лагранж за точките  $(x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n)$ .

**4.8.** Намерете полином  $P_n$ , за който  $P_n(0) = 0, P_n(1) = 0, \dots, P_n(n-1) = 0, P_n(n) = 1$ .

**4.9** (Нютон). Покажете, че съществуват константи  $c_0, c_1, \dots, c_n$  такива, че интерполационният полином на Лагранж от зад. 4.7 може да се запише във вида

$$P(x) = c_0 + c_1(x-x_0) + c_2(x-x_0)(x-x_1) + \dots + c_n(x-x_0) \dots (x-x_{n-1}).$$

Числата  $c_0, c_1, \dots, c_n$  се наричат нютониви частни.

**Решение.** Системата

$$(1) \begin{cases} c_0 = y_0 \\ c_0 + c_1(x_1 - x_0) = y_1 \\ c_0 + c_1(x_2 - x_0) + c_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1) = y_2 \\ \dots \\ c_0 + c_1(x_n - x_0) + \dots + c_n(x_n - x_0) \dots (x_n - x_{n-1}) = y_n \end{cases}$$

има единствено решение  $c_0, c_1, \dots, c_n$ .

За полинома

имаме  $Q(x) = c_0 + c_1(x - x_0) + \dots + c_n(x - x_0) \dots (x - x_{n-1})$  интерполационният полином на Лагранж за  $(x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n)$ . Пресмятането на  $c_0, c_1, \dots, c_n$  от (1) не е удобно. Ще посочим пряк начин за получаване на нютоновите частни. Нека

$$(2) \quad g_k(x) = c_0 + c_1(x - x_0) + \dots + c_k(x - x_0) \dots (x - x_{k-1}).$$

Ясно е, че  $g_k(x_i) = y_i$ ,  $0 \leq i \leq k$ , и съгласно зад. 4.7

$$(3) \quad g_k(x) = y_0 \frac{(x - x_1) \dots (x - x_k)}{(x_0 - x_1) \dots (x_0 - x_k)} + \dots + y_k \frac{(x - x_0) \dots (x - x_{k-1})}{(x_k - x_0) \dots (x_k - x_{k-1})}.$$

Като сравним коефициентите пред  $k$ -тите степени в (2) и (3), получаваме

$$c_k = \frac{y_k}{(x_0 - x_1) \dots (x_0 - x_k)} + \dots + \frac{y_0}{(x_k - x_0) \dots (x_k - x_{k-1})}.$$

**4.10.** Нека  $n \in \mathbb{N}$ . Докажете, че съществуват единствени полиноми  $P_n$  и  $Q_n$  със старши коефициенти  $2^{n-1}$  от степени съответно  $n$  и  $n-1$ , за които

$$(4) \quad \begin{cases} \cos ny = P_n(\cos y), \\ \sin ny = \sin y Q_n(\cos y). \end{cases}$$

Решение. От зад. 4.3 следва, че ако такива полиноми съществуват, те са единствени. Съществуването ще докажем с индукция по  $n$ . Нека  $n=1$ . Полиномите  $P_1(x) = x$  и  $Q_1(x) = 1$  удовлетворяват условието на задачата. Да предположим, че сме намерили полиноми  $P_1, \dots, P_n$  и  $Q_1, \dots, Q_n$  които удовлетворяват условието на задачата. Ще определим следващата двойка полиноми  $P_{n+1}$  и  $Q_{n+1}$ . В сила са тъждествата

$$\begin{aligned} \cos(n+1)y &= 2\cos y \cos ny - \cos(n-1)y, \\ \sin(n+1)y &= 2\cos y \sin ny - \sin(n-1)y. \end{aligned}$$

От индукционното допускане следва, че

$$\begin{aligned} \cos(n+1)y &= 2\cos y P_n(\cos y) - P_{n-1}(\cos y), \\ \sin(n+1)y &= \sin y (2\cos y Q_n(\cos y) - Q_{n-1}(\cos y)). \end{aligned}$$

Остава да положим  $P_{n+1}(x) = 2xP_n(x) - P_{n-1}(x)$ ,

$$Q_{n+1}(x) = 2xQ_n(x) - Q_{n-1}(x).$$

## § 5. НЮТОНОВ БИНОМ

Нека  $\alpha$  е произволно реално число. Числата

$$\binom{\alpha}{0} = 1, \quad \binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-k+1)}{k!}, \quad k \in \mathbb{N},$$

се наричат биномни коефициенти.

**5.1.** Докажете, че

$$\binom{\alpha}{k} + \binom{\alpha}{k+1} = \binom{\alpha+1}{k+1}.$$

Решение. Нека  $k=0$ . Тогава

$$\binom{\alpha}{0} + \binom{\alpha}{1} = 1 + \alpha = \binom{\alpha+1}{1}.$$

Нека сега  $k \in \mathbb{N}$ . Имаме

$$\begin{aligned} \binom{\alpha}{k} + \binom{\alpha}{k+1} &= \frac{\alpha \dots (\alpha-k+1)}{k!} + \frac{\alpha \dots (\alpha-k)}{(k+1)!} \\ &= \frac{\alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-k+1)[(k+1) + (\alpha-k)]}{(k+1)!} = \frac{\alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-k+1)}{(k+1)!} \\ &= \binom{\alpha+1}{k+1}. \end{aligned}$$

**5.2.** Нека  $n$  и  $k$  са цели неотрицателни числа и  $n \geq k$ .

Докажете, че: а)  $\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! k!}$ , б)  $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ .



5.3. Докажете, че:

а)  $\binom{n}{0} + \binom{n+1}{1} + \dots + \binom{n+k}{k} = \binom{n+k+1}{k}$ ,  $k \in \mathbb{N}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ;

б)  $\binom{n}{n} + \binom{n+1}{n} + \dots + \binom{n+k}{n} = \binom{n+k+1}{n+1}$ ,  $n, k \in \mathbb{N}$ .

5.4. Нека  $n, k \in \mathbb{N}$ . Докажете, че:

а)  $\binom{n}{k} = 0$  при  $k > n$ ; б)  $\binom{n}{k} \in \mathbb{N}$  за  $k \leq n$ .

5.5. Нека  $n \in \mathbb{N}$  и  $k \leq n$ . Покажете, че броят на  $k$ -елементните подмножества на множество, състоящо се от  $n$  елемента, е  $\binom{n}{k}$ .

5.6. Докажете равенството

$$\binom{\alpha}{0} - \binom{\alpha}{1} + \binom{\alpha}{2} - \dots + (-1)^n \binom{\alpha}{n} = (-1)^n \binom{\alpha-1}{n}.$$

5.7 (биномна формула на Нютон). Докажете тъждествата:

а)  $(1+x)^n = \binom{n}{0} + \binom{n}{1}x + \dots + \binom{n}{n}x^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}x^k$ ;

б)  $(a+b)^n = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \dots + \binom{n}{n}b^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}a^{n-k}b^k$ .

Решение. а) Ще докажем тъждеството индуктивно. За  $n=1$  имаме  $(1+x)^1 = \binom{1}{0} + \binom{1}{1}x$ . Допускаме, че а) е вярно за някои  $n \in \mathbb{N}$ .

Тогава

$$(1+x)^{n+1} = \left[ \binom{n}{0} + \binom{n}{1}x + \dots + \binom{n}{n}x^n \right] (1+x)$$

$$= \binom{n}{0} + \left[ \binom{n}{1} + \binom{n}{0} \right]x + \dots + \left[ \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right]x^k + \dots + \left[ \binom{n}{n} + \binom{n}{n-1} \right]x^n + \binom{n}{n}x^{n+1}$$

$$= \binom{n+1}{0} + \binom{n+1}{1}x + \dots + \binom{n+1}{k}x^k + \dots + \binom{n+1}{n}x^n + \binom{n+1}{n+1}x^{n+1}.$$

При доказателството използвахме свойството на биномните коефициенти, дадено в зад. 5.1.

б) Положете в а)  $x = \frac{b}{a}$ .

5.8. Докажете, че:

а)  $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$ ;

б)  $\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \dots + (-1)^n \binom{n}{n} = 0$ .

Упътване. Приложете зад. 5.7.

5.9. Нека  $n$  е фиксирано естествено число. Намерете сумата на биномните коефициенти от вида

а)  $\binom{n}{2k}$ ; б)  $\binom{n}{2k+1}$ .

Упътване. Приложете зад. 5.8.

5.10. Докажете, че:

а)  $\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \dots + \binom{n}{n}^2 = \binom{2n}{n}$ ;

б)  $\binom{2n}{0}^2 - \binom{2n}{1}^2 + \dots + \binom{2n}{n}^2 = (-1)^n \binom{2n}{n}$ ;



$$\begin{aligned}
 & \text{в) } \binom{n}{1} - 2\binom{n}{2} + 3\binom{n}{3} - \dots + (-1)^{n-1} n\binom{n}{n} \\
 & = \begin{cases} 1 & \text{за } n=1, \\ 0 & \text{за } n>1; \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$\text{г) } \binom{n}{1}^2 + 2\binom{n}{2}^2 + \dots + n\binom{n}{n}^2 = \frac{(2n-1)!}{((n-1)!)^2}.$$

Решение. а) От тъждеството  $[(1+x)^n]^2 = (1+x)^{2n}$ , като приложим зад. 5.7, а), получаваме

$$\begin{aligned}
 & \left[ \binom{n}{0} + \binom{n}{1}x + \dots + \binom{n}{n}x^n \right] \left[ \binom{n}{0}x^0 + \binom{n}{1}x^1 + \dots + \binom{n}{n}x^n \right] \\
 & = \binom{2n}{0} + \binom{2n}{1}x + \dots + \binom{2n}{n}x^n + \dots + \binom{2n}{n}x^n + \dots + \binom{2n}{0}x^{2n}.
 \end{aligned}$$

Тези два полинома приемат равни стойности за всяко  $x$ . Съгласно принципа за сравняване на коефициентите те са едни и същи. Чрез приравняване на коефициентите пред  $n$ -тите степени получаваме търсеното равенство.

б) Използвайте равенството  $(1+x)^{2n} (1-x)^{2n} = (1-x^2)^{2n}$ .

в) и г) Докажете и използвайте съответно равенствата

$$nx^{n-1} = \binom{n}{1} + 2\binom{n}{2}(x-1) + \dots + n\binom{n}{n}(x-1)^{n-1}$$

и

$$n(1+x)^{2n-1} = (1+x)^n \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} x^{k-1}.$$

5.11. Нека  $p \in \mathbb{N}$ .

а) Ако  $m, n \in \mathbb{N}$  и  $m+n \leq p$ , докажете, че

$$\binom{n}{0} \binom{m}{p} + \binom{n}{1} \binom{m}{p-1} + \dots + \binom{n}{p} \binom{m}{0} = \binom{m+n}{p};$$

б) докажете горното равенство за произволни реални числа  $m, n$ .

5.12 (Бернули). Нека  $k \in \mathbb{N}$ . Докажете, че съществува полином

$$P_{k+1}(x) = a_0 x^{k+1} + a_1 x^k + a_2 x^{k-1} + \dots + a_{k+1},$$

който за всяко естествено  $n$  удовлетворява равенството

$$1^k + 2^k + \dots + n^k = P_{k+1}(n).$$

Числата  $a_0, a_1, \dots, a_{k+1}$  се наричат числа на Бернули. Съществуват формули за тяхното пресмятане.

$$\text{Покажете, че } a_0 = \frac{1}{k+1}, \quad a_1 = \frac{1}{2}.$$

Решение. Зад. 3.5 показва, че  $P_2(x) = \frac{1}{2}(x+1)x = \frac{1}{2}x^2$

$$+ \frac{1}{2}x, \quad P_3(x) = \frac{1}{6}x(x+1)(2x+1) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x \text{ и т.н.}$$

Като използвате това, решете задачата чрез индукция по  $k$ .

Решението, което тук излагаме, е предложено от аспиранта А. Александров. Да означим с  $P_{k+1}$  полинома на  $x$ , за който  $P_{k+1}(1) = 1$ ,  $P_{k+1}(2) = 1^k + 2^k, \dots, P_{k+1}(k+2) = 1^k + 2^k + \dots + (k+2)^k$ . Такъв полином съществува и е единствен съгласно зад. 4.7. Полиномът  $Q(x) = P_{k+1}(x+1) - P_{k+1}(x)$  е от степен най-много  $k$ , като  $Q(1) = (1+1)^k, Q(2) = (1+2)^k, \dots, Q(k+1) = (1+(k+1))^k$ . Пак от зад. 4.7 имаме  $Q(x) = (1+x)^k$ . Но  $P_{k+1}(x+1) - P_{k+1}(x)$

$$= a_0(k+1)x^k + \left( a_0 \frac{(k+1)k}{2} + a_1 k \right) x^{k-1} + \dots + a_k, \quad a_0 = \binom{k}{0} x^k$$

$$+ \binom{k}{1} x^{k-1} + \dots + \binom{k}{k}.$$

Като приравним коефициентите пред най-високите степени, полу-

$$\text{чаваме } a_0(k+1) = 1, \quad a_0 \frac{(k+1)k}{2} + a_1 k = k,$$

$$\text{откъдето } a_0 = \frac{1}{k+1}, \quad a_1 = \frac{1}{2}.$$

## § 6. Обратни кръгови функции. Полиноми на Чебишов

Нека функцията  $f$  е дефинирана в множеството  $D$ . Употребяваме още означенията  $f(x)$  или  $x \mapsto f(x)$ .

Казваме, че функцията  $f$  е *обратима* в  $D$ , ако в различни точки от  $D$  тя приема различни стойности.

Нека  $f$  е обратима в  $D$ . Да означим с  $M$  множеството от функционалните стойности на  $f$ . В  $M$  ще дефинираме функция  $g$  по следния начин: за  $x \in M$  с  $g(x)$  означаваме това  $y \in D$ , за което  $f(y) = x$ . Поради обратимостта на  $f$  съществува единствено такова  $y$ .

Така дефинираната функция  $g$  се нарича обратна на  $f$  и често се означава с  $f^{-1}$ .

**6.1.** Докажете, че:

а)  $f(f^{-1}(x)) = x, x \in M$ ; б)  $f^{-1}(f(y)) = y, y \in D$ .

Решение. а) Нека  $x \in M$  и  $f^{-1}(x) = y$ . По дефиниция  $f(y) = x$ . Следователно  $f(f^{-1}(x)) = x$ .

Една функция наричаме монотонна, ако е растяща (за  $x_1 < x_2, f(x_1) < f(x_2)$ ) или намаляваща (за  $x_1 < x_2, f(x_1) > f(x_2)$ ).

**6.2.** Нека  $f$  е монотонна в  $D$ . Докажете, че тогава  $f$  е обратима и обратната ѝ функция е също монотонна.

Решение. Да предположим за определеност, че  $f$  е растяща. Очевидно  $f$  е обратима. Ще докажем, че  $f^{-1}$  е също растяща. Нека  $x_1, x_2 \in M$  и  $x_1 < x_2$ . Да предположим, че  $f^{-1}(x_1) \geq f^{-1}(x_2)$ . Тъй като  $f^{-1}(x_1), f^{-1}(x_2) \in D$ , а  $f$  е растяща в  $D$ , ще имаме  $f(f^{-1}(x_1)) \geq f(f^{-1}(x_2))$ . Но от зад. 6.1, а) следва, че  $f(f^{-1}(x_1)) = x_1$  и  $f(f^{-1}(x_2)) = x_2$ , т.е.  $x_1 \geq x_2$ , което противоречи на избора на  $x_1$  и  $x_2$ .

Преди да преминем към обратните кръгови функции, ще припомним основните тригонометрични зависимости, които е достатъчно да се помнят, за да не се нуждаят човек от никакви допълнителни помагала. Преди всичко трябва да знаем как се изменят  $\sin \alpha$  и  $\cos \alpha$  в зависимост от аргумента им  $\alpha$  и да можем да скицираме графиките им (фиг. 3)

Първата основна група формули е:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha,$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \sin \beta \cos \alpha,$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta,$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta.$$

Втората основна група формули може (при нужда) да се изведе от първата, но не е трудно да се запомни:

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2},$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2},$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2},$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}.$$

Третата основна група формули е директно следствие от първата:

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} (\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)),$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)),$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)).$$

Забелявате, че  $\operatorname{tg}$  и  $\operatorname{ctg}$  не участват в тези формули. Разбира се, трябва да знаем поведението на  $\operatorname{tg}$  и  $\operatorname{ctg}$  и да можем да скицираме графиките им, но всяка формула, свързана с тях, можем лесно да изведем от основните и не е необходимо да се помни. Например да изразим  $\operatorname{tg}(\alpha + \beta)$  чрез  $\operatorname{tg} \alpha$  и  $\operatorname{tg} \beta$ :

$$\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} = \frac{\sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha}{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta}$$



$$= \frac{\cos \alpha \cos \beta \left( \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\sin \beta}{\cos \beta} \right)}{\cos \alpha \cos \beta \left( 1 - \frac{\sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta} \right)} = \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}$$

Други важни формули изразяват  $\sin 2\alpha$  и  $\cos 2\alpha$  чрез  $\operatorname{tg} \alpha$ :

$$\sin 2\alpha = \frac{2 \sin \alpha \cos \alpha}{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha} = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha},$$

$$\cos 2\alpha = \frac{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha} = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}.$$

Да разгледаме сега функцията  $\sin$  (фиг. 3). Тя е дефинирана върху цялата



Фиг. 3



числова права и не е обратима, тъй като  $\sin \alpha = \sin(\alpha + 2k\pi)$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ . Но ако я разгледаме само в множеството  $D = [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ , тя е обратима. Обратната ѝ

функция е дефинирана в  $M = [-1, 1]$  и се означава с  $\arcsin$  (чете се „аркус синус“; наименованието произхожда от гръцката дума „аркус“ — дъга, и ако прочетем  $\arcsin x$  като „дъга, чийто синус е  $x$ “, това ни подсеща за начина, по който е дефинирана функцията).

Нека  $-1 \leq x \leq 1$  и  $\arcsin x = \alpha$ . Тогава

$$(1) \quad \sin \alpha = x,$$

$$(2) \quad -\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}.$$

Обратно, нека (1) и (2) са изпълнени за  $x$  и  $\alpha$ . Тогава  $\arcsin x = \alpha$ . И така (1) и (2) определят еднозначно  $\alpha$  и могат да служат за дефиниция на функцията  $\arcsin x$ .

$$6.3. \text{ Пресметнете } \arcsin 0, \arcsin 1, \arcsin \frac{\sqrt{2}}{2}, \arcsin \left(-\frac{1}{2}\right).$$

6.4. Докажете, че:

$$a) \quad \sin(\arcsin x) = x, \quad -1 \leq x \leq 1;$$

$$b) \quad \arcsin(\sin \alpha) = \alpha, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2};$$

$$в) \quad \arcsin(\sin \alpha) = \pi - \alpha, \quad \frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{3\pi}{2};$$

$$г) \quad \arcsin(\sin \alpha) = -\pi - \alpha, \quad -\frac{3\pi}{2} \leq \alpha \leq -\frac{\pi}{2};$$

д)  $\arcsin(\sin \alpha)$  е линейна функция на  $\alpha$  във всеки интервал от вида  $[-(2k-1)\frac{\pi}{2}, (2k+1)\frac{\pi}{2}]$ ,  $k \in \mathbb{Z}$  ( $f$  е линейна, ако  $f(x) = ax + b$ ).

Решение. в) Достатъчно е да покажем, че  $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$ , което очевидно е изпълнено, и  $-\frac{\pi}{2} \leq \pi - \alpha \leq \frac{\pi}{2}$ .

От неравенството  $\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{3\pi}{2}$  последователно получаваме

$$-\frac{3\pi}{2} \leq -\alpha \leq -\frac{\pi}{2}, \quad -\frac{3\pi}{2} + \pi \leq \pi - \alpha \leq \pi - \frac{\pi}{2}, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \pi - \alpha \leq \frac{\pi}{2}.$$

6.5. Докажете, че  $\arcsin x$  е растяща функция.

6.6. Докажете, че

$$\arcsin(2x^2 - 1) = \begin{cases} -\frac{\pi}{2} - 2 \arcsin x & \text{за } -1 \leq x \leq 0, \\ -\frac{\pi}{2} + 2 \arcsin x & \text{за } 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

Решение. Нека  $\arcsin x = \alpha$ . Тогава  $\sin \alpha = x$ ,  $-\frac{\pi}{2} \leq \alpha$

$$\leq \frac{\pi}{2} \text{ и } \arcsin(2x^2 - 1) = \arcsin(2\sin^2 \alpha - 1) = \arcsin(\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha)$$

$$= \arcsin(-\cos 2\alpha) = \arcsin(-\sin(\frac{\pi}{2} - 2\alpha)) = \arcsin(\sin(2\alpha - \frac{\pi}{2})).$$

Нека  $0 \leq x \leq 1$ . Съгласно зад. 6.5  $\arcsin 0 \leq \arcsin x \leq \arcsin 1$ , т.е.

$$0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2} \text{ и съответно } -\frac{\pi}{2} \leq 2\alpha - \frac{\pi}{2} \leq \frac{\pi}{2}. \text{ От зад. 6.4,}$$

$$б) \text{ следва } \arcsin(2x^2 - 1) = 2\alpha - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2} + 2\arcsin x. \text{ Нека}$$

$$\text{сега } -1 \leq x \leq 0. \text{ Тогава } -\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq 0 \text{ и } -\frac{\pi}{2} \leq -\frac{\pi}{2} - 2\alpha \leq \frac{\pi}{2},$$

$$\arcsin(2x^2 - 1) = \arcsin(\sin(\pi - 2\alpha + \frac{\pi}{2})) = \arcsin(\sin(-\frac{\pi}{2} - 2\alpha))$$

$$= -\frac{\pi}{2} - 2\alpha = -\frac{\pi}{2} - 2\arcsin x.$$

Да разгледаме функцията  $\cos$  в множеството  $D = [0, \pi]$ . Там тя е намаляваща и обратима. Обратната ѝ функция се означава с  $\arccos x$  („аркус косинус“), дефинирана е за  $-1 \leq x \leq 1$  и ако  $\alpha = \arccos x$ , то

$$(3) \quad \cos \alpha = x,$$

$$(4) \quad 0 \leq \alpha \leq \pi.$$

От (3) и (4)  $\alpha$  се определя еднозначно.

Аналогично се дефинират функциите  $\arctg x$  и  $\operatorname{arctg} x$  като обратни съответно на  $\operatorname{tg} \alpha$  в  $D = (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  и  $\operatorname{ctg} \alpha$  в  $D = (0, \pi)$ . Дефиниционната област на  $\operatorname{arctg} x$  и  $\operatorname{arctg} x$  е цялата числова права. Ако  $\operatorname{arctg} x = \alpha$ , то



$$(5) \quad \operatorname{tg} \alpha = x,$$

$$(6) \quad -\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2}.$$

$\alpha$  се определя еднозначно от (5) и (6) при дадено  $x$ . Ако

$$(7) \quad \operatorname{ctg} \alpha = x,$$

$$(8) \quad 0 < \alpha < \pi$$

за някое  $x$ , то  $\alpha$  се определя еднозначно от (7) и (8) и  $\operatorname{arctg} x = \alpha$ .

**6.7.** Докажете, че:

а)  $\cos(\operatorname{arccos} x) = x, \quad -1 \leq x \leq 1;$

б)  $\operatorname{arccos}(\cos \alpha) = \alpha, \quad 0 \leq \alpha \leq \pi;$

в)  $\operatorname{arccos}(\cos \alpha) = 2\pi - \alpha, \quad \pi \leq \alpha \leq 2\pi;$

г)  $\operatorname{arccos}(\cos \alpha)$  е линейна функция на  $\alpha$  във всеки интервал от вида  $[k\pi, (k+1)\pi], k \in \mathbf{Z}$ .

**6.8.** Докажете, че:

а)  $\operatorname{tg}(\operatorname{arctg} x) = x,$

б)  $\operatorname{arctg}(\operatorname{tg} \alpha) = \alpha, \quad -\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2};$

в)  $\operatorname{arctg}(\operatorname{tg} \alpha) = \alpha - k\pi, (2k-1)\frac{\pi}{2} < \alpha < (2k+1)\frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}.$

**6.9.** Докажете, че:

а)  $\operatorname{ctg}(\operatorname{arctg} x) = x;$

б)  $\operatorname{arctg}(\operatorname{ctg} \alpha) = \alpha, \quad 0 < \alpha < \pi;$

в)  $\operatorname{arctg}(\operatorname{ctg} \alpha) = \alpha - k\pi, k\pi < \alpha < (k+1)\pi, k \in \mathbf{Z}.$

**6.10.** Докажете, че  $\operatorname{arcsin} x + \operatorname{arccos} x = \frac{\pi}{2}, \quad -1 \leq x \leq 1.$

**Решение.** Нека  $\operatorname{arccos} x = \alpha$ , тогава  $0 \leq \alpha \leq \pi$  и  $\cos \alpha = x$ .

Достатъчно е да проверим, че  $\operatorname{arcsin} x = \frac{\pi}{2} - \alpha$ , т.е.

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = x \quad \text{и} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \frac{\pi}{2} - \alpha \leq \frac{\pi}{2} \quad ((1), (2)).$$

Но  $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha = x$ , а от  $0 \leq \alpha \leq \pi$  последователно получаваме

$$-\pi \leq -\alpha \leq 0, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \frac{\pi}{2} - \alpha \leq \frac{\pi}{2}.$$

**6.11.** Докажете, че:

а)  $\sin(\operatorname{arccos} x) = \sqrt{1-x^2}, \quad -1 \leq x \leq 1;$

б)  $\cos(\operatorname{arcsin} x) = \sqrt{1-x^2}, \quad -1 \leq x \leq 1;$

в)  $\sin(2\operatorname{arccos} x) = 2x\sqrt{1-x^2}, \quad -1 \leq x \leq 1.$

**6.12.** Докажете, че:

а)  $\sin(2\operatorname{arctg} x) = \frac{2x}{1+x^2};$

б)  $\cos(2\operatorname{arctg} x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}.$

**6.13.** Проверете, че  $\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} x = \frac{\pi}{2}$ .

**6.14.** Докажете, че

а)  $\operatorname{arcsin}(-x) = -\operatorname{arcsin} x, \quad -1 \leq x \leq 1;$

б)  $\operatorname{arctg}(-x) = -\operatorname{arctg} x;$

в)  $\operatorname{arccos}(-x) = \pi - \operatorname{arccos} x, \quad -1 \leq x \leq 1;$

г)  $\operatorname{arctg}(-x) = \pi - \operatorname{arctg} x.$

**6.15.** Докажете равенствата:

а)  $2\operatorname{arcsin} \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} + \operatorname{arccos} \frac{1}{2} = \frac{\pi}{2};$

б)  $\operatorname{arccos} x + \operatorname{arccos} \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{3-3x^2}\right) = \frac{\pi}{3}, \quad \frac{1}{2} \leq x \leq 1.$

Докажете равенствата:

дължина  $x$  е равен на  $\operatorname{arctg} x$ . Следователно  $\sin(\operatorname{arctg} x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ .

**6.20.** Нека числата  $x, y \in [-1, 1]$  са с различни знаци или удовлетворяват неравенството  $x^2 + y^2 \leq 1$ . Докажете, че  $\operatorname{arcsin} x + \operatorname{arcsin} y = \operatorname{arcsin}(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2})$ .

Решение. Да въведем означенията  $\operatorname{arcsin} x = \alpha$ ,  $\operatorname{arcsin} y = \beta$ .

Тогав  $\sin \alpha = x$ ,  $\sin \beta = y$  и  $\alpha, \beta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ,  $\operatorname{arcsin}(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}) = \operatorname{arcsin}(\sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha) = \operatorname{arcsin}(\sin(\alpha + \beta))$ . Като имаме пред-

вид б.4, б), достатъчно е да проверим, че  $-\frac{\pi}{2} \leq \alpha + \beta \leq \frac{\pi}{2}$ . Ако  $xy \leq 0$ , то или  $x \geq 0$  и  $y \leq 0$ , или  $x \leq 0$  и  $y \geq 0$ . В първия случай  $0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$  и  $-\frac{\pi}{2} \leq \beta \leq 0$ , във втория — обратното, но и в двата случая  $-\frac{\pi}{2} \leq \alpha + \beta \leq \frac{\pi}{2}$ . Нека сега  $xy \geq 0$  и  $x^2 + y^2 \leq 1$ . От дефиницията на  $\alpha$  и  $\beta$  имаме  $-\frac{\pi}{2} \leq \alpha + \beta \leq \frac{\pi}{2}$ . Необходимото и достатъчно условие за  $\alpha + \beta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  е  $\cos(\alpha + \beta) \geq 0$ . Но  $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = \sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2} - xy$ . Неравенството  $\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2} - xy \geq 0$  е еквивалентно на всяко от неравенствата:

$$\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2} \geq xy, \quad (1-x^2)(1-y^2) \geq x^2y^2, \quad x^2 + y^2 \leq 1.$$

**6.21.** Изразете  $\operatorname{arcsin}(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2})$  чрез  $\operatorname{arcsin} x + \operatorname{arcsin} y$  за  $x, y \in [-1, 1]$ ,  $x^2 + y^2 > 1$ ,  $xy > 0$ .

**6.22.** Докажете, че

$$\text{а) } \operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} \frac{1}{x} = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{за } x > 0, \\ -\frac{\pi}{2} & \text{за } x < 0; \end{cases}$$

$$\text{б) } \operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} y = \operatorname{arctg} \frac{x+y}{1-xy} + \text{ел. където } \varepsilon = 0 \text{ при } xy < 1; \varepsilon = 1$$

$$\text{6.16. } \operatorname{arccos}(4x^3 - 3x) = \begin{cases} \operatorname{arccos} x & \text{за } \frac{1}{2} \leq x \leq 1, \\ 2\pi - 3\operatorname{arccos} x & \text{за } -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ -2\pi + 3\operatorname{arccos} x & \text{за } -1 \leq x \leq -\frac{1}{2}. \end{cases}$$

$$\text{6.17. } \operatorname{arctg} \frac{x-1}{x+1} = \begin{cases} \operatorname{arctg} x - \frac{\pi}{4} & \text{за } x > -1, \\ \operatorname{arctg} x + \frac{3\pi}{4} & \text{за } x < -1. \end{cases}$$

$$\text{6.18. } \operatorname{arcsin} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = \begin{cases} \operatorname{arccos} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} & \text{за } x \geq 0, \\ \pi - \operatorname{arccos} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} & \text{за } x \leq 0. \end{cases}$$

$$\text{6.19. а) } \sin(\operatorname{arctg} x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}; \text{ б) } \sin(\operatorname{arctg} x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}};$$

$$\text{в) } \cos(\operatorname{arctg} x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}; \text{ г) } \cos(\operatorname{arctg} x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}};$$

$$\text{д) } \operatorname{tg}(\operatorname{arcsin} x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}, \quad |x| < 1; \text{ е) } \operatorname{tg}(\operatorname{arccos} x) = \frac{\sqrt{1-x^2}}{x},$$

$|x| \leq 1, x \neq 0$ .

Решение. а) Разгледайте правоъгълен триъгълник с дължина на единия катет  $x$ , на другия — 1. Острият ъгъл срещу катета с

при  $xy > 1$  и  $x > 0$ ;  $\varepsilon = -1$  при  $xy > 1$  и  $x < 0$ ;

в)  $\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} y = \operatorname{arctg} \frac{x+y}{xy-1} + \varepsilon \pi$ , където  $\varepsilon = 0$  при  $x+y > 0$  и  $\varepsilon = 1$  при  $x+y < 0$ .

Решение. б) Нека  $\operatorname{arctg} x = \alpha$  и  $\operatorname{arctg} y = \beta$ . Тогава  $\operatorname{tg} \alpha = x$ ,  $\operatorname{tg} \beta = y$ ,  $\alpha, \beta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ ,  $-\pi < \alpha + \beta < \pi$  и  $\operatorname{arctg} \frac{x+y}{1-xy} + \varepsilon \pi = \operatorname{arctg} (\operatorname{tg}(\alpha + \beta)) + \varepsilon \pi$ . Ще приложим зад. 6.8, б). Нека  $xy < 1$ . Тогава  $\operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta < 1$ ,  $\sin \alpha \sin \beta < \cos \alpha \cos \beta$ ,  $\cos(\alpha + \beta) > 0$ , т.е.  $-\frac{\pi}{2} < \alpha + \beta < \frac{\pi}{2}$ ,  $\operatorname{arctg} (\operatorname{tg}(\alpha + \beta)) = \alpha + \beta$  и равенството е изпълнено при  $xy < 1$ . Останалите случаи се разглеждат аналогично.

6.23. Докажете, че:

$$а) \operatorname{arcsin} \frac{1}{2} \sqrt{2 - \sqrt{2-2x}} = \frac{\pi}{8} + \frac{1}{4} \operatorname{arcsin} x, \quad |x| \leq 1;$$

$$б) \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} = \frac{\pi}{4} + \frac{\operatorname{arcsin} x}{2}, \quad |x| \leq 1;$$

$$в) \operatorname{arcsin} \frac{1}{2} (\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}) = \frac{\operatorname{arcsin} x}{2}, \quad |x| \leq 1.$$

6.24. Докажете, че ако  $|x| \leq 1$  и  $xy \leq 0$  или  $x^2(y^2+1) \leq 1$ , е вярно равенството

$$\operatorname{arcsin} x + \operatorname{arctg} y = \operatorname{arcsin} \frac{x+y\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1+y^2}}.$$

6.25. Докажете, че:

$$а) \operatorname{arctg} x - \operatorname{arctg} y = \operatorname{arctg} \frac{x-y}{1+xy}, \quad x, y > 0;$$

$$б) \operatorname{arctg} x - \operatorname{arctg} y = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} \frac{y-x}{1+xy}, \quad x, y > 0;$$

$$в) \operatorname{arctg} \frac{x \cos \varphi}{1-x \sin \varphi} - \operatorname{arctg} \frac{x - \sin \varphi}{\cos \varphi} = \varphi, \quad \varphi \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right),$$

$1-x \sin \varphi > 0$ ;

$$г) \operatorname{arctg} \frac{1-x \sin \varphi}{x \cos \varphi} - \operatorname{arctg} \frac{\cos \varphi}{x - \sin \varphi} = \varphi, \quad \varphi \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right),$$

$1-x \sin \varphi < 0$  или  $\varphi \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ ,  $1-x \sin \varphi > 0$ .

6.26. Нека  $n \in \mathbb{N}$ . Докажете равенствата:

$$а) \operatorname{arctg} \frac{1}{3} + \operatorname{arctg} \frac{1}{7} + \dots + \operatorname{arctg} \frac{1}{1+n+n^2} = \operatorname{arctg} \frac{n}{n+2};$$

$$б) \operatorname{arctg} \frac{1}{2 \cdot 1^2} + \operatorname{arctg} \frac{1}{2 \cdot 2^2} + \dots + \operatorname{arctg} \frac{1}{2n^2} = \operatorname{arctg} \frac{n}{n+1} + (n-1) \frac{\pi}{2}.$$

Упътване. Доказателството извършете по индукция, като използвате зад. 6.25, а) и б).

6.27. Нека  $T_n(x) = \cos(n \operatorname{arccos} x)$ ,  $x \in [-1, 1]$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$U_n(x) = \frac{\sin((n+1) \operatorname{arccos} x)}{\sqrt{1-x^2}}, \quad x \in (-1, 1).$$

Докажете, че  $T_n$  и  $U_n$  са полиноми от  $n$ -та степен със старши коефициенти съответно  $2^{n-1}$  и  $2^n$ .

$T_n$  и  $U_n$  се наричат полиноми на Чебишов.

6.28. Докажете, че полиномите на Чебишов  $T_n$  и  $U_n$  дефинирани в зад. 6.27, удовлетворяват следните рекурентни връзки:

$$а) T_{n+1}(x) - 2xT_n(x) + T_{n-1}(x) = 0;$$

$$б) U_{n+1}(x) - 2xU_n(x) + U_{n-1}(x) = 0.$$

Упътване. Вж. зад. 4.10.

6.29. Покажете, че  $C_n(x) = \frac{1}{2^{n-1}} T_n(x)$  е полином със старши коефициент единица и  $|C_n(x)| \leq \frac{1}{2^{n-1}}$  за  $x \in [-1, 1]$ .



6.30. Нека  $C_n$  е полиномът, дефиниран в зад. 6.29. Покажете, че съществуват  $n+1$  точки  $-1 \leq x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n \leq 1$ , за които  $|C_n(x_k)| = \frac{1}{2^{n-1}}$  и  $C_n(x_k) \cdot C_n(x_{k+1}) < 0$ .

Точките  $x_0, x_1, \dots, x_n$  от зад. 6.30 се наричат чебишов алтернанс.

6.31. Нека  $P$  е полином от степен  $n$  със старши коефициент единица, за който  $|P(x)| \leq \frac{1}{2^{n-1}}$  за  $x \in [-1, 1]$ . Покажете, че  $P(x) =$

$C_n(x)$ , където  $C_n$  е дефиниран в зад. 6.29.  
Упътване. Разгледайте полинома  $R(x) = C_n(x) - P(x)$ . Нека  $x_0, x_1, \dots, x_n$  е чебишовият алтернанс за  $C_n$  (зад. 6.29). Покажете, че  $R$  съвпада с интерполационния полином на Лагранж за точките  $(x_0, R(x_0)), (x_1, R(x_1)), \dots, (x_n, R(x_n))$ . Като имате предвид степента на  $R$ , покажете, че коефициентът пред  $n$ -тата степен на интерполационния полином е нула. Използвайте това, за да покажете, че  $R(x_0) = R(x_1) = \dots = R(x_n) = 0$ .

## § 1. Основни свойства на числовите редици

Ако на всяко естествено число  $n$  е съставено по някакъв начин числото  $a_n$ , казваме, че е определена редицата  $a_1, a_2, a_3, \dots$ , която за по-кратко означаваме с  $\{a_n\}$ .

Казваме, че  $a$  е точка на съгъстяване за редицата  $\{a_n\}$ , ако всяка околност на  $a$  съдържа безбройно много членове на редицата. Да припомним, че околност на една точка е всеки отворен интервал, който съдържа точката.

1.1. Намерете точките на съгъстяване на редиците:

- а)  $x_{2k} = a, x_{2k+1} = b, a \neq b$ ;
- б)  $x_1 = 1, x_2 = 2, \dots, x_k = k, x_{k+1} = 1, x_{k+2} = 2, \dots$  ( $x_k = k, x_{k+r} = r, 0 < r \leq k-1$ );
- в)  $1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, \dots$

Теорема (Болцано—Вайерштрас). Всяка ограниченена редица има поне една точка на съгъстяване.

Казваме, че  $\{b_k\}$  е подредица на  $\{a_n\}$ , ако  $b_k = a_{n_k}$ , където  $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ . Казваме, че редицата  $\{a_n\}$  е сходяща, ако е ограниченена и има единствена точка на съгъстяване (първа дефиниция на сходяща редица).

Казваме, че редицата  $\{a_n\}$  е сходяща, ако съществува число  $a$  такова, че за всяко  $\varepsilon > 0$  може да се намери число  $v$  със свойството — за всяко  $n > v, n \in \mathbb{N}$ , е изпълнено  $|a_n - a| < \varepsilon$  (втора дефиниция за сходяща редица, е-дефиниция или дефиниция на Коши).

1.2. Покажете, че двете дефиниции на сходяща редица са еквивалентни, т.е. ако една редица е сходяща според първата дефиниция, то за единствената ѝ точка на съгъстяване е изпълнено условието от втората дефиниция и обратно, ако една редица е сходяща според втората дефиниция, то тя е ограниченена и  $a$  е единствената ѝ точка на съгъстяване.

Единствената точка на съгъстяване на една сходяща редица или точката, за която е изпълнено условието от втората дефиниция, наричаме граница на редицата. Ако  $a$  е граница на  $\{a_n\}$ , казваме, че  $\{a_n\}$  клони към  $a$ , и това изразяваме кратко чрез

$$\text{символа } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \text{ или } a_n \rightarrow a.$$

1.3. Докажете, че ако  $a$  е точка на съгъвяване за  $\{a_n\}$ , то съществува подредица на  $\{a_n\}$ , която клони към  $a$ .

1.4. Докажете, че ако една редица е сходяща, то всичките ѝ подредици са сходящи и имат една и съща граница.

1.5. Постройте редица, която да има за точки на съгъвяване всички точки от интервала  $[0, 1]$ .

1.6. Докажете чрез дефиницията на Коши, че:

а)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$ ;      б)  $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0, 0 < q < 1$ ;

в)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^k} = 0, k \in \mathbb{N}$ ;      г)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = 0$ ;

д)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+n^2} = 0$ ;      е)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n\sqrt[n]{n!}} = 0$ .

Решение. а) Избираме произволно  $\varepsilon > 0$ . Търсим  $n$  такава, че при  $n > n$

да имаме  $\left| \frac{n}{n+1} - 1 \right| < \varepsilon$ . За всяко  $n \in \mathbb{N}$  имаме

$$(1) \quad \left| \frac{n}{n+1} - 1 \right| = \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}.$$

Да изберем  $n = \frac{1}{\varepsilon}$ . Нека сега  $n > n$ . Тогава  $\frac{1}{n} < \varepsilon$  и от (1) за

всяко  $n \in \mathbb{N}$  получаваме  $\left| \frac{n}{n+1} - 1 \right| < \varepsilon$ .

б) Нека  $\varepsilon > 0$  и  $q = \frac{1}{Q}, Q > 1, Q = 1 + \alpha, \alpha > 0$ . От неравенст-

вого на Бернули (зад. 3.6 от гл. 0) следва, че

$$(1 + \alpha)^n \geq 1 + \alpha n \text{ и } q^n = \frac{1}{(1 + \alpha)^n} \leq \frac{1}{1 + \alpha n}.$$

Но  $\frac{1}{1 + \alpha n} < \varepsilon$  за  $n > \frac{1}{\alpha} \left( \frac{1}{\varepsilon} - 1 \right)$ . Следователно  $n = \frac{1}{\alpha} \left( \frac{1}{\varepsilon} - 1 \right)$  е търсеното число.

е) Вж. зад. 3.16 от гл. 0.

Една редица се нарича безкрайно малка, ако е сходяща и клони към нула.  
1.7. Докажете, че редицата  $\{a_n\}$  е безкрайно малка тогава и само тогава, когато  $\{a_n\}$  е безкрайно малка. Покажете, че следващите редици са безкрайно малки:

а)  $a_n = \frac{(-1)^n}{n+2}$ ;      б)  $a_n = \frac{1}{(-1)^n n+1}$ ;      в)  $a_n = q^n, -1 < q < 1$ .

1.8. Докажете, че ако  $\{a_n\}$  е безкрайно малка редица, а  $\{b_n\}$  е ограничена, то  $\{a_n b_n\}$  е безкрайно малка.

Решение. Да изберем  $\varepsilon > 0$ . Редицата  $\{b_n\}$  е ограничена, следователно съществува константа  $K > 0$  такава, че  $|b_n| \leq K, n \in \mathbb{N}$ .

Числото  $\frac{\varepsilon}{K}$  е положително. Следователно съществува  $n$ , за което при  $n > n$  е изпълнено  $|a_n| < \frac{\varepsilon}{K}$ . За същите стойности на  $n$  имаме  $|a_n b_n| < \varepsilon$ .

1.9. Намерете границите на редиците с общ член съответно:

а)  $a_n = \frac{\sin(n!)}{n}$ ;      б)  $a_n = \frac{\operatorname{arctg}(n+1)}{n^2+1}$ ;

в)  $a_n = \frac{\operatorname{arcsin} \frac{1}{n}}{n}$ ;      г)  $a_n = \frac{\cos(n^2+n+1)}{n - \sqrt{2}}$ .

Ако  $a_n \rightarrow a$  и  $b_n \rightarrow b$ , то:

- 1)  $a_n + b_n \rightarrow a + b$ .
- 2)  $C a_n \rightarrow C a, C = \text{const.}$
- 3)  $a_n b_n \rightarrow a b$ .
- 4) Ако  $b \neq 0$ , то  $b_n \neq 0$  при достатъчно големи стойности на  $n$ , т.е. при  $n > k$  (покажете го), и можем да образуваме редицата  $\frac{a_n}{b_n}$ , която е сходяща и

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}.$$

5) Ако  $a_n \leq b_n$ , то  $a \leq b$ . Обърнете вниманието, че от  $a_n < b_n$  за всяко  $n$  не следва, че  $a < b$ . Например, ако  $a_n = \frac{1}{n+1}, b_n = \frac{1}{n}$ , то  $a^n < b^n$ , но

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0.$$



6) Ако  $a = b$  и за елементите на редицата  $(c_n)$  е изпълнено  $a_n \leq c_n \leq b_n$ , то  $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a = b$ .

1.10. Нека  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ . Намерете  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ , ако

а)  $b_n = \frac{a_n^3 - 6a_n^2 + 11a_n - 6}{a_n^2 - 8a_n + 12}$ ,  $a = 2$ ,  $a_n \neq 2$ ,  $a_n \neq 6$ ;

б)  $b_n = \frac{a_n^2 - (a+1)a_n + a}{a_n - a}$ ,  $a_n \neq a$ ;

в)  $b_n = \frac{2a_n^2 - aa_n}{a_n^2 - a_n + 1}$ .

1.11. Намерете границите на следните редици:

а)  $x_n = \frac{n+3}{n^3+4}$ ; б)  $x_n = \frac{n^3+n+1}{n^3-n+2}$ ; в)  $x_n = \sum_{k=1}^n (1 + \frac{k}{n})n$ ;

г)  $x_n = \frac{a_0 n^k + a_1 n^{k-1} + \dots + a_k}{b_0 n^l + b_1 n^{l-1} + \dots + b_l}$ ,  $l \geq k$ .

Решение. г)  $x_n = \frac{a_0 + \frac{a_1}{n} + \dots + \frac{a_k}{n^k}}{n^{l-k} (b_0 + \frac{b_1}{n} + \dots + \frac{b_l}{n^l})}$ . Ако  $l > k$ ,

то  $\frac{1}{n^{l-k}} \rightarrow 0$  и по правилата за действия със сходящи редици получаваме

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ . При  $l = k$  получаваме  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{a_0}{b_0}$ .

Казваме, че редицата  $(a_n)$  клони към безкрайност, и пишем  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$  или  $a_n \rightarrow \infty$ , ако за всяко число  $A$  съществува  $v$  такава, че за  $n > v$  е изпълнено  $a_n > A$ .

Казваме, че редицата  $(a_n)$  клони към минус безкрайност, ако  $\lim_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = \infty$ .

Казваме, че редицата  $(a_n)$  е безкрайно голяма, ако  $|a_n| \rightarrow \infty$ .

1.12. Покажете, че съществува безкрайно голяма редица, която не клони нито към безкрайност, нито към минус безкрайност.

1.13. Нека  $(a_n)$  е безкрайно голяма редица. Покажете, че редицата  $(\frac{1}{a_n})$  е безкрайно малка. Вярно е и обратното: ако  $(b_n)$  е

безкрайно малка редица и  $b_n \neq 0$ , то  $(\frac{1}{b_n})$  е безкрайно голяма.

1.14. Нека  $a_n \rightarrow \infty$ , а  $b_n \rightarrow l \neq 0$ . Покажете, че редицата  $(a_n b_n)$  е безкрайно голяма и  $a_n b_n \rightarrow \infty$  при  $l > 0$  и  $a_n b_n \rightarrow -\infty$  при  $l < 0$ .

Решение. Нека  $l > 0$ . Да изберем  $A > 0$ . Нека  $\varepsilon$  е такава положително число, че  $l - \varepsilon > 0$ . Избираме  $v$  такава, че при  $n > v$  да имаме  $|b_n - l| < \varepsilon$ , т.е.  $l - \varepsilon < b_n < l + \varepsilon$ . Нека  $v_1$  е такава, че при  $n > v_1$  е изпълнено  $a_n > \frac{A}{l - \varepsilon}$ . Числата  $v$  и  $v_1$  можем да изберем, тъй като  $b_n \rightarrow l$ , а  $a_n \rightarrow \infty$ . Тогава за  $n > \max(v, v_1)$  е изпълнено  $a_n b_n > A$ . Аналогично се разглежда случаят  $l < 0$ .

1.15. Нека  $x_n = \frac{a_0 n^k + a_1 n^{k-1} + \dots + a_k}{b_0 n^l + b_1 n^{l-1} + \dots + b_l}$ ,  $l < k$ ,  $a_0 b_0 \neq 0$ .

Покажете, че  $(x_n)$  е безкрайно голяма редица, като  $x_n \rightarrow \infty$  при  $a_0 b_0 > 0$  и  $x_n \rightarrow -\infty$  при  $a_0 b_0 < 0$ .

Упътване. Приложете предишната задача, като предварително покажете, че  $n^p \rightarrow \infty$ ,  $p \in \mathbb{N}$ .

1.16. Намерете границите на редиците с общ член:

а)  $a_n = \frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \dots + \frac{n}{n^2}$ ;

б)  $a_n = \frac{1^2}{n^3} + \frac{2^2}{n^3} + \dots + \frac{n^2}{n^3}$ ;

в)  $a_n = \frac{1^k + 2^k + \dots + n^k}{n^{k+1}}$ ,  $k \in \mathbb{N}$ ;

г)  $a_n = \frac{1^k + 2^k + \dots + n^k}{n^k} - \frac{n}{k+1}$ ,  $k \in \mathbb{N}$ .



Упътване. Вж. зад. 5.12 от предишната глава.

Казваме, че редицата  $\{a_n\}$  е фундаментална или редица на Коши, ако за всяко  $\varepsilon > 0$  съществува такова число  $\nu$ , че за всеки  $n, m \in \mathbb{N}$ ,  $n > \nu$ ,  $m > \nu$  е изпълнено  $|a_n - a_m| < \varepsilon$ .

Една редица е сходяща тогава и само тогава, когато е фундаментална.

1.17. Нека  $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$ . Докажете, че  $\{a_n\}$  не е сходяща.

Решение. Ще покажем, че редицата не е фундаментална. За тази цел е достатъчно да посочим положително число  $\varepsilon_0$ , за което не може да се намери съответно  $\nu$ , т.е. каквото и число  $\nu$  да изберем, съществуват поне две числа  $n, m \in \mathbb{N}$ ,  $n > \nu$ ,  $m > \nu$ , за които  $|a_n - a_m| \geq \varepsilon_0$ . Да разгледаме  $a_{2n} - a_n$

$$= \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} > n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

Нека  $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$ , а  $\nu$  е произволно и  $n > \nu$ . Тогава  $2n > \nu$  и

$$|a_{2n} - a_n| > \frac{1}{2} = \varepsilon_0.$$

1.18. Нека  $a > 0$  и  $k \in \mathbb{N}$ . Покажете, че съществува единствено реално положително число  $x$  такова, че  $x^k = a$ .

Решение. Лесно се убеждаваме, че повече от едно такова число не може да има. Наистина да допуснем, че  $x^k = y^k = a$ ,  $x \neq y$  и  $x > 0$ ,  $y > 0$ . Тогава

$$x^k - y^k = 0 = (x - y)(x^{k-1} + x^{k-2}y + \dots + y^{k-1}).$$

Но  $x^{k-1} + x^{k-2}y + \dots + y^{k-1} > 0$ , следователно  $x - y = 0$ .

Сега ще покажем, че такова  $x$  съществува, като построим подходяща сходяща редица, чиято граница е търсеното число. Нека  $n \in \mathbb{N}$ . Има само краен брой естествени числа  $p$ , за които  $p^k \leq an^k$ .

Нека  $p_n$  е най-голямото от тях. Да разгледаме редицата  $x_n = \frac{p_n}{n}$ .

От дефиницията на  $p_n$  е ясно, че  $\left(\frac{p_n}{n}\right)^k \leq a < \left(\frac{p_n+1}{n}\right)^k$ , т.е.

$$(2) \quad x_n^k \leq a < \left(x_n + \frac{1}{n}\right)^k.$$

Ако  $m$  с друго естествено число, имаме пак  $\left(\frac{p_m}{m}\right)^k \leq a <$

$$\left(\frac{p_m+1}{m}\right)^k. \text{ Следователно } \left(\frac{p_n}{n}\right)^k < \left(\frac{p_m+1}{m}\right)^k, \text{ откъдето } \frac{p_n}{n} - \frac{p_m}{m} <$$

$\frac{1}{m}$ , тъй като от  $y^k > z^k$  следва  $y > z$  при  $y > 0$ ,  $z > 0$ . Аналогично

получаваме  $\frac{p_m}{m} - \frac{p_n}{n} < \frac{1}{n}$  и следователно

$$\left| \frac{p_n}{n} - \frac{p_m}{m} \right| < \frac{1}{n} + \frac{1}{m}, \text{ т.е. } |x_n - x_m| < \frac{1}{n} + \frac{1}{m}.$$

Нека  $\varepsilon$  е произволно положително число. Тъй като  $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ ,

съществува  $\nu$  такова, че за всяко  $n > \nu$  е изпълнено  $\frac{1}{n} < \frac{\varepsilon}{2}$ .

Нека сега  $n, m \in \mathbb{N}$ ,  $n > \nu$ ,  $m > \nu$ . Тогава  $\frac{1}{n} < \frac{\varepsilon}{2}$ ,  $\frac{1}{m} < \frac{\varepsilon}{2}$

и  $|x_n - x_m| < \varepsilon$ , което показва, че редицата  $\{x_n\}$  е фундаментална, а следователно и сходяща. Да означим с  $x$  границата ѝ. Като извършим граничен преход в (2), прилагайки 1), 3) и 5), получаваме

$$x^k \leq a \leq x^k, \text{ т.е. } x^k = a. \text{ Числото } x \text{ се означава с } \sqrt[k]{a} \text{ или } a^{\frac{1}{k}}.$$

Ако  $a = 0$ , под  $\sqrt[k]{a}$  ще разбираме пак нула.

1.19. Нека  $\{a_n\}$  е сходяща редица от неотрицателни числа и

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l. \text{ Нека } k \in \mathbb{N}. \text{ Докажете, че редицата } b_n = \sqrt[k]{a_n}$$

също е сходяща и  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \sqrt[k]{l}$ .

Решение. Разгледайте сами случая  $l = 0$ . Ще предполагаме, че  $l > 0$ . Нека  $\varepsilon > 0$ . Като приложим формулата  $x^k - y^k =$

$(x-y)(x^{k-1} + \dots + y^{k-1})$  за  $x = \sqrt[k]{a_n}$  и  $y = \sqrt[k]{l}$ , получаваме

$$|\sqrt[k]{a_n} - \sqrt[k]{l}| = \frac{|a_n - l|}{\sqrt[k]{a_n^{k-1}} + \sqrt[k]{a_n^{k-2}l} + \dots + \sqrt[k]{l^{k-1}}} \leq \frac{|a_n - l|}{\sqrt[k]{l^{k-1}}}$$

Да изберем число  $\nu$  такова, че при  $n > \nu$  да е изпълнено  $|a_n - l| < \epsilon \sqrt[k]{l^{k-1}}$ . За същите стойности на  $n$  имаме  $|\sqrt[k]{a_n} - \sqrt[k]{l}| < \epsilon$ .

1.20. Намерете границите на следните редици:

а)  $a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ ;

б)  $a_n = \frac{\sqrt{n^2+n} - \sqrt{n}}{n + \sqrt[3]{n^2+1}}$ ;

в)  $a_n = \sqrt[8]{n^2+1} - 4\sqrt{n+1}$ ;

г)  $a_n = \sqrt[3]{1-8n^3} + 2n$ ;

д)  $a_n = n^{3/2}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1} - 2\sqrt{n})$ ;

е)  $a_n = \frac{\sqrt{n^2+3n+1}}{\sqrt{n^2+1}+n}$ ;

ж)  $a_n = \frac{\sqrt[3]{n^3+n+2}}{\sqrt[3]{1-n^6} - \sqrt[3]{n}}$ ;

з)  $a_n = \sqrt{n^2+n+1} - \sqrt{n^2-n+1}$ ;

и)  $a_n = \frac{1+3+5+\dots+(2n-1)}{\sqrt{n^4+n^2+1}}$ ;

к)  $a_n = \sqrt{3n^2+2n} - \sqrt{3n^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^n}$ .

Решение. а)  $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \rightarrow 0$ ;

б)  $\frac{\sqrt{n^2+n} - \sqrt{n}}{n + \sqrt[3]{n^2+1}} = \frac{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - \frac{1}{\sqrt{n}}}{1 + \sqrt[3]{\frac{1}{n} + \frac{1}{n^3}}} \rightarrow 1$ .

1.21. Нека  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ,  $a_n \neq 0$ . Намерете  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ , ако:

а)  $b_n = \frac{\sqrt[3]{1+a_n} - 1}{a_n}$ ;

б)  $b_n = \frac{\sqrt{1+a_n} - \sqrt{1+a_n^2}}{\sqrt{1+a_n} - 1}$ ;

1.22. Намерете границите на редиците:

а)  $a_n = \frac{n^k}{a^n}$ ,  $a > 1$ ,  $k \in \mathbb{N}$ ; б)  $a_n = nq^n$ ,  $|q| < 1$ ;

в)  $a_n = \frac{a^n + b^n}{a^{n+1} + b^{n+1}}$ ,  $a, b > 0$ ;

г)  $a_n = 1 + q + q^2 + \dots + q^n$ ,  $|q| < 1$ ; д)  $a_n = \frac{a^n}{n!}$ .

Решение а) Нека  $a = 1 + \alpha$ ,  $\alpha > 0$  и  $n > k + 1$ . Тогава

$$(1 + \alpha)^n = 1 + n\alpha + \dots + \frac{n(n-1)\dots(n-k)}{(k+1)!} \alpha^{k+1} + \dots + \alpha^n$$

$$> \frac{n(n-1)\dots(n-k)}{(k+1)!} \alpha^{k+1} \text{ и } a_n = \frac{n^k}{(1+\alpha)^n} <$$

$$\frac{(k+1)! a^{k+1} n^k}{n(n-1)\dots(n-k)} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

Следователно  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .

- б) Приложете а).  
в) Ако  $a > b$ , то

$$a_n = \frac{1}{a} \frac{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^n}{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^{n+1}} \rightarrow \frac{1}{a} \quad n \rightarrow \infty$$

и следователно  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{\max(a, b)}$ .

- г) Вж. зад. 1.6, б) и § 2 от предишната глава.  
д) Нека  $k \in \mathbb{N}$ ,  $k > |a|$  и  $n > k$ . Тогава

$$\left| \frac{a^n}{n!} \right| = \frac{|a|^k}{k!} \cdot \frac{|a|^{n-k}}{(k+1)\dots(k+n)} < \frac{|a|^k}{k!} \left( \frac{|a|}{k+1} \right)^{n-k} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

Тъй като редицата  $b_n = \left( \frac{|a|}{k+1} \right)^{n-k}$  е безкрайно малка.

1.23. Докажете, че:

а)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1, a > 0$ ; б)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ .

Решение. а) Нека  $\alpha_n = \sqrt[n]{a} - 1$ . Да предположим, че  $a > 1$ . Тогава  $\alpha_n > 0$  и от неравенството на Бернули получаваме  $a = (1 + \alpha_n)^n \geq 1 + n\alpha_n$ . Следователно  $0 \leq \alpha_n \leq \frac{a-1}{n}$ . Тъй като

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a-1}{n} = 0$ , редицата  $|\alpha_n|$  е безкрайно малка и  $\sqrt[n]{a} \rightarrow 1$ . Ако

$a \leq 1$ , то  $\sqrt[n]{a} = \frac{1}{\sqrt[n]{\frac{1}{a}}}$  и пак  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{a}} = 1$ .

Забележка. Решете задачата по друг начин, като използвате неравенството между средното аритметично и средното геометрично (зад. 3.8 от гл. 0).

б) Нека пак  $\alpha_n = \sqrt[n]{n} - 1$ . Тогава

$$n = (1 + \alpha_n)^n = 1 + n\alpha_n + \frac{n(n-1)}{2} \alpha_n^2 + \dots + \alpha_n^n.$$

За  $n > 1$  имаме  $n > \frac{n(n-1)}{2} \alpha_n^2$  и  $0 < \alpha_n < \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{n-1}}$ .

откъдето пак получаваме, че  $\alpha_n \rightarrow 0$  и  $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$ . Може ли да се реши задачата чрез неравенството на Бернули?

1.24. Намерете границите на следните редици:

а)  $b_n = \sqrt[n]{a_n}$ , където  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$ ;

б)  $b_n = \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_k^n}$ ,  $a_1 > 0, a_2 > 0, \dots, a_k > 0$ ;

в)  $b_n = \sqrt[n]{n^k + a_1 n^{k-1} + \dots + a_k}$ ;

г)  $x_n = \sqrt[n]{1 + x^n + \left(\frac{x^2}{2}\right)^n}$ ,  $x \geq 1$ .

Решение. а) Нека  $\epsilon$  е такова положително число, че  $a - \epsilon > 0$ . Избираме  $\nu$  такова, че при  $n > \nu$  да е изпълнено  $|a_n - a| < \epsilon$ , т.е.  $\sqrt[n]{a - \epsilon} < \sqrt[n]{a_n} < \sqrt[n]{a + \epsilon}$ . От това неравенство чрез граничен преход, използвайки предишната задача, получаваме, че  $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow 1$ .

1.25. Намерете границите на следните редици:

а)  $a_n = \frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2} + \dots + \frac{n}{n^2+n}$ ;

б)  $a_n = \frac{n^2+1}{n^3+2n+1} + \frac{n^2+2}{n^3+2n+2} + \dots + \frac{n^2+n}{n^3+2n+n}$ ;



$$в) a_n = \frac{(2n)^2}{\sqrt{n^6+1}} + \frac{(2n)^2+1}{\sqrt{n^6+3}} + \dots + \frac{(2n)^2+n}{\sqrt{n^6+(2n+1)}}$$

Решение. а)  $\frac{n^2}{n^2+n} \leq a_n \leq \frac{n^2}{n^2+1}$ .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2+n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2+1} = 1.$$

Следователно  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$ .

1.26. Намерете границите на следните редици:

а)  $a_n = \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$ ;

б)  $a_n = \frac{(2^3-1)(3^3-1) \dots (n^3-1)}{(2^3+1)(3^3+1) \dots (n^3+1)}$ ;

в)  $a_n = (1+x)(1+x^2) \dots (1+x^{2^n})$ ,  $|x| < 1$ ;

г)  $a_n = \frac{a^n}{(1+a)(1+a^2) \dots (1+a^n)}$ ,  $a \neq -1$ ;

д)  $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$ ;

е)  $a_{n+1} = \frac{1}{n} \sum_{l=1}^n a_l$ ,  $a_1 = 1$ ;

ж)  $b_{n+1} = \frac{n}{n+1} b_n$ ,  $b_1 = \frac{1}{2}$ .

1.27. Докажете, че са разходящи следните редици:

а)  $a_n = \sin nx$ ,  $x \neq k\pi$ ,  $k \in \mathbf{Z}$ ;

б)  $a_n = \cos nx$ ,  $x \neq 2k\pi$ ,  $k \in \mathbf{Z}$ .

Решение. а) Да предположим, че редицата  $\{a_n\}$  е сходяща и  $a_n \rightarrow l$ . Но  $\sin nx + \sin(n+2)x = 2\sin(n+1)x \cos x$  и чрез граничен преход получаваме  $2l = 2l \cos x$ . Следователно  $l = 0$ , тъй като  $x \neq k\pi$  и  $\cos x \neq 1$ . От равенството

$$\sin(n+1)x = \sin nx \cos x + \cos nx \sin x$$

$$\cos nx = \frac{\sin(n+1)x - \sin nx \cos x}{\sin x}$$

Следователно редицата  $\{\cos nx\}$  също е сходяща и  $\cos nx \rightarrow 0$ . Но това е невъзможно, тъй като  $\cos^2 nx + \sin^2 nx = 1$ .

## § 2. Монотонни числови редици

Редицата  $\{a_n\}$  се нарича монотонно растяща (намалваща), ако  $a_n \leq a_{n+1}$  ( $a_n \geq a_{n+1}$ ) за всяко  $n \in \mathbf{N}$ . Всяка ограниченна монотонна редица е сходяща.

2.1. Докажете, че са сходящи редиците:

а)  $a_n = 1 + \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \dots + \frac{1}{(n-1)n}$ ;

б)  $a_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$ ;

в)  $a_n = 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!}$ ;

г)  $a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}$ ;

Решение. а)  $a_n = 1 + \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) = 2 - \frac{1}{n} \rightarrow 2$ .

б)  $\{a_n\}$  е монотонно растяща редица и от неравенството

$$a_n < 1 + \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \dots + \frac{1}{(n-1)n}$$

следва, че е ограниченна, следователно е сходяща.

в) Покажете, че  $\{a_n\}$  се мажорира ( $a_n \leq b_n$ ) от сходяща геометрична прогресия  $\{b_n\}$ ,  $b_n = 1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1}$ .

г) Покажете, че  $\{a_n\}$  е ограничена и монотонно растяща.

2.2. Докажете, че:

а) ако  $\{a_n\}$  е монотонно растяща и не е ограничена, то  $a_n \rightarrow \infty$ ;

б) ако  $\{a_n\}$  е монотонно намаляваща и не е ограничена, то  $a_n \rightarrow -\infty$ ;

в) ако монотонна редица има сходяща подредица, то тя е сходяща.

Решение. а) Нека  $A$  е произволно число. Тъй като  $\{a_n\}$  не е ограничена,  $A$  не е горна граница за  $\{a_n\}$  и съществува  $k$  такава, че  $a_k > A$ . Нека  $n > k$ . Понеже редицата е монотонно растяща, имаме  $a_n \geq a_k > A$ .

2.3. Нека  $p_0, p_1, p_2, \dots$  е редица от цели числа,  $0 \leq p_i \leq 9$ . Докажете, че редицата

$$a_n = p_0 + \frac{p_1}{10} + \frac{p_2}{10^2} + \dots + \frac{p_n}{10^n}$$

е сходяща. Границата на тази редица се записва така:  $p_0 p_1 p_2 p_3 \dots$ , и се нарича безкрайна десетична дроб (има редици  $\{p_i\}$ , за които дробта може да се окаже и крайна).

Да припомним, че редицата с общ член  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  е монотонно растяща и ограничена. Границата ѝ се отбелязва с  $e$ .

2.4. Докажете, че:

а) редицата  $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$  е монотонно намаляваща и  $a_n \rightarrow e$ ;

б)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+k} = e$ ;

в)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \frac{1}{e}$ ;

г)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n = 1$ ;

д)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n = e^k$ ,  $k \in \mathbb{N}$ ;

е)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{k}{n}\right)^n = e^{-k}$ ,  $k \in \mathbb{N}$ ;

ж)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{kn}\right)^n = e^{\frac{1}{k}}$ ,  $k \in \mathbb{N}$ ;

з)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{kn}\right)^n = e^{-\frac{1}{k}}$ ,  $k \in \mathbb{N}$ .

Решение. а) Ще докажем монотонността:

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+2}} = \left(\frac{(n+1)^2}{n(n+2)}\right)^{n+1} \frac{n+1}{n+2}$$

$$= \left(1 + \frac{1}{n^2+2n}\right)^{n+1} \frac{n+1}{n+2} \geq \left(1 + \frac{n+1}{n^2+2n}\right) \frac{n+1}{n+2} \geq 1.$$

б)  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+k} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^k \rightarrow e$ .

в) За  $n > 1$  имаме  $\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \left(\frac{n-1}{n}\right)^n = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n} \rightarrow \frac{1}{e}$ .

г) Като имаме предвид в),

$$a_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow \frac{e}{e} = 1.$$

Можем да разсъждаваме и така:  $1 > a_n \geq 1 - \frac{n}{n^2}$  и  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$ .

д) Докажете по индукция, като използвате, че

$$\left(1 + \frac{k+1}{n}\right)^n = \left(\frac{n+k+1}{n}\right)^n = \left(\frac{n+k+1}{n+1}\right)^n \left(\frac{n+1}{n}\right)^n$$

ж) Приложете зад. 1.19 към редицата  $a_n^k = \left(1 + \frac{1}{kn}\right)^{kn} \rightarrow e$ .

2.5. Докажете, че редицата  $a_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$  е сходяща за всяко  $x$ .

Решение. Нека  $x > 0$ . Тогава  $\{a_n(x)\}$  е монотонно растяща редица и това се доказва по същия начин както за редицата  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ . Направете разсъжденията подробно. Нека  $k > x$  и  $k \in \mathbb{N}$ . Имаме  $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n$ , но редицата  $\left(1 + \frac{k}{n}\right)^n$  е сходяща съгласно зад. 2.4, л). Следователно тя е ограничена, а оттам и  $\{a_n(x)\}$  е ограничена, а оттам и сходяща. За  $x=0$  очевидно  $a_n(0)=1$  и  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n(0)=1$ . Нека  $x < 0$ . Тогава

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \frac{\left(1 - \frac{x}{n}\right)^n}{\left(1 - \frac{x}{n}\right)^n} = \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right)^n \frac{1}{\left(1 - \frac{x}{n}\right)^n}.$$

Редицата  $\left(1 - \frac{x}{n}\right)^n = a_n(-x)$  е сходяща, тъй като  $-x > 0$ . Нека  $n > |x|$ . От неравенството на Бернули получаваме  $1 - \frac{x^2}{n^2} \leq \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right)^n < 1$ . Следователно  $\left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right)^n \rightarrow 1$ , а

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n}$$

С това е доказано, че  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n(x)$  съществува за всяко  $x$ . Като имаме предвид зад. 2.4, д), е), ж), з), естествено е да въведем означението

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x.$$

2.6. Докажете следните свойства на  $e^x$ :

- а)  $e^x > 0$ ; б)  $e^0 = 1$ ; в)  $e^x > 1$ ,  $x > 0$ ;  
г)  $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$ ; д)  $e^{x+y} = e^x e^y$ ; е) ако  $x > y$ , то  $e^x > e^y$ ;

ж) нека  $x_n \rightarrow x$ , тогава  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x_n}{n}\right)^n = e^x$ .

Решение. а), б), в) Следват непосредствено от дефиницията на  $e^x$ .

г) Докажем го в процеса на решаването на зад. 2.5.

д) Нека  $a_n = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ ,  $b_n = \left(1 + \frac{y}{n}\right)^n$ , тогава

$$(1) \quad a_n b_n = \left[\left(1 + \frac{x}{n}\right)\left(1 + \frac{y}{n}\right)\right]^n = \left(1 + \frac{x+y}{n} + \frac{xy}{n^2}\right)^n.$$

Нека  $xy \geq 0$ . Тогава  $a_n b_n \geq \left(1 + \frac{x+y}{n}\right)^n$  за достатъчно големи стойности на  $n$  и като извършим граничен преход, получаваме

$$(2) \quad e^x e^y \geq e^{x+y}.$$

Но  $(-x)(-y) \geq 0$  и от (2) се получава  $e^{-x} e^{-y} \geq e^{-x-y}$ , което съгласно г) има вида  $\frac{1}{e^x} \cdot \frac{1}{e^y} \geq \frac{1}{e^{x+y}}$ . Като имаме предвид, че  $e^x > 0$  за всяко  $x$ , получаваме

$$(3) \quad e^{x+y} \geq e^x e^y.$$

От (2) и (3) следва, че  $e^{x+y} = e^x e^y$ . Аналогични разсъждения можем да направим и при  $xy < 0$ . Тогава  $a_n b_n \leq \left(1 + \frac{x+y}{n}\right)^n$  и получаваме  $e^x e^y \leq e^{x+y}$  и т.н.

е) Нека  $x > y$ . Тогава  $e^{x-y} > 1$ ,  $e^x > e^y$ .

ж) Нека  $x_n \rightarrow 0$  и  $x_n \leq 0$ . Тогава  $1 + x_n \leq \left(1 + \frac{x_n}{n}\right)^n \leq 1$  и чрез граничен преход получаваме  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x_n}{n}\right)^n = e^0 = 1$ .



Ако  $x_n \rightarrow 0$  и  $x_n \geq 0$ , то

$$\left(1 + \frac{x_n}{n}\right)^n = \left(1 - \frac{x_n^2}{n^2}\right)^n \frac{1}{\left(1 - \frac{x_n}{n}\right)^n} \rightarrow 1$$

(вж. разсъжденията в зад. 2.5.). Нека сега  $x_n \rightarrow 0$  с произволни стойности. Тъй като  $-|x_n| \leq x_n \leq |x_n|$ , то

$$\left(1 - \frac{|x_n|}{n}\right)^n \leq \left(1 + \frac{x_n}{n}\right)^n \leq \left(1 + \frac{|x_n|}{n}\right)^n$$

и пак получаваме, че  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x_n}{n}\right)^n = 1$ . Нека сега  $x_n \rightarrow x$ . Да

$$\text{разгледаме редицата } c_n = \left(1 + \frac{x_n}{n}\right)^n \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{x_n - x}{n}\right)^n$$

$$\text{Но } x_n - x - \frac{x_n x}{n} \rightarrow 0, \text{ следователно } c_n \rightarrow 1 \text{ и } \left(1 + \frac{x_n}{n}\right)^n$$

$$= \frac{c_n}{\left(1 - \frac{x}{n}\right)^n} \rightarrow \frac{1}{e^{-x}} = e^x.$$

**2.7.** Нека  $x > 0$  и  $l_n(x) = 2^n (2^{\sqrt{x}} - 1)$ . Докажете, че редицата  $\{l_n(x)\}$  е сходяща.

Решение. Нека  $x > 1$ . Ще покажем, че  $|l_n(x)|$  е намаляваща:

$$\begin{aligned} \frac{l_{n+1}(x)}{l_n(x)} &= \frac{2^{n+1} (2^{\sqrt{x}} - 1)}{2^n (2^{\sqrt{x}} - 1)} = \frac{2 (2^{\sqrt{x}} - 1) (2^{n+1} \sqrt{x} + 1)}{(2^{\sqrt{x}} - 1) (2^{n+1} \sqrt{x} + 1)} \\ &= \frac{2 (2^{\sqrt{x}} - 1)}{(2^{\sqrt{x}} - 1) (2^{n+1} \sqrt{x} + 1)} = \frac{2}{2^{n+1} \sqrt{x} + 1} < 1. \end{aligned}$$

Но  $l_n(x) > 0$ , тогава редицата е ограничена и монотонна, следователно е сходяща. Да означим с  $l(x)$  границата ѝ:  $l(1) = 0$  за

$$x = 1. \text{ Нека } 0 < x < 1, y = \frac{1}{x} > 1. \text{ Тогава}$$

$$l_n(x) = 2^n \left(2^{\sqrt{\frac{1}{y}}} - 1\right) = - \frac{2^n (2^{\sqrt{y}} - 1)}{2^{\sqrt{y}}} \rightarrow -l(y).$$

Тук използвахме, че  $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^{\sqrt{y}} = 1$ , което е следствие от зад. 1.23,

а). Едновременно докажем, че  $l\left(\frac{1}{x}\right) = -l(x)$ , където с  $l(x)$  сме означили  $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n (2^{\sqrt{x}} - 1)$ .

**2.8.** Докажете следните свойства на функцията  $l(x)$ :

а)  $e^{l(x)} = x$ ; б)  $l(xy) = l(x) + l(y)$ ;

в)  $l(x)$  е растяща функция.

Решение. а) Да разгледаме редицата  $\left(1 + \frac{l_n(x)}{2^n}\right)^{2^n}$ .

Съгласно зад. 2.6, ж) тя е сходяща и клони към  $e^{l(x)}$ . От друга страна,

$$\left(1 + \frac{l_n(x)}{2^n}\right)^{2^n} = \left(1 + \frac{2^n (2^{\sqrt{x}} - 1)}{2^n}\right)^{2^n} = x.$$

Следователно  $e^{l(x)} = x$ . Това равенство показва, че  $l(x)$  е обратна функция на  $e^x$  (вж. зад. 6.1 и 6.2 от гл. 0).

б) и в) Докажете чрез дефиницията на  $l(x)$  или като използвате, че  $l(x)$  е обратна функция на  $e^x$ , и зад. 2.6.

Функцията  $l(x)$  се нарича естествен логаритъм и обикновено се означава с  $\ln x$ .

**2.9.** Намерете границите на следните редици:

а)  $a_n = \left(\frac{n^2 - 1}{n^2 - 2n - 3}\right)^n$ ; б)  $a_n = \left(\frac{2n^2 + n - 1}{2n^2 + 6n}\right)^n$ ;

в)  $a_n = \left(\frac{n^2 + 5n + 6}{n^2 + 3n + 2}\right)^{\frac{n}{2}}$ .

След като разполагаме с функциите  $e^x$  и  $\ln x$ , дефинираме  $a^x$  при  $a > 0$  и  $x \in \mathbb{R}$  така:  $a^x = e^{x \ln a}$ .

Покажете, че  $a^x$  е растяща функция при  $a > 1$  и намаляваща при  $a < 1$ .

2.10. Нека  $\{x_n\}$  е редица от цели числа и  $x_n \rightarrow \infty$ . Докажете, че  $\left(1 + \frac{1}{x_n}\right)^{x_n} \rightarrow e$ .

2.11. Нека  $\{x_n\}$  е редица от реални числа и  $x_n \rightarrow \infty$ . Докажете, че  $\left(1 + \frac{1}{x_n}\right)^{x_n} \rightarrow e$ .

2.12. Докажете, че за всяко  $\epsilon \in \mathbb{N}$  е в сила

$$\frac{1}{n+1} \leq \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq \frac{1}{n}.$$

Упътване. Използвайте зад. 2.4, а) и 2.8, в).

2.13. Докажете, че редиците  $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n+1)$  и  $b_n =$

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n$$

са сходящи и имат обща граница.

Упътване. Използвайте зад. 2.12, за да покажете, че

$$a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n$$

и че  $|b_n - a_n|$  е безкрайно малка редица.

Общата граница на  $\{a_n\}$  и  $\{b_n\}$  се бележи с  $C$  и се нарича константа на Ойлер. Не се знае дали  $C$  е рационално или ирационално число ( $C = 0.577\dots$ ).

2.14. Намерете границата на редицата

$$c_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}$$

Решение. От зад. 2.1, г) знаем, че редицата  $\{c_n\}$  е сходяща. Нека  $b_n$  е както в зад. 2.13. Тогава

$$c_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} - \ln 2n + \ln 2n$$

$$-1 - \frac{1}{2} - \dots - \frac{1}{n} = b_{2n} - b_n + \ln 2.$$

Но  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_{2n} = C$ . Следователно  $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \ln 2$ .

### §3. Рекурентни редици

Често се срещат редици от следния вид: дадени са първите  $k$  елемента на редицата  $\{a_n\} - a_1, \dots, a_k$ , останалите се определят по indukция чрез формулата  $a_n = f(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_{n-k})$ , където  $f(x_1, x_2, \dots, x_k)$  е дадена функция на  $k$  променливи. Такива редици наричаме рекурентни.

3.1. Нека  $a_1 = \sqrt{2}$ ,  $a_{n+1} = \sqrt{2a_n}$ . Покажете, че редицата е сходяща, и намерете границата ѝ.

Решение. Да разгледаме

$$(1) \quad a_{n+1} - a_n = \sqrt{2a_n} - a_n = \frac{2a_n - a_n^2}{\sqrt{2a_n} + a_n} = \frac{a_n(2 - a_n)}{\sqrt{2a_n} + a_n}.$$

Тъй като  $a_n > 0$ , знакът на  $a_{n+1} - a_n$  се определя от знака на  $2 - a_n$ .

За  $a_1$  имаме  $0 < a_1 = \sqrt{2} < 2$ . Тогава  $a_2 = \sqrt{2a_1} < 2$ . Да предположим, че  $0 < a_k < 2$  за някое  $k$ . Тогава  $0 < a_{k+1} = \sqrt{2a_k} < 2$  и по метода на пълната математическа indukция получаваме  $0 < a_n < 2$  за всяко  $n \in \mathbb{N}$ . От (1) получаваме, че  $\{a_n\}$  е монотонно растяща и тъй като е ограничена, тя е сходяща. Като извършим граничен преход в равенството  $a_{n+1} = \sqrt{2a_n}$ , получаваме за  $l = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  уравнението  $l = \sqrt{2l}$ . Следователно възможните стойности на  $l$  са 0 и 2. Но редицата е монотонно растяща с първи елемент  $\sqrt{2}$  и не може да клони към 0. Следователно  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$ .

3.2. Покажете, че редицата  $\{a_n\}$  с първи елемент  $a_1 = \alpha$ ,  $0 < \alpha < 2$ ,  $a_{n+1} = \sqrt{2a_n}$  е сходяща и намерете границите ѝ.



3.3. Изследвайте в зависимост от  $\alpha$  поведението на редицата

$$a_1 = \alpha, \quad a_{n+1} = \frac{a_n^2 + 1}{2}.$$

Решение. Да предположим, че  $|a_n|$  е сходяща и  $l$  е границата ѝ. Чрез граничен преход в дадената рекурентна връзка получаваме

$$l = \frac{l^2 + 1}{2}, \quad \text{или } l = 1. \text{ Изразяваме чрез } a_n:$$

$$(2) \quad a_{n+1} - 1 = \frac{(a_n - 1)(a_n + 1)}{2},$$

$$(3) \quad a_{n-1} - a_n = \frac{(a_n - 1)^2}{2}.$$

Равенството (3) показва, че независимо от  $\alpha$  редицата е монотонно растяща и е сходяща тогава и само тогава, когато е ограничена.

Нека  $-1 < \alpha < 1$ . Тогава  $a_2 > 0$  и от (2) се вижда, че  $a_2 < 1$ . Да допуснем, че  $0 < a_k < 1$  за някое  $k \geq 2$ . От (2) следва, че  $0 < a_{k+1} < 1$ , и по индукция имаме  $0 < a_n < 1$  за всяко  $n \geq 2$ . Следователно редицата е сходяща и клони към 1.

Нека  $\alpha = 1$  или  $\alpha = -1$ . Тогава  $a_2 = 1$  и  $a_n = 1$  за  $n \geq 2$ ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1.$$

Ако  $\alpha < -1$ , или  $\alpha > 1$ , то  $a_2 - 1 = \frac{(\alpha - 1)(\alpha + 1)}{2} > 0$ , т.е.

$a_2 > 1$ . Ако допуснем, че редицата е ограничена, тя трябва да клони към 1, а това е невъзможно, тъй като тя е растяща и  $a_2 > 1$ . Следователно  $a_n \rightarrow \infty$  (вж. зад 2.2, а).

3.4. За кои стойности на  $\alpha$  е сходяща редицата  $\{a_n\}$  и колко е границата ѝ за тези стойности на  $\alpha$ , ако:

$$a) \quad a_1 = \alpha, \quad a_{n+1} = \frac{2a_n^2 + a_n + 4}{a_n + 6}, \quad \alpha \neq -6;$$

$$b) \quad a_1 = \alpha, \quad a_{n+1} = \frac{3a_n^2 + a_n + 6}{a_n + 9}, \quad \alpha \neq -9;$$

$$в) \quad a_1 = \alpha, \quad a_{n+1} = \sqrt[3]{\frac{2a_n^2}{a_n - 1}}, \quad \alpha \neq 1;$$

$$г) \quad a_1 = \alpha, \quad a_{n+1} = \frac{3a_n^2 + a_n}{a_n^2 + a_n + 1};$$

$$д) \quad a_1 = \alpha, \quad a_{n+1} = \frac{2a_n^2 + 3a_n + 12}{a_n + 10}, \quad \alpha \neq -1;$$

$$е) \quad a_1 = \alpha = 1, \quad a_{n+1} = \frac{2 + 2a_n}{2 + a_n};$$

$$ж) \quad a_1 = \alpha, \quad a_{n+1} = \frac{3a_n^2 + a_n + 2}{a_n + 5}, \quad \alpha \neq -5.$$

Решение. а) Да допуснем, че  $a_n \rightarrow l$ . Тогава  $l(l+6) = 2l^2 + l + 4$  и  $l = 1$  или  $l = 4$ . Да пресметнем разликите:

$$(4) \quad a_{n+1} - a_n = \frac{a_n^2 - 5a_n + 4}{a_n + 6} = \frac{(a_n - 1)(a_n - 4)}{a_n + 6},$$

$$(5) \quad a_{n+1} - 4 = \frac{(2a_n + 5)(a_n - 4)}{a_n + 6},$$

$$(6) \quad a_{n+1} - 1 = \frac{2(a_n - 1)(a_n + 1)}{a_n + 6},$$

$$(7) \quad a_{n+1} + 6 = \frac{2a_n^2 + 7a_n + 40}{a_n + 6}.$$

Ще разгледаме няколко случая за  $\alpha$ . Какви да бъдат те ни подсещат равенствата (4) — (7).

I. Нека  $\alpha > 4$ . Допускаме, че  $a_k > 4$ . Тогава от (5) следва, че  $a_{k+1} > 4$ , т.е.  $a_n > 4$  за всяко  $n \in \mathbb{N}$ . От (4) се вижда, че редицата в този случай е монотонно растяща. Допускането, че е ограничена води до противоречие, тъй като  $|a_n|$  не може да клони нито към 1, нито към 4. Следователно  $a_n \rightarrow \infty$ .

II. Нека  $\alpha = 4$ . Тогава  $a_n = 4$  за всяко  $n$  и  $a_n \rightarrow 4$ .

III. Нека  $1 \leq \alpha < 4$ . Пак по индукция от (5) и (6) получаваме, че всички елементи на редицата са от интервала  $[1, 4)$ . От (4) следва, че  $\{a_n\}$  е монотонно намаляваща. Следователно тя е сходяща и  $a_n \rightarrow 1$ .

IV. Нека  $-1 < \alpha < 1$ . Аналогично на предишните случаи получаваме  $0 < a_n < 1$  за  $n \geq 2$ . Редицата е монотонно растяща и  $a_n \rightarrow 1$ .

V. Нека  $-\frac{5}{2} < \alpha \leq -1$ . Тогава  $1 \leq a_2 < 4$  и резултатът е както в



III случай.

VI. За  $\alpha = -\frac{5}{2}$ ,  $a_2 = 4$  и нататък — както във II случай

VII. За  $-6 < \alpha < -\frac{5}{2}$  имаме  $a_2 > 4$  — вж. I случай.

VIII. За  $\alpha < -6$  от (7) получаваме, че  $a_n < -6$  за всяко  $n$ . Редицата е монотонно намаляваща, както се вижда от (4) и  $a_n \rightarrow -\infty$  (вж. зад. 2.2, б).

3.5. Нека за редицата  $\{a_n\}$  са изпълнени условията:

$$а) \quad a_1 = \alpha > 0, \quad \frac{1}{4}a_n^2 + \frac{1}{2}a_n + \frac{1}{4} \leq a_{n+1} \leq \frac{1}{2}a_n^2 + \frac{1}{2};$$

$$б) \quad a_1 = \alpha > 0, \quad \frac{1}{12}a_n^2 + \frac{1}{2}a_n + \frac{3}{4} \leq a_{n+1} \leq \frac{1}{6}a_n^2 + \frac{3}{2}.$$

За кои  $\alpha$  е сходяща редицата?

Решение. а.) Да предположим, че  $a_n \rightarrow l$ . Тогава

$$\frac{1}{4}l^2 + \frac{1}{2}l + \frac{1}{4} \leq l, \text{ или } (l-1)^2 \leq 0, \text{ т. е. } l=1. \text{ От неравенст-}$$

$$\text{вото } a_{n+1} - a_n \geq \frac{1}{4}a_n^2 - \frac{1}{2}a_n + \frac{1}{4} = \frac{1}{4}(a_n-1)^2$$

следва, че  $\{a_n\}$  е монотонно растяща. Ако  $\alpha > 1$ , то  $a_1 + 1 > 2$  и  $a_2 \geq$

$$\frac{1}{4}a_1^2 + \frac{1}{2}a_1 + \frac{1}{4} = \frac{1}{4}(a_1+1)^2 > 1. \text{ По индукция получаваме } a_n >$$

1. Редицата е монотонно растяща и неограничена. За  $0 < \alpha \leq 1$  от неравенствата  $\frac{1}{4}(a_n+1)^2 \leq a_{n+1} \leq \frac{1}{2}a_n^2 + \frac{1}{2}$

лесно се вижда, че  $0 < a_n \leq 1$ . Редицата е монотонно растяща и ограничена.  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$ .

3.6. Покажете, че редиците са сходящи и намерете границите им, ако:

$$а) \quad a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 1 + \frac{1}{1+a_n};$$

$$б) \quad a_1 = a, \quad a_{n+1} = a + \frac{b}{a+a_n}, \quad a, b > 0.$$

Решение. а) Лесно се вижда, че  $a_n > 0$ . Освен това

$$(8) \quad a_{n+1} - a_n = \frac{2 - a_n^2}{1 + a_n},$$

$$(9) \quad a_{n+1}^2 - 2 = \frac{(2 + a_n)^2}{(1 + a_n)^2} - 2 = \frac{2 - a_n^2}{(1 + a_n)^2}.$$

От (9) следва, че ако  $a_n \leq \sqrt{2}$ , то  $a_{n+1} \geq \sqrt{2}$  и обратното. Следователно

$$(10) \quad a_{2k+1} \leq \sqrt{2}, \quad a_{2k} \geq \sqrt{2}.$$

Неравенствата (10) ни навеждат на мисълта да образуваме разликата

$$(11) \quad a_{n+1} - a_{n-1} = \frac{2 - a_n^2}{1 + a_n} + \frac{2 - a_{n-1}^2}{1 + a_{n-1}} = (2 - a_n^2) \frac{2 + 2a_{n-1}}{(1 + a_{n-1})^2 (1 + a_n)}.$$

От (10) и (11) се получава, че  $|a_{2k+1}|$  е монотонно растяща редица, а  $|a_{2k}|$  — монотонно намаляваща и тъй като са ограничени, те са сходящи. Нека  $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k+1} = l$ ,  $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = m$ . От рекурентната връзка

получаваме за  $m$  и  $l$  системата

$$\begin{cases} l = \frac{2+m}{1+m} \\ m = \frac{2+l}{1+l} \end{cases}$$

Единственото положително решение на тази система е  $l=m=\sqrt{2}$ .

Следователно  $\{a_n\}$  е сходяща и  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sqrt{2}$ .

3.7. Изследвайте в зависимост от  $\alpha$  поведението на редиците:

$$а) \quad a_1 = \alpha > 0, \quad a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + \sqrt{a_n};$$

$$б) \quad a_1 = \alpha > 1, \quad a_{n+1} = 3 - \frac{2}{a_n};$$

$$в) a_1 = \alpha > \frac{3-\sqrt{5}}{2}, a_{n+1} = 3 - \frac{1}{a_n};$$

$$г) a_1 = \alpha > 0, a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n}.$$

3.8. Изследвайте в зависимост от  $\alpha$  поведението на редицата  $\{a_n\}$ , за която

$$a_1 = \alpha, a_{n+1} = \frac{4a_n^2 - 4a_n + 2}{a_n + 3}, \alpha \neq -3.$$

Упътване. За  $-\frac{1}{2} < \alpha < 2$  покажете, че  $\{a_{2k+1}\}$  и  $\{a_{2k}\}$  са монотонни редици, които имат обща граница. За тази цел докажете и използвайте, че  $\left| \frac{4a_n - 3}{a_n + 3} \right| < 1$  за  $n \geq 2$ .

3.9. Нека  $a > 0$  и  $k \in \mathbb{N}$ ,  $k > 1$ . Докажете, че редицата  $\{x_n\}$ , за която  $x_1 > 0$  и  $x_{n+1} = \frac{a - x_n^k}{kx_n^{k-1}} + x_n$ , е сходяща и  $\left( \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \right)^k = a$ .

3.10. Нека  $a_1 = a$ ,  $a_2 = b$ ,  $a_{n+1} = \frac{a_n + a_{n-1}}{2}$ . Намерете границата на редицата  $\{a_n\}$ .

Решение: От рекурентната връзка получаваме

$$a_{n+1} - a_n = -\frac{a_n - a_{n-1}}{2} = \dots = (-1)^{n-1} \frac{b-a}{2^{n-1}}.$$

Имаме

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + (a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \dots + (a_n - a_{n-1}) \\ &= a + (b-a) - \frac{1}{2}(b-a) + \dots + (-1)^{n-2} \frac{1}{2^{n-2}}(b-a) \\ &= a + (b-a) \frac{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}}{1 + \frac{1}{2}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a + (b-a) \frac{2}{3} = \frac{a+2b}{3}. \end{aligned}$$

3.11. Нека  $a_1 = a$ ,  $a_2 = b$ ,  $a_{n+1} = \lambda a_n + \mu a_{n-1}$ , където  $\lambda + \mu = 1$ ,  $|\mu| < 1$ . Намерете границата на редицата  $\{a_n\}$ .

3.12. Нека  $a > 0$ ,  $b \geq 0$ ,  $a \geq b$ . Покажете, че редиците  $\{a_n\}$  и  $\{b_n\}$  са сходящи и имат обща граница, ако:

$$а) a_1 = \frac{a+b}{2}, a_2 = \frac{a_1+b_1}{2}, \dots, a_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2}, \dots,$$

$$b_1 = \sqrt{ab}, b_2 = \sqrt{a_1 b_1}, \dots, b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}, \dots;$$

$$б) a_1 = \frac{a+b}{2}, a_2 = \frac{a_1+b_1}{2}, \dots, a_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2}, \dots,$$

$$b_1 = \frac{2ab}{a+b}, b_2 = \frac{2a_1 b_1}{a_1+b_1}, \dots, b_{n+1} = \frac{2a_n b_n}{a_n+b_n}, \dots$$

Упътване. Използвайте зад. 3.8 и 3.9 от гл. 0, за да покажете, че

$$b_n \leq b_{n+1} \leq a_{n+1} \leq a_n.$$

#### §4. Сходимость в смисъл на Чезаро. Теорема на Шолл

4.1. Нека  $\{a_n\}$  е сходяща редица с граница  $a$ . Разгледайте редицата с общ член  $b_n = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$ . Покажете, че  $\{b_n\}$  е сходяща и  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$ .

Решение. Ще използваме дефиницията на Коши за сходяща редица. Нека  $\varepsilon > 0$ . Избираме  $\nu$  такава, че  $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$  при всяко  $n > \nu$ . Да фиксираме  $k \in \mathbb{N}$  и  $k > \nu$ . Нека  $n > k$ . Тогава

$$\begin{aligned} |b_n - a| &= \left| \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n - na}{n} \right| \leq \frac{|a_1 - a| + \dots + |a_n - a|}{n} \\ &< \frac{|a_1 - a| + \dots + |a_{k-1} - a|}{n} + \frac{n-k+1}{2n} \varepsilon. \end{aligned}$$

Числото  $|a_1 - a| + \dots + |a_{k-1} - a|$  не зависи от  $n$ . Да го означим с

А. При  $n > \frac{2A}{\varepsilon}$  имаме  $\frac{A}{n} < \frac{\varepsilon}{2}$ . Нека  $v_0 = \max\left(\frac{2A}{\varepsilon}, k\right)$ .

За всяко  $n > v_0$  е изпълнено  $|b_n - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$ .

Една редица се нарича сходяща в смисъл на Чезаро, ако редицата  $b_n = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$  е сходяща. Зад. 4.1 показва, че ако една редица е сходяща в обичайния смисъл, тя е сходяща и в смисъл на Чезаро и има същата граница.

4.2. Докажете, че редицата  $a_n = \sin nx$ ,  $x \neq k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ , е сходяща в смисъл на Чезаро, въпреки че не е сходяща.

Упътване. Вж. зад. 3.18 от гл. 0 и зад. 1.27.

4.3. Намерете границите на редиците с общ член:

а)  $a_n = \frac{a + \sqrt{a} + \sqrt[3]{a} + \dots + \sqrt[n]{a}}{n}$ ,  $a > 0$ ;

б)  $a_n = \frac{1 + \sqrt{2} + \dots + \sqrt[n]{n}}{n}$ ;

в)  $b_n = \frac{a_n}{n}$ ; ако  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = l$ .

4.4. Нека  $a_n \rightarrow \infty$ . Докажете, че редицата с общ член

$$b_n = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$$

също клони към безкрайност.

4.5. Нека  $a_n > 0$  и  $a_n \rightarrow a$ . Докажете, че редицата

$$b_n = \frac{1}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}}$$

е сходяща и  $b_n \rightarrow a$ .

Решение.

$$\frac{1}{b_n} = \frac{1}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}}$$

Ако  $a \neq 0$ , то  $\frac{1}{b_n} \rightarrow \frac{1}{a}$ , както следва от зад. 4.1 и  $b_n \rightarrow a$ .

Ако  $a = 0$ , то  $\frac{1}{a_n} \rightarrow \infty$  (зад. 1.13) и  $\frac{1}{b_n} \rightarrow \infty$  (зад. 4.4).

Следователно  $b_n \rightarrow 0$ .

4.6. Нека  $a_n > 0$  и  $a_n \rightarrow a$ . Докажете, че редицата

$$b_n = \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}$$

също е сходяща и  $b_n \rightarrow a$ .

Упътване. Вж. зад. 3.8 и 3.9 от гл. 0, където е доказано, че

$$\frac{1}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$$

4.7. Нека  $a_n > 0$  и  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l$ . Докажете, че

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \sqrt[n]{a_n} = l.$$

Упътване. Приложете зад. 4.6.

4.8. Намерете границите на редиците с общ член:

а)  $a_n = \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$ ;

б)  $a_n = \frac{1}{n} [(2n+1)(2n+2)\dots(3n)]^{\frac{1}{n}}$

4.9. Нека  $\{a_n\}$  и  $\{b_n\}$  са сходящи редици с граници съответно  $a$  и  $b$ . Да се докаже, че редицата с общ член

$$x_n = \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1}{n}$$

е сходяща и  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = ab$ .

4.10 (I теорема на Шолц). Нека  $\{x_n\}$  и  $\{y_n\}$  са две редици от числа, като  $y_n \rightarrow \infty$  и  $y_{n+1} > y_n$ . Докажете, че ако

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = l, \text{ то } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = l.$$





Решение. Да предположим за определеност, че  $\{y_n\}$  е растяща редица. Тогава  $y_{n+1} > y_n$ . Нека  $\epsilon > 0$ . Съществува  $n$  такава, че при  $n > n$  имаме  $\left| \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} - l \right| < \frac{\epsilon}{2}$ . Нека  $k > n$  и  $n > k$ . Разсъжда-

вайки както в първата теорема на Шолц, получаваме неравенствата

$$\left( l - \frac{\epsilon}{2} \right) (y_{k+1} - y_k) < x_{k+1} - x_k < (y_{k+1} - y_k) \left( l + \frac{\epsilon}{2} \right),$$

.....

$$\left( l - \frac{\epsilon}{2} \right) (y_n - y_{n-1}) < x_n - x_{n-1} < (y_n - y_{n-1}) \left( l + \frac{\epsilon}{2} \right),$$

от които чрез събиране имаме

$$(4) \quad \left| \frac{x_n - x_k}{y_n - y_k} - l \right| < \frac{\epsilon}{2}.$$

Тъй като  $x_n \rightarrow 0$  и  $y_n \rightarrow 0$ , то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_k}{y_n - y_k} = \frac{x_k}{y_k}.$$

Извършвайки в (4) граничен преход по  $n$ , получаваме

$$\left| \frac{x_k}{y_k} - l \right| \leq \frac{\epsilon}{2} < \epsilon, \quad k > n,$$

което показва, че  $\frac{x_n}{y_n} \rightarrow l$ .

4.15. Намерете границата на редицата с общ член

$$a_n = \frac{1}{n+k} + \frac{1}{n+k+1} + \dots + \frac{1}{2n} - \ln 2, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Упътване. Вж. зад. 2.1, а) и 2.14.

### §5. Горна и долна точка на съгъстяване

Нека е дадена редицата  $\{a_n\}$ . От §1 знаем какво означава числото  $a$  да бъде точка на съгъстяване за редицата  $\{a_n\}$ . Знаем също, че всяка ограничена редица има точка на съгъстяване (теорема на Болцано-Вайерштрас). Но има редици — например 1, 2,

3, ..... които нямат точка на съгъстяване в този смисъл. Сега ще разширим понятието точка на съгъстяване така, че всяка редица да има точка на съгъстяване в разширения смисъл. Към множеството на реалните числа  $\mathbb{R}$  добавяме символите  $+\infty$  и  $-\infty$ , които се наричат несобствени точки.

Казваме, че  $+\infty$  е (несобствена) точка на съгъстяване за редицата  $\{a_n\}$ , ако всеки интервал от вида  $(a, +\infty)$ ,  $a \in \mathbb{R}$ , съдържа безбройно много елементи на редицата.

5.1. Дайте съответна дефиниция за това  $-\infty$  да бъде точка на съгъстяване на редица  $\{a_n\}$ . Докажете твърдението от зад. 1.3 за разширеното понятие точка на съгъстяване.

Точката  $+\infty$  ще си представяме най-лесно върху числовата права (съответно  $-\infty$  — най-ляво), т.е. ако  $x \in \mathbb{R}$ , то  $-\infty < x < +\infty$ . Ще ситаме, че  $-\infty \leq -\infty$  и  $+\infty \leq +\infty$ .

5.2. Докажете, че всяка редица има поне една точка на съгъстяване.

Нека  $S$  е множеството от точки на съгъстяване на редицата  $\{a_n\}$ . Ако  $S$  е ограничено отгоре, то числото  $\sup S$  ще наричаме горна точка на съгъстяване за  $\{a_n\}$  и ще я означаваме с  $\overline{\lim} a_n$ . Ако  $S$  не е ограничено отгоре, то  $\overline{\lim} a_n = +\infty$ . Ако  $S$  съдържа само  $-\infty$ , то  $\overline{\lim} a_n = -\infty$ . Аналогично дефинираме долна точка на съгъстяване за  $\{a_n\}$ ,  $\underline{\lim} a_n$ , като  $\inf S$ , ако  $S$  е ограничено отдолу; в противен случай това е някой от символите  $+\infty$  или  $-\infty$ . Следващата задача показва, че горната и долната точка на съгъстяване са наистина точки на съгъстяване.

5.3. Докажете, че:

- а)  $\overline{\lim} a_n$  е точка на съгъстяване за  $\{a_n\}$ ;
- б)  $\underline{\lim} a_n$  е точка на съгъстяване за  $\{a_n\}$ .

Решение. а) Ще разгледаме случая  $\overline{\lim} a_n < \infty$ . Нека  $\epsilon$  е произволно положително число. Ще покажем, че в околността  $(\overline{\lim} a_n - \epsilon, \overline{\lim} a_n + \epsilon)$  на точката  $\overline{\lim} a_n$  има безбройно много елементи на редицата  $\{a_n\}$ . Тъй като  $\overline{\lim} a_n - \epsilon$  не е горна граница за точките на съгъстяване на редицата, то съществува точка на съгъстяване  $a$  на  $\{a_n\}$ , за която  $\overline{\lim} a_n - \epsilon < a$ . Но  $a \leq \overline{\lim} a_n < \overline{\lim} a_n + \epsilon$ . Следователно

$$a \in (\overline{\lim} a_n - \epsilon, \overline{\lim} a_n + \epsilon)$$

и от дефиницията на точка на съгъстяване следва, че в околността се съдържат безбройно много елементи на редицата. С това е доказано, че  $\overline{\lim} a_n$  е точка на съгъстяване за  $\{a_n\}$ . Разгледайте сами случая  $\overline{\lim} a_n = \infty$ .

5.4. Намерете  $\overline{\lim} a_n$  и  $\underline{\lim} a_n$  за редиците:

- а)  $a_n = (1 + (-1)^n) \frac{n}{n+1}$ ;
- б)  $a_n = (-1)^n \left( \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \right) + \sin \frac{n\pi}{2} \ln 2$ ;



$$в) a_n = \frac{2n-1}{n} \cos^2 \frac{n\pi}{4};$$

$$г) a_0 = 0, a_{2n} = \frac{a_{2n-1}}{2}, a_{2n+1} = \frac{1}{2} + a_{2n}.$$

Упътване. Определете сподящите подредици и намерете всички точки на съгъстяване.

5.5 а) Нека  $A > \lim a_n$ . Докажете, че най-много краен брой елементи на редицата удовлетворяват неравенството  $a_n \geq A$ .

б) Нека  $B < \lim a_n$ . Докажете, че най-много краен брой елементи на редицата удовлетворяват неравенството  $a_n \leq B$ .

5.6. Нека  $\lim a_n = a$ . Докажете, че  $\lim a_n = a$ .

5.7. Докажете, че  $\lim (-a_n) = -\lim a_n$ .

5.8. Нека  $\{a_n\}$  и  $\{b_n\}$  са ограничени редици. Докажете, че:

$$а) \lim a_n + \lim b_n \leq \lim (a_n + b_n) \leq \lim a_n + \lim b_n;$$

$$б) \lim a_n + \lim b_n \leq \lim (a_n + b_n) \leq \lim a_n + \lim b_n.$$

Решение. а) Нека  $\gamma = \lim (a_n + b_n)$ . Съществува подредица  $\{a_{n_k} + b_{n_k}\}$  на  $\{a_n + b_n\}$ , клоняща към  $\gamma$ , тъй като  $\gamma$  е точка на съгъстяване за  $\{a_n + b_n\}$ . Нека  $\{a_{n_k}\}$  е сподяща подредица на  $\{a_n\}$  с граница  $a$ . Редицата  $\{a_{n_k}\}$  е подредица и на редицата  $\{a_{n_k} + b_{n_k}\}$  и  $a$  е точка на съгъстяване на  $\{a_{n_k}\}$ , следователно  $a \geq \lim a_{n_k}$ . Редицата  $\{b_{n_k}\}$  също е сподяща, както се вижда от равенството  $b_{n_k} = (a_{n_k} + b_{n_k}) - a_{n_k}$ . Да означим границата ѝ с  $b$ . Имаме  $b \geq \lim b_{n_k}$  и следователно

$$\lim (a_n + b_n) = \gamma = a + b \geq \lim a_n + \lim b_n,$$

с което първото неравенство е доказано. Ще го използваме, за да докажем второто. За редицата  $a_n = (a_n + b_n) + (-b_n)$  имаме

$$\begin{aligned} \lim a_n &\geq \lim (a_n + b_n) + \lim (-b_n) \\ &= \lim (a_n + b_n) - \lim b_n \end{aligned}$$

откъдето следва търсеното неравенство.

5.9. Нека  $a_n > 0$ . Докажете, че:

$$а) \lim a_n \geq \lim \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n};$$

$$б) \lim a_n \leq \lim \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}.$$

Решение. а) Ако  $\lim a_n = +\infty$ , неравенството е изпълнено.

От зад. 4.6 следва, че и при  $\lim a_n = 0$  неравенството също е вярно. Нека  $\lim a_n = a < \infty$  с  $\epsilon$  е положително число. От зад. 5.5 следва, че  $a_n < a + \epsilon$  за всички достатъчно

големи  $n$ . Ще покажем, че  $\sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} < a + 2\epsilon$  е изпълнено за всички  $n$  с изключение на краен брой. Нека  $k$  е такова естествено число, че при  $n > k$  е изпълнено  $a_n < a + \epsilon$ . Тогава

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} < \sqrt[n]{\overbrace{a_1 \dots a_k}^{(a+\epsilon)^k} (a+\epsilon)^{n-k}}.$$

От зад. 1.23, а) имаме  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\overbrace{a_1 \dots a_k}^{(a+\epsilon)^k}} = 1$ . Следователно съ-

ществува  $\nu$  такова, че при  $n > \nu$  е изпълнено  $\sqrt[n]{\overbrace{a_1 \dots a_k}^{(a+\epsilon)^k}} < 1 + \eta$ ,

където  $\eta$  избираме така, че  $(1 + \eta)(a + \epsilon) < a + 2\epsilon$ . Тогава за  $n > \max(k, \nu)$  имаме  $\sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} < a + 2\epsilon$  и тъй като  $\epsilon$  е произволно,

то

$$\lim \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \leq a.$$

5.10. Нека  $x_n > 0$ . Докажете, че:

$$а) \lim \frac{x_{n+1}}{x_n} \geq \lim \sqrt[n]{x_n};$$

$$б) \lim \frac{x_{n+1}}{x_n} \leq \lim \sqrt[n]{x_n}.$$

Упътване. Разгледайте редицата  $a_1 = x_1, a_2 = \frac{x_2}{x_1}$  и т. н. и приложете зад. 5.9.

5.11. Нека  $0 < s < t < 1$  и редицата  $\{a_n\}$  е дефинирана така:

$$a_{2k+1} = s^{k+1}, a_{2k} = t^k. \text{ Намерете } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \text{ и } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \text{ и ги сравнете}$$

$$\text{с } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \text{ и } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}.$$



# Граници и непрекъснатост на функции

## § 1. Основни дефиниции и някои техни приложения

Ще казваме, че точката  $x_0$  е точка на съгъване на множеството  $D$ , ако във всяка околност на  $x_0$  има точки  $x \in D$ ,  $x \neq x_0$ . Ясно е, че точката  $x_0$  е точка на съгъване на  $D$  тогава и само тогава, когато съществува редица от точки  $x_n \in D$ ,  $x_n \neq x_0$ , която клони към  $x_0$ . Да отбележим, че самата точка  $x_0$  може да не принадлежи на  $D$ .

Нека числовата функция  $f(x)$  е дефинирана в  $D$  и  $x_0$  е точка на съгъване на  $D$ . Дефиниция 1 (Хайне). Ще казваме, че функцията  $f(x)$  има лява граница  $A$  при  $x$ , клонящо към  $x_0$ , ако за всяка клоняща към  $x_0$  редица от числа  $x_n \in D$ ,  $x_n < x_0$ , съответната редица от функционални стойности  $f(x_n)$  клони към  $A$ . Това ще отбелязваме така:  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$ .

Дефиниция 2 (Хайне). Ще казваме, че функцията  $f(x)$  има лява граница  $A$  при  $x$ , клонящо към  $x_0$ , ако за всяка клоняща към  $x_0$  редица от числа  $x_n \in D$ ,  $x_n < x_0$ , съответната редица от функционални стойности  $f(x_n)$  клони към  $A$ . Това ще отбелязваме така:  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$ .

Дефиниция 3 (Хайне). Ще казваме, че функцията  $f(x)$  има дясна граница  $A$  при  $x$ , клонящо към  $x_0$ , ако за всяка клоняща към  $x_0$  редица от числа  $x_n \in D$ ,  $x_n > x_0$ , съответната редица от функционални стойности  $f(x_n)$  клони към  $A$ . Това ще отбелязваме така:  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$ .

Забележка. Ясно е, че при лява граница ще искаме да съществува редица от числа  $x_n \in D$ ;  $x_n < x_0$  и  $x_n \rightarrow x_0$ , т.е. точката  $x_0$  да бъде дясна точка на съгъване, а при дясна граница — точката  $x_0$  да бъде лява точка на съгъване на  $D$ .

Дефиниция 4 (Коши). Ще казваме, че функцията  $f(x)$  има лява граница  $A$  при  $x$ , клонящо към  $x_0$ , ако за всяко положително число  $\epsilon$  може да се намери положително число  $\delta$  (свентуално зависещо от  $\epsilon$ ) такова, че за всяко число  $x \in D$ , удовлетворяващо неравенствата  $0 < |x - x_0| < \delta$ , да бъде изпълнено  $|f(x) - A| < \epsilon$ .

Дефиниция 5 (Коши). Ще казваме, че функцията  $f(x)$  има лява граница  $A$  при  $x$ , клонящо към  $x_0$ , ако за всяко положително число  $\epsilon$  може да се намери положително число  $\delta$  такова, че за всяко число  $x \in D$ , удовлетворяващо неравенствата  $x_0 - \delta < x < x_0$ , да бъде изпълнено  $|f(x) - A| < \epsilon$ .

Дефиниция 6 (Коши). Ще казваме, че функцията  $f(x)$  има дясна граница  $A$  при  $x$ , клонящо към  $x_0$ , ако за всяко положително число  $\epsilon$  може да се намери положително число  $\delta$  такова, че за всяко число  $x \in D$ , удовлетворяващо неравенствата  $x_0 < x < x_0 + \delta$ , да бъде изпълнено  $|f(x) - A| < \epsilon$ .

Теорема 1. Дефиниции 1 и 4 (съответно дефиниции 2 и 5 и дефиниции 3 и 6) са еквивалентни.

Теорема 2. Ако функцията  $f(x)$  притежава лява и дясна граница при  $x$ , клонящо към  $x_0$ , и тези две граници са равни, то функцията  $f(x)$  притежава граница при  $x$ , клонящо към  $x_0$ , и  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ .

Теорема 3. Функцията  $f(x)$  притежава граница  $A$  при  $x$ , клонящо към  $x_0$ , тогава и само тогава, когато  $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x) - A| = 0$ .

Дефиниция 7 (Коши). Ще казваме, че функцията  $f(x)$  има граница  $A$  при  $x$ , клонящо към  $+\infty$  ( $-\infty$ ), ако за всяко положително число  $\epsilon$  може да се намери число  $N$  (свентуално зависещо от  $\epsilon$ ) такова, че за всяко  $x \in D$ , удовлетворяващо неравенствата  $0 < |x - x_0| < \delta$ , да бъде изпълнено  $|f(x) - A| < \epsilon$ .

Дефиниция 8 (Коши). Ще казваме, че функцията  $f(x)$  има лява (дясна) граница  $+\infty$  при  $x$ , клонящо към  $x_0$ , ако за всяко число  $N$  може да се намери положително число  $\delta$  (свентуално зависещо от  $N$ ) такова, че за всяко  $x \in D$ , удовлетворяващо неравенствата  $x_0 - \delta < x < x_0$ , да бъде изпълнено  $f(x) > N$ .

Дефиниция 9 (Коши). Ще казваме, че функцията  $f(x)$  има лява (дясна) граница  $-\infty$  при  $x$ , клонящо към  $x_0$ , ако за всяко число  $N$  може да се намери положително число  $\delta$  (свентуално зависещо от  $N$ ) такова, че за всяко  $x \in D$ , удовлетворяващо неравенствата  $x_0 - \delta < x < x_0$ , да бъде изпълнено  $f(x) < -N$ .

Дефиниция 10 (Коши). Ще казваме, че функцията  $f(x)$  има лява (дясна) граница  $+\infty$  при  $x$ , клонящо към  $x_0$ , ако за всяко число  $N$  може да се намери положително число  $\delta$  (свентуално зависещо от  $N$ ) такова, че за всяко  $x \in D$ , удовлетворяващо неравенствата  $x_0 - \delta < x < x_0$ , да бъде изпълнено  $f(x) > N$ .

Дефиниция 11 (Коши). Ще казваме, че функцията  $f(x)$  има граница  $+\infty$  ( $-\infty$ ) при  $x$ , клонящо към  $+\infty$  ( $-\infty$ ), ако за всяко число  $N$  може да се намери число  $A$  (свентуално зависещо от  $N$ ) такова, че за всяко  $x \in D$  и  $x > A$  да бъде изпълнено  $f(x) > N$  ( $f(x) < -N$ ).

Забележка. При използване на дефиниции 8, 9, 10 и 11 за доказване, че  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  е достатъчно да се разглеждат само положителни числа  $N$ , а при доказване на  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$  — само отрицателни.

Дефинициите на Хайне, съответни на дефиниции 7, 8, 9, 10 и 11, се получават от дефиниции 1, 2 и 3 чрез заместване на  $x_0$  и  $A$  с  $+\infty$ .

Дефиниция 12. Ще казваме, че функцията  $f(x)$  е непрекъсната в точката  $x_0$ , ако  $x_0 \in D$ , съществува границата  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  и  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ .

Забележка. Тъй като в дефиниция 12 се иска съществуване на  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ , то  $x_0$  трябва да бъде точка на съгъване на  $D$ . Ако точката  $x_0$  не е точка на съгъване на  $D$ , то може да се намери околност на  $x_0$ , в която няма други точки от  $D$  с изключение на  $x_0$ . Такава точка се нарича изолирана точка на  $D$ . Ще смятаме, че ако  $x_0$  е изолирана точка от дефиниционната област  $D$  на  $f(x)$ , то  $f(x)$  е непрекъсната в  $x_0$ .

Дефиниция 13. Ще казваме, че функцията  $f(x)$  е непрекъсната отляво (отдясно) в точката  $x_0$ , ако  $x_0 \in D$ , съществува границата

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \begin{pmatrix} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \\ x < x_0 \\ x > x_0 \end{pmatrix} \text{ и } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

**Теорема 4.** Ако една функция е непрекъсната отляво и непрекъсната отясно в точката  $x_0$ , то тя е непрекъсната в точката  $x_0$ .

**Дефиниция 14.** Ще казваме, че функцията  $f(x)$  е прекъсната в точката  $x_0$ , ако  $x_0 \in D$  и  $f(x)$  не е непрекъсната в точката  $x_0$ .

**1.1.** Като използваме дефиницията на Хайне, докажете, че следните функции са непрекъснати във всяка точка от дефиниционната си област:

а)  $f(x) = x^2$ ;      б)  $f(x) = \frac{x^2+1}{2x+1}$ ;

в)  $f(x) = \frac{x+1}{x^2-1}$ ;      г)  $f(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$ .

**Решение.** в) Нека  $x_0$  принадлежи на дефиниционната област на функцията  $f(x) = \frac{x+1}{x^2-1}$ , т. е.  $x_0 \neq \pm 1$ . Нека  $\{x_n\}$  е произволна редица, клоняща към  $x_0$ ,  $x_n \neq \pm 1$ ,  $x_n \neq x_0$ . Разглеждаме редицата с общ член

$$f(x_n) = \frac{x_n+1}{x_n^2-1}$$

Като приложим теоремите за действия със сходящи редици, виждаме, че тази редица е сходяща и границата ѝ е  $\frac{x_0+1}{x_0^2-1}$ , което е точно  $f(x_0)$ .

Съгласно дефиниции 1 и 12 това означава, че  $f(x)$  е непрекъсната в  $x_0$ .

**1.2.** Намерете положително число  $\delta$  такова, че за всяко  $x$ , за което е изпълнено  $|x-2| < \delta$ , да бъде в сила  $|x^2-4| < 0,1$ .

**Решение.** От

$$|x^2-4| = |x-2| |x+2| \leq |x-2| (|x|+2)$$


виждаме, че трябва да нямаме ограничения за  $|x|$  и затова ще разглеждаме числа  $x$  от отворения интервал с център точката 2 и радиус 1, т. е. ще търсим число  $0 < \delta \leq 1$ . Ясно е, че  $1 < x < 3$ , или

$|x| < 3$ . Оттук виждаме, че за да решим задачата, достатъчно е да изберем число  $\delta$  такова, че  $5\delta \leq 0,1$ . И наистина нека  $\delta = \frac{1}{50}$ .

Тогава за всяко  $x$ , удовлетворяващо неравенството  $|x-2| < \frac{1}{50}$  е в сила

$$|x^2-4| \leq |x-2| (|x|+2) < \frac{1}{50} (3+2) = 0,1.$$

**Забележка.** По този начин намерихме число  $\delta$  с исканото свойство, но то не е възможно най-голямото. Лесно се съобразява (Фиг. 4), че най-голямото такова число е  $\delta_0 = \min(\sqrt{4,1} - 2$ ;



Фиг. 4

$2 - \sqrt{3,9}) = \sqrt{4,1} - 2$ , и всяко  $0 < \delta \leq \delta_0$  е решение на задачата.

**1.3.** Намерете положително число  $\delta$  такова, че за всяко число  $x$ , за което е изпълнено неравенството  $|x-2| < \delta$ , да бъде в сила  $|x^3-8| < 0,001$ .

**Упътване.** С разсъждения, аналогични на разсъжденията при решението на зад. 1.2, покажете, че едно такова число е например  $\delta = 0,00005$ .



1.4. Като използваме дефиницията на Коши, докажете, че функцията  $f(x) = 2x + 5$  е непрекъсната в произволна точка  $x_0$ .  
Решение. Нека  $\varepsilon$  е произволно положително число. Да разгледаме равенствата

$$|f(x) - f(x_0)| = |(2x + 5) - (2x_0 + 5)| = 2|x - x_0|.$$

Ясно е, че ако изберем  $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$ , то за всяко число  $x$ , за което

$$|x - x_0| < \frac{\varepsilon}{2}, \text{ ще бъде в сила}$$

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon,$$

което означава според дефиниции 4 и 12, че функцията  $f(x) = 2x + 5$  е непрекъсната в точката  $x_0$ .

1.5. Като използваме дефиницията на Коши, докажете, че функцията  $f(x) = x^2$  е непрекъсната в произволна точка  $x_0$ .

Решение. Както в зад. 1.2 отначало ще разгледаме число  $x$  от отворения интервал с център точката  $x_0$  и радиус 1, т.е. числа, удовлетворяващи неравенството  $|x - x_0| < 1$ . Тогава от равенството на триъгълника имаме

$$|x| - |x_0| < |x - x_0| < 1 \text{ или } |x| < |x_0| + 1.$$

Нека  $\varepsilon$  е произволно положително число. От  $|x^2 - x_0^2| = |x - x_0| |x + x_0| \leq |x - x_0| (|x| + |x_0|) < |x - x_0| (2|x_0| + 1)$  виждаме, че ако изберем  $\delta = \min(1, \frac{\varepsilon}{2|x_0| + 1})$ , то за всяко  $x$ ,

удовлетворяващо неравенството  $|x - x_0| < \delta$ , ще бъдат изпълнени едновременно следните две неравенства:

$$|x - x_0| < 1 \text{ и } |x - x_0| < \frac{\varepsilon}{2|x_0| + 1}.$$

Следователно

$$|x^2 - x_0^2| \leq |x - x_0| (2|x_0| + 1) < \varepsilon,$$

а това съгласно дефиниции 3 и 12 означава, че  $x^2$  е непрекъсната в точката  $x_0$ .

1.6. Като използваме дефиницията на Коши, докажете, че функцията  $f(x) = x^c$  е непрекъсната във всяка точка  $x_0$ .

Упътване. С разсъждения, аналогични на разсъжденията при решението на зад. 1.5, покажете, че ако на произволно положително число  $\varepsilon$  съпоставим например числото  $\delta = \min(1, \frac{\varepsilon}{n(|x_0| + 1)^{n-1}})$ , то изискванията на дефиницията на Коши ще бъдат изпълнени.

1.7. Докажете, че ако  $n$  е естествено число и  $a$  е положително число, то съществува положително число  $l$  такава, че  $a^n = l$  (теорема за съществуване на  $\sqrt[n]{a}$  — вж. зад. 1.15 от гл. 1).

Решение. Нека  $M$  е множеството на всички положителни числа  $x$  такива, че  $x^n > a$ . Множеството  $M$  е ограничено отдолу и не е празно. Например от  $(a + 1)^n \geq na + 1 > a$  следва, че  $a + 1 \in M$ . Според принципа за непрекъснатост множеството  $M$  притежава точна долна граница. Да я означим с  $l$ . И така, ако  $x \in M$ , то  $x \geq l$  и ако  $m > l$ , то съществува елемент  $x_m$  на  $M$  такъв, че  $x_m < m$ .

Да допуснем, че  $l^n > a$ . Тогава съгласно зад. 1.6 за положителното число  $\varepsilon = l^n - a$  съществува положително число  $\delta$  такава, че за всяко  $x$ , удовлетворяващо неравенството  $|x - l| < \delta$ , е в сила  $|x^n - l^n| < \varepsilon = l^n - a$  или  $a = l^n - (l^n - a) < x^n < l^n + (l^n - a)$ . Оказа се, че всички числа  $x \in (l - \delta, l + \delta)$  удовлетворяват неравенството  $a < x^n$ , т.е. принадлежат на множеството  $M$ . Това противоречи на факта, че наляво от  $l$  няма точки от  $M$ .

Да допуснем сега, че  $l^n < a$ . Тогава съгласно зад. 1.6 за положителното число  $\varepsilon = a - l^n$  съществува положително число  $\delta$  такава, че за всяко  $x$ , удовлетворяващо неравенството  $|x - l| < \delta$ , е в сила  $|x^n - l^n| < \varepsilon = a - l^n$  и  $l^n - (a - l^n) < x^n < l^n + (a - l^n) = a$ . Така получихме, че в интервала  $(l - \delta, l + \delta)$  е изпълнено неравенството  $x^n < a$ , т.е. в този интервал няма точки от  $M$ . Това противоречи на факта, че между  $l$  и  $l + \delta$  трябва да има точки от  $M$ .

Получените противоречия показват, че  $l^n = a$ .

1.8. Като използвате дефиницията на Коши, докажете, че

$$\text{функцията } f(x) = \frac{x^2 - 2}{x^2 - 2x - 3} \text{ е непрекъсната в точката 1.}$$

Решение. Първо ще изберем един интервал около точката 1, в който знаменателят на разглежданата функция не се анулира — например интервал с център точката 1 и радиус 1, т.е. ще разгледаме числа  $x$ , удовлетворяващи неравенството  $|x - 1| < 1$ . За тези стойности на  $x$  знаменателят присма само отрицателни стойности (защо?). Сега да направим оценка отгоре на  $|f(x) - f(1)|$ :



$$|f(x) - f(1)| = \frac{x^2 - 2}{x^2 - 2x - 3} - \frac{1}{4} = \frac{3x^2 + 2x - 5}{4(x^2 - 2x - 3)}$$

$$= \frac{|x-1||3x+5|}{4(4-(x-1)^2)} \leq \frac{11}{12} |x-1|.$$

В последното неравенство използвахме, че  $0 < x < 1$ . Нека  $\epsilon$  е произволно положително число. Да му съпоставим

числото  $\delta = \min(1, \frac{12}{11} \epsilon)$ . Тогава за всяко  $x$ , удовлетворяващо неравенството  $|x-1| < \delta$ , са в сила  $|x-1| < 1$  и  $|x-1| < \frac{12}{11} \epsilon$

и следователно

$$|f(x) - f(1)| \leq \frac{11}{12} |x-1| < \epsilon,$$

което означава, че функцията  $f(x) = \frac{x^2 - 2}{x^2 - 2x - 3}$  е непрекъснатата в точката 1.

1.9. Като използваме дефиницията на Коши, докажете, че следните функции са непрекъснати в посочените точки:

а)  $f(x) = \frac{3x+1}{x^2-4x-5}$  при  $x = 1$ ;

б)  $f(x) = \frac{x^2-1}{2x^2-x+1}$  при  $x = 2$ ;

в)  $f(x) = \frac{3x^2-x+1}{x^2-x-5}$  при  $x = -1$ .

1.10. Като използвате дефиницията на Коши, докажете, че функцията  $f(x) = \sqrt[n]{x}$  е непрекъснатата при всяко  $x \geq 0$ .

Решение. а) Нека  $x_0 = 0$ . Избираме произволно положително число  $\epsilon$  и му съпоставяме числото  $\delta = \epsilon^n$ .

За всяко  $x \geq 0$ , удовлетворяващо  $|x-0| = x < \epsilon^n$ , е изпълнено

$$|\sqrt[n]{x} - \sqrt[n]{0}| = \sqrt[n]{x} < \sqrt[n]{\epsilon^n} = \epsilon.$$

б) Нека  $x_0 > 0$  и нека  $\epsilon$  е произволно положително число. От

$$|\sqrt[n]{x} - \sqrt[n]{x_0}| = \frac{|\sqrt[n]{x} - \sqrt[n]{x_0}| (\sqrt[n]{x^{n-1}} + \sqrt[n]{x^{n-2}} \sqrt[n]{x_0} + \dots + \sqrt[n]{x_0^{n-1}})}{\sqrt[n]{x^{n-1}} + \sqrt[n]{x^{n-2}} \sqrt[n]{x_0} + \dots + \sqrt[n]{x_0^{n-1}}} < \frac{|x - x_0|}{\sqrt[n]{x_0^{n-1}}}$$

виждаме, че на числото  $\epsilon$  можем да съпоставим числото  $\delta = \sqrt[n]{x_0^{n-1}} \epsilon$ . Тогава за всяко  $x \geq 0$ , удовлетворяващо неравенството  $|x - x_0| < \delta$ , е в сила  $|\sqrt[n]{x} - \sqrt[n]{x_0}| < \epsilon$ .

С това показахме, че функцията  $f(x) = \sqrt[n]{x}$  е непрекъснатата във всяка точка  $x_0 \geq 0$ .

1.11. Като използвате дефиницията на Коши, докажете, че

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3-x}{(x-2)^2} = +\infty.$$

Решение. Нека  $N$  е произволно положително число (вж. забележката след дефиниция 11). Да разгледаме околност на

точката 2 с радиус  $\frac{1}{2}$ , т.е. нека  $\frac{3}{2} < x < \frac{5}{2}$ . Тогава

$$\frac{3-x}{(x-2)^2} > \frac{3-\frac{5}{2}}{(x-2)^2} = \frac{1}{2(x-2)^2}.$$

Сега на числото  $N$  да съпоставим числото  $\delta = \min\left(\frac{1}{2}, \sqrt{\frac{1}{2N}}\right)$ .

Нека  $x$  е произволно число, удовлетворяващо неравенствата

$$0 < |x-2| < \delta, \text{ т.е. } x > \frac{3}{2}, x \neq 2 \text{ и } |x-2| < \sqrt{\frac{1}{2N}}. \text{ Тогава}$$

$$\frac{3-x}{(x-2)^2} > \frac{1}{2(x-2)^2} > N.$$

Съгласно дефиниция 9 това означава, че  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3-x}{(x-2)^2} = +\infty$ .

1.12. Каго използваме дефиницията на Коши, докажете, че

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - x - 2}{x - 1} = +\infty.$$

Решение. От равенствата

$$\frac{x^2 - x - 2}{x - 1} = \frac{\frac{x^2}{2} + \left(\frac{x^2}{4} - x\right) + \left(\frac{x^2}{4} - 2\right)}{x - 1}$$

$$= \frac{\frac{x^2}{2} + x\left(\frac{x}{4} - 1\right) + \frac{1}{4}(x^2 - 8)}{x - 1}$$

е ясно, че при  $x > 4$  е в сила

$$\frac{\frac{x^2}{2}}{x - 1} > \frac{x}{2} = N.$$

Нека  $N$  е произволно число. Да му съпоставим числото  $A = \max(4, 2N)$ . Ясно е, че за всяко  $x > A$  е изпълнено

$$\frac{x^2 - x - 2}{x - 1} > N.$$

1.13. Нека  $P(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$ ,  $a_0 > 0$  е даден полином. Докажете, че:

а) Съществува такова число  $A$ , че за всяко  $x > A$  е изпълнено  $P(x) > 0$ ;

б) съществува число  $B$  такова, че за всяко  $x > B$  е изпълнено

$$P(x) > \frac{a_0}{2} x^n;$$

в) съществува число  $C$  такова, че за всяко  $x > C$  е изпълнено

$$P(x) < 2a_0 x^n;$$

г)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty$ .

Решение. а) Твърдението следва веднага от равенството

$$P(x) = \left(\frac{a_0}{n} x^n + a_1 x^{n-1}\right) + \left(\frac{a_0}{n} x^n + a_2 x^{n-2}\right) + \dots + \left(\frac{a_0}{n} x^n + a_n\right),$$

каго вземем предвид, че за всяко от събираемите

$$B_i = \frac{a_0}{n} x^n + a_i x^{n-i} = \frac{a_0}{n} x^{n-i} \left(x^i + \frac{na_i}{a_0}\right), \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

съществува число  $A_i$  такова, че при  $x > A_i$  е в сила  $B_i > 0$ . (Ако  $B_i > 0$  за всяко  $x$ , можем да смятаме, че  $A_i = 0$ ).

Тогава числото  $A = \max A_i$  удовлетворява условието на задачата.

б) Да разгледаме полинома

$$Q(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n - \frac{a_0}{2} x^n.$$

Коефициентът пред  $x^n$  е  $\frac{a_0}{2} > 0$  и следователно можем да приложим а).

в) Да разгледаме полинома

$$Q(x) = 2a_0 x^n - (a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n).$$

Коефициентът пред  $x^n$  е  $a_0 > 0$ , следователно можем да приложим а).

г) Нека  $N$  е произволно число. Да разгледаме полинома

$$Q(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n - N.$$

Съгласно а) съществува число  $A$  такова, че за всяко  $x > A$  е в сила  $Q(x) > 0$  или  $P(x) > N$ , което означава съгласно дефиниция 11, че

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty.$$

1.14. Докажете, че

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 5x^4 + 2}{2x^2 - x - 15} = +\infty.$$

Решение. Ще приложим зад. 1.13. Съгласно б) съществува число  $A_1$  такова, че за всяко  $x > A_1$  е в сила  $3x^2 - 5x^4 + 2 >$

$$\frac{3}{2} x^2 > 0.$$

Съгласно а) и в) на зад. 1.13 съществува число  $A_2$  такава, че за всяко  $x > A_2$  е в сила

$$0 < 2x^2 - x - 15 < 4x^2.$$

Тогава за всяко  $x > \max(A_1, A_2)$  ще бъде изпълнено

$$R(x) = \frac{3x^5 - 5x^4 + 2}{2x^2 - x - 15} > \frac{\frac{3}{2}x^5}{4x^2} = \frac{3}{8}x^3.$$

Нека сега  $N$  е произволно положително число. Да му съпоставим

числото  $A = \max\left(A_1, A_2, \sqrt[3]{\frac{8}{3}N}\right)$ . Ясно е, че за всяко

$x > N$  ще бъде изпълнено  $R(x) > N$ .

1.15. Докажете, че:

а)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 3x + 2}{2x^2 - 2x - 5} = \frac{1}{2}$ ; б)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 2x + 1}{x^2 - x - 5} = +\infty$ ;

в)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 2x - 1}{2x - 1} = +\infty$ ; г)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x + 1}{3x^3 - 2x} = 0$ ;

д)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x - x^3}{2x^4 + x^2 + 1} = 0$ ; е)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 - x + 1}{1 - 2x - x^3} = -\infty$ .

1.16. Нека  $R(x) = \frac{a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n}{b_0x^m + b_1x^{m-1} + \dots + b_m}$ ,  $a_0 \neq 0$ ,  $b_0 \neq 0$ .

Докажете, че:

а)  $\lim_{x \rightarrow \infty} R(x) = +\infty$  при  $n > m$  и  $\frac{a_0}{b_0} > 0$ ,

$\lim_{x \rightarrow +\infty} R(x) = -\infty$  при  $n > m$  и  $\frac{a_0}{b_0} < 0$ ;

б)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} R(x) = 0$  при  $n < m$ ;

в)  $\lim_{x \rightarrow \infty} R(x) = \frac{a_0}{b_0}$  при  $n = m$ .

Решение. Ще разгледаме само случая  $a_0 > 0$  и  $b_0 > 0$ . Останалите случаи се свеждат до този по очевиден начин с умножаване с  $-1$ .

а) Съгласно зад. 1.13 можем да намерим числото  $A_1$  такава, че

$$\text{за всяко } x > A_1 \text{ е изпълнено } a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n > \frac{a_0}{2}x^n > 0,$$

и число  $A_2$  такава, че за всяко  $x > A_2$  е изпълнено

$$0 < b_0x^m + b_1x^{m-1} + \dots + b_m < 2b_0x^m.$$

Тогава за всяко  $x > \max(A_1, A_2)$  имаме

$$\frac{a_0}{2}x^n > R(x) > \frac{a_0}{2b_0} \frac{x^{n-m}}{x^m} = \frac{a_0}{4b_0} x^{n-m}, \text{ където } n - m > 0.$$

Нека  $N$  е произволно положително число. Да му съпоставим

числото  $A = \max\left(A_1, A_2, \sqrt[n-m]{\frac{4b_0N}{a_0}}\right)$ . Тогава при  $x > A$  е в сила

$$R(x) > N, \text{ което означава } \lim_{x \rightarrow +\infty} R(x) = +\infty.$$

б) Съгласно зад. 1.13 намираме число  $A_1$  такава, че за всяко  $x > A_1$  е изпълнено  $0 < a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n < 2a_0x^n$  и число  $A_2$  такава, че за  $x > A_2$  е изпълнено  $b_0x^m + b_1x^{m-1} + \dots + b_m > \frac{b_0}{2}x^m > 0$ .

Тогава за всяко  $x > \max(A_1, A_2)$  имаме

$$0 < R(x) < \frac{2a_0x^n}{\frac{b_0}{2}x^m} = \frac{4a_0}{b_0} x^{m-n}, \text{ като } m - n > 0.$$

Нека  $\varepsilon$  е произволно положително число. Да му съпоставим



числото  $A = \max(A_1, A_2, \dots, \sqrt[n]{\frac{A_0}{b_0 \epsilon}})$ . Ясно е, че за всяко  $x > A$  е в сила

$$0 < R(x) < \frac{4a_0}{b_0 x^{m-n}} < \epsilon.$$

в) Съгласно б) за рационалната функция

$$Q(x) = \frac{a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n}{b_0 x^n + b_1 x^{n-1} + \dots + b_n} - \frac{a_0}{b_0}$$

е изпълнено  $\lim_{x \rightarrow +\infty} Q(x) = 0$ , тъй като числителят на дробта, която се получава след привеждане към общ знаменател, е полином най-много от  $(n-1)$ -ва степен.

**1.17. Докажете, че:**

а) ако  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$  и  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$ , то  $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = +\infty$  (накратко това ще означаваме така:  $\infty + \infty = \infty$ );

б) ако  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$  и  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$ , то  $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = +\infty$  (накратко това ще означаваме така:  $\infty + A = \infty$ );

в) ако  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$  и  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$ , то  $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \times g(x)) = +\infty$  (накратко това ще означаваме така:  $\infty \cdot \infty = \infty$ );

г) ако  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$  и  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A > 0$ , то  $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \times g(x)) = +\infty$  (накратко това ще означаваме така:  $+\infty \cdot A = +\infty$ );

д) ако  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$  и  $f(x) > 0$ , то  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = +\infty$  (накратко това ще означаваме така:  $\frac{1}{+\infty} = +\infty$ );

е) ако  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$  и  $f(x) < 0$ , то  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = -\infty$

(накратко това ще означаваме така:  $\frac{1}{-0} = -\infty$ );

ж) ако  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ , то  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = 0$

(накратко това ще означаваме така:  $\frac{1}{\infty} = 0$ );

з) ако  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ , то  $\lim_{x \rightarrow x_0} (-f(x)) = -\infty$ .

**Решение.** а) Нека  $N$  е произволно число. Да разгледаме

числото  $\frac{N}{2}$ . Понеже  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ , то съществува число

$\delta_1 > 0$  такова, че за всяко  $x$ , удовлетворяващо  $|x - x_0| < \delta_1$ , е в

изпълнение  $f(x) > \frac{N}{2}$ . Тъй като  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$ , то съществува число

$\delta_2 > 0$  такова, че за всяко  $x$ , удовлетворяващо  $|x - x_0| < \delta_2$ , е изпълнено  $g(x) > \frac{N}{2}$ . Нека сега на числото  $N$  да съпоставим

числото  $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ . Ясно е, че за всяко  $x$ , удовлетворяващо

$|x - x_0| < \delta$ , ще бъдат изпълнени и двете неравенства  $f(x) > \frac{N}{2}$  и  $g(x) > \frac{N}{2}$  и следователно  $f(x) + g(x) > N$ , а това означава

$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = +\infty$ .

г) Нека  $N$  е произволно положително число. Да разгледаме

числото  $\frac{2N}{A}$ . Тъй като  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ , съществува число  $\delta_1 > 0$

такова, че за всяко  $x$ , удовлетворяващо  $|x - x_0| < \delta_1$ , е в сила

$f(x) > \frac{2N}{A}$ . Тъй като  $A > 0$  и  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$ , то съществува  $\delta_2 > 0$  такава, че за всяко  $x$ , удовлетворяващо  $|x - x_0| < \delta_2$ , е в

сила  $\frac{A}{2} < g(x) < \frac{3A}{2}$ . Нека сега на числото  $N$  съпоставим числото

$\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ . За всяко  $x$ , удовлетворяващо  $|x - x_0| < \delta$ , и

ще бъдат изпълнени и двете неравенства  $f(x) > \frac{2N}{A} > 0$  и

$g(x) > \frac{A}{2} > 0$  и следователно  $f(x)g(x) > N$ , а това означава, че

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)g(x)) = +\infty.$$

д) Нека  $N$  е произволно положително число. Да разгледаме положителното число  $\varepsilon = \frac{1}{N}$ . Тъй като  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ , то съществува положително число  $\delta$  такава, че за всяко  $x$ , удовлетворяващо  $|x - x_0| < \delta$ , е изпълнено

$$0 < f(x) = |f(x) - 0| < \varepsilon = \frac{1}{N},$$

а оттук следва  $\frac{1}{f(x)} > N$ , т.е.  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = +\infty$ .

ж) Нека  $\varepsilon$  е произволно положително число. Да разгледаме числото  $N = \frac{1}{\varepsilon}$ . Тъй като  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ , съществува положително число  $\delta$  такава, че за всяко  $x$ , удовлетворяващо  $|x - x_0| < \delta$ , е в сила

$$f(x) > N > \frac{1}{\varepsilon} > 0, \text{ т.е. } \left| \frac{1}{f(x)} - 0 \right| = \frac{1}{f(x)} < \varepsilon$$

а това означава, че  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = 0$ .

1.18. Нека функциите  $f(x)$ ,  $g(x)$  и  $h(x)$  удовлетворяват условията:

а) съществуват границите  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  и  $\lim_{x \rightarrow x_0} h(f(x))$ ;

б)  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$ ;

в) съществува положително число  $\delta_1$  такава, че за всяко  $x$ , удовлетворяващо  $0 < |x - x_0| < \delta_1$ , е в сила  $f(x) \cong g(x) \cong h(x)$ .

Докажете, че съществува границата  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$  и

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A.$$

Решение. Нека  $\varepsilon$  е произволно положително число.

От  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$  следва, че съществува положително число  $\delta_2$  такава, че за всяко  $x$ , удовлетворяващо  $0 < |x - x_0| < \delta_2$ , е изпълнено  $|h(x) - A| < \varepsilon$ , т.е.  $A - \varepsilon < h(x) < A + \varepsilon$ .

От  $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$  следва, че съществува положително число  $\delta_3$  такава, че за всяко  $x$ , удовлетворяващо  $0 < |x - x_0| < \delta_3$ , е изпълнено  $|h(x) - A| < \varepsilon$ , т.е.  $A - \varepsilon < h(x) < A + \varepsilon$ .

Сега на числото  $\varepsilon$  да съпоставим числото  $\delta = \min(\delta_1, \delta_2, \delta_3)$ . Тогава за всяко  $x$ , удовлетворяващо  $0 < |x - x_0| < \delta$ , ще бъдат изпълнени едновременно неравенствата:

$$A - \varepsilon < f(x), \\ f(x) < g(x) < h(x), \\ h(x) < A + \varepsilon.$$

Оттук следва, че при  $0 < |x - x_0| < \delta$  ще бъде в сила  $A - \varepsilon < g(x) < A + \varepsilon$ , т.е.  $|g(x) - A| < \varepsilon$ . С това показваме, че

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A.$$

1.19. Нека функциите  $f(x)$  и  $g(x)$  удовлетворяват условията



а)  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ ;

б) съществува число  $\delta_1$  такава, че за всяко  $x$ , удовлетворяващо  $0 < |x - x_0| < \delta_1$ , е в сила  $f(x) \leq g(x)$ .

Докажете, че  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$ .

1.20. Нека функциите  $f(x)$  и  $g(x)$  удовлетворяват условията:

а) съществуват границите  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  и  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ ;

б) съществува число  $\delta_1$  такава, че за всяко  $x$ , удовлетворяващо  $0 < |x - x_0| < \delta_1$ , е в сила  $f(x) \leq g(x)$ .

Докажете, че  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ .

1.21. Нека функцията  $f(x)$  е ограничена и нека  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ .

Докажете, че съществува границата  $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) g(x))$  и

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) g(x)) = 0.$$

Решение. Нека  $|f(x)| \leq A$  за всяко  $x$  от дефиниционната област. От

$$0 \leq |f(x) g(x)| = |f(x)| |g(x)| \leq A |g(x)|,$$

като приложим теорема 3 и зад. 1.18, получаваме, че твърдението е вярно.

1.22. Докажете, че функцията  $f(x) = \cos \frac{1}{x}$  няма граница при  $x \rightarrow 0$  и  $x \neq 0$ , а функцията  $g(x) = x \cos \frac{1}{x}$  има граница при  $x \rightarrow 0$  и  $x \neq 0$ .


Решение. Да разгледаме редицата с общ член  $x_n = \frac{1}{n\pi}$ . Очевидно тази редица клони към нула, а редицата от функционалните стойности  $f(x_n) = \cos(-1)^n$  има две точки на съгъвяване и следователно е разходяща. Това показва, че функцията

$f(x) = \cos \frac{1}{x}$  не удовлетворява условието на дефиниция 1 (на Хайне) в точката 0 и следователно няма граница при  $x \rightarrow 0$ .

Тъй като  $\left| \cos \frac{1}{x} \right| \leq 1$  за всяко  $x$ , твърдението, че  $g(x) = x \cos \frac{1}{x}$  има граница при  $x \rightarrow 0$  следва от зад. 1.21. При това

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \cos \frac{1}{x} = 0.$$

1.23. Нека  $f(x) = [x]$  ( $[x]$  се чете „скобка от  $x$ “ и означава най-голямото цяло число, което е по-малко или равно на  $x$ ). Докажете, че  $[x]$  е прекъснатата при всяко цяло число  $x$  и непрекъснатата във всички останали точки (фиг. 5).



Фиг. 5

Решение. а) Нека  $x_0$  е цяло число. Да разгледаме произволна редица  $\{x_n\}$ , клоняща към  $x_0$  и такава, че  $x_n < x_0$  за всяко естествено число  $n$ . Тъй като  $x_0 - 1 < x_0$ , то съществува число  $N$  такава, че при  $n > N$  е изпълнено  $x_0 - 1 < x_n < x_0$ . Тогава за всяко  $n > N$  имаме  $f(x_n) = [x_n] = x_0 - 1$  и следователно редицата от функционалните стойности  $\{f(x_n)\}$  е сходяща и клони към  $x_0 - 1$ . Това означава, че функцията  $f(x) = [x]$  има лява граница при  $x \rightarrow x_0$ ,  $x < x_0$ , която е различна от  $f(x_0) = [x_0] = x_0$ . Следователно тя е прекъснатата отляво (а значи и прекъснатата) за всяко цяло число.



Нека сега разгледаме произволна редица  $\{x_n\}$ , клоняща към  $x_0$ , като  $x_n > x_0$ . Тъй като  $x_0 < x_0 + 1$ , то от известно място нататък е изпълнено  $x_0 < x_n < x_0 + 1$ . Тогава за редицата от функционалните стойности имаме  $f(x_n) = [x_n] = x_0$  от известно място нататък. Следователно  $\{f(x_n)\}$  е сходяща и има граница  $x_0 = [x_0] = f(x_0)$ . С това показваме, че функцията  $f(x) = [x]$  е непрекъснатата отлясно за всяко цяло число.

б) Нека  $x_0$  не е цяло число. Тогава  $[x_0] < x_0 < [x_0] + 1$ . Да вземем произволна редица  $\{x_n\}$ , клоняща към  $x_0$ . От известно място нататък ще бъдат изпълнени неравенствата  $[x_0] < x_n < [x_0] + 1$ . Тогава за редицата от функционалните стойности ще имаме  $f(x_n) = [x_n] = [x_0]$  от известно място нататък. Следователно тя ще бъде сходяща и границата ѝ ще е  $[x_0] = f(x_0)$ . С това показваме, че функцията  $f(x) = [x]$  е непрекъснатата за всяко число  $x_0$ , което не е цяло.

**1.24.** Докажете, че функцията  $f(x) = \sin \pi(x - [x])$  е непрекъснатата за всяко  $x$ .

Решение. Ако  $x_0$  не е цяло, непрекъснатостта на  $f(x)$  следва от непрекъснатостта на  $\sin x$ , зад. 1.23 и теоремата за непрекъснатост на функцията от функция.

Нека  $x_0$  е цяло число. Както в предишната задача ще пресметнем лявата и дясната граница на  $f(x)$  при  $x \rightarrow x_0$ .

И така нека  $x_n \rightarrow x_0$  и  $x_n < x_0$ . Тогава от известно място нататък  $x_0 - 1 < x_n < x_0$  и следователно  $[x_n] = x_0 - 1$ . Тогава от

$$f(x_n) = \sin \pi(x_n - [x_n]) = \sin \pi(x_n - x_0 + 1)$$

получаваме  $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x_n) = \sin \pi = 0$ .

Нека сега  $x_n \rightarrow x_0$  и  $x_n > x_0$ . Тогава от известно място нататък имаме  $x_0 < x_n < x_0 + 1$  и следователно  $[x_n] = x_0$ . Тогава от

$$f(x_n) = \sin \pi(x_n - [x_n]) = \sin \pi(x_n - x_0)$$

получаваме  $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x_n) = \sin 0 = 0$ .

Тъй като лявата и дясната граница съвпадат с функционалната стойност  $f(x_0) = \sin \pi(x_0 - [x_0]) = \sin 0 = 0$ , функцията  $f(x)$  е непрекъснатата в точката  $x_0$ .

**1.25.** Докажете, че функциите са непрекъснати за всяко  $x$ :

а)  $f(x) = [x] \sin \pi x$ ;

б)  $f(x) = [x]^2 - 2x[x] + [x]$ .

**1.26.** Докажете, че функцията

$$D(x) = \lim_{m \rightarrow \infty} \left( \lim_{n \rightarrow \infty} \cos^{2^n} (m!x\pi) \right)$$

е прекъснатата навсякъде (функция на Дирихле).

Решение. Нека  $x_0$  е ирационално число. Тогава при всяко фиксирано  $m$  числото  $m!x_0$  не е цяло и следователно

$$0 < \cos^2 (m!x_0\pi) < 1.$$

Така за всяко  $m$  имаме  $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos^{2^n} (m!x_0\pi) = 0$ , а отгук получаваме  $D(x_0) = 0$ .

Нека  $x_0 = \frac{p}{q}$ , където  $p$  и  $q > 0$  са цели числа. Тогава

при  $m \geq q$  числото  $m!x_0$  е цяло и следователно  $\cos^2 (m!x_0\pi) = 1$ . От това следва, че при  $m \geq q$  е в сила  $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos^{2^n} (m!x_0\pi) = 1$  и след граничен преход получаваме, че  $D(x_0) = 1$ .

И така

$$D(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \text{ ирационално число,} \\ 1 & \text{при } x \text{ рационално число.} \end{cases}$$

(Много често функцията на Дирихле се задава по този начин).

Нека  $x_0$  е произволна точка. Да конструираме редица  $\{x_n\}$ , клоняща към нула със стойности, различни от  $x_0$ , и такава, че членовете ѝ, стоящи на четни места, са рационални числа, а на нечетни — ирационални. Тогава редицата  $D(x_n) = \frac{1+(-1)^n}{2}$  има

две точки на съгъвяване и следователно не е сходяща. С това показваме, че функцията  $D(x)$  не удовлетворява условията на дефиниция 1 (Хайне) и следователно в никоя точка  $x_0$  не притежава граница. Отгук следва, че във всяка точка  $D(x)$  е прекъснатата.

**1.27.** Изследвайте за непрекъснатост следните функции:

а)  $f(x) = xD(x)$ ;

в)  $f(x) = \sin(\pi D(x))$ .

б)  $f(x) = D(x) \cdot \sin \pi x$ ;

Навсякъде  $D(x)$  е функцията на Дирихле от зад. 1.26.

1.28. Нека  $x_0$  е ирационално число и нека редицата с общ член  $x_n = \frac{p_n}{q_n}$ , където  $p_n$  и  $q_n > 0$  са цели числа, да клони към  $x_0$ .

Докажете, че  $\lim_{n \rightarrow \infty} q_n = +\infty$ .

Решение. Нека  $m$  е произволно естествено число. Нека да означим  $k_m = [mx_0]$ , т.е.  $k_m$  е цяло число, за което е изпълнено  $k_m < mx_0 < k_m + 1$ . Тогава интервалът  $\left(\frac{k_m}{m}, \frac{k_m + 1}{m}\right)$  е околност

на точката  $x_0$ , в която няма рационални числа от вида  $\frac{n}{m}$ , където  $n$  е цяло число.

Нека  $A$  е произволно положително число. Съществуват краен брой естествени числа  $i = 1, 2, \dots, m_A$ , по-малки или равни на  $A$ . За всяко от тях построяваме отворения интервал  $U_i$ , съдържащ точката  $x_0$  и несъдържащ точки от вида  $\frac{n}{i}$ , където  $n$  е цяло число. Нека  $U = \bigcap_{i=1}^{m_A} U_i$ . Ясно е, че това е отворен интервал,

съдържащ точката  $x_0$  и несъдържащ дроби  $\frac{n}{m}$  със знаменател  $m$ ,  $0 < m \leq A$ .

Но редицата  $x_n = \frac{p_n}{q_n}$  клони към  $x_0$  и следователно съществува число  $N$  такава, че при  $n > N$  имаме  $\frac{p_n}{q_n} \in U$ , а от това следва, че при  $n > N$  е в сила  $q_n > A$ . Тъй като числото  $A$  беше избрано произволно, това означава, че  $\lim_{n \rightarrow \infty} q_n = +\infty$ .

1.29. Функцията на Риман е дефинирана при  $x \neq 0$  по следния начин:

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & \text{ако } x = \frac{p}{q} \text{ е несъкратима дроб, } q > 0, \\ 0, & \text{ако } x \text{ е ирационално число.} \end{cases}$$

Докажете, че функцията  $R(x)$  е непрекъсната за всяко ирационално число и прекъсната за всяко рационално число.

Решение. Нека  $x_0$  е ирационално число. Да разгледаме

произволна редица от рационални числа  $x_n = \frac{p_n}{q_n}$ ,  $q_n > 0$ , която

клони към  $x_0$ . Тогава, съгласно зад. 1.28,  $q_n \rightarrow \infty$  и следователно

$R(x_n) = \frac{1}{q_n} \rightarrow 0$ . Като вземем предвид, че в ирационалните точки

$R(x) = 0$ , то от направените разсъждения лесно следва, че за произволна редица  $\{x_n\}$ , клоняща към  $x_0$  със стойности различни от  $x_0$ , съответната редица  $\{R(x_n)\}$  клони към  $0 = R(x_0)$ , т.е.  $R(x)$  е непрекъсната в ирационалните точки.

Нека  $x_0$  е рационално число, различно от нула. Да разгледаме произволна редица  $\{x_n\}$  от рационални числа, която клони към  $x_0$ .

Тогава  $R(x_n) = 0$  за всяко  $n$  и следователно  $\lim_{n \rightarrow \infty} R(x_n) = 0$ . Тъй

като  $R(x_0) = \frac{1}{q}$ , то  $R(x)$  не е непрекъсната в рационалните точки.

1.30. Изследвайте относно непрекъснатост функцията, дефинирана по следния начин:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{p}{q+1}, & \text{ако } x = \frac{p}{q} \text{ е несъкратима дроб, } q > 0, \\ |x|, & \text{ако } x \text{ е ирационално число.} \end{cases}$$

1.31. Нека функцията  $f(x)$  е дефинирана при  $x \neq 0$  по следния начин:

$$f(x) = \begin{cases} q, & \text{ако } x = \frac{p}{q} \text{ е несъкратима дроб, } q > 0, \\ 0, & \text{ако } x \text{ е ирационално число.} \end{cases}$$



Докажете, че функцията  $f(x)$  е неограничена във всеки интервал.

1.32. Нека функцията  $f(x)$ , дефинирана в интервала  $(a, b)$ , е монотонно растяща. Докажете, че:

а) ако  $f(x)$  е ограничена отгоре, то  $f(x)$  притежава лява граница при  $x \rightarrow b$  и

$$\lim_{x \rightarrow b} f(x) = \sup_{x \in (a, b)} f(x);$$

б) ако  $f(x)$  е неограничена, то  $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = +\infty$ .

Решение. а) Нека функцията  $f(x)$  е ограничена в интервала  $(a, b)$ . Да означим  $l = \sup_{x \in (a, b)} f(x)$ . Нека  $\varepsilon$  е произволно положително число.

Понеже числото  $l$  е горна граница на множеството от функционалните стойности на  $f(x)$ , то  $f(x) \leq l$  за всяко  $x \in (a, b)$ . Тъй като  $l$  е най-малката горна граница, то  $l - \varepsilon$  не е горна граница и следователно съществува число  $x_\varepsilon$  такова, че  $a < x_\varepsilon < b$  и  $l - \varepsilon < f(x_\varepsilon)$ .

Да вземем произволно число  $x$  от отворения интервал  $(x_\varepsilon, b)$ . Тъй като  $f(x)$  е растяща, то от  $x_\varepsilon < x$  следва

$$l - \varepsilon < f(x_\varepsilon) \leq f(x) \leq l + \varepsilon,$$

т.е. построихме лява околност на точката  $b$ , за всяко  $x$  от която  $|f(x) - l| < \varepsilon$ , а това означава, че числото  $l$  е лява граница на  $f(x)$  в точката  $b$ .

б) Нека  $f(x)$  е неограничена в интервала  $(a, b)$ . Да вземем произволно число  $A$ . От неограничеността на  $f(x)$  следва, че съществува число  $x_A \in (a, b)$  такова, че  $f(x_A) > A$ . Тогава от монотонността на  $f(x)$  имаме, че за всяко  $x$ , удовлетворяващо  $x_A < x < b$ , е изпълнено  $A < f(x_A) \leq f(x)$ , а това означава, че

$$\lim_{x \rightarrow b} f(x) = +\infty.$$


Забележка. От тази задача следва, че ако функцията  $f(x)$ , дефинирана в интервала  $(a, b)$ , е монотонно растяща, то във всяка точка  $x_0 \in (a, b)$  съществуват лява и дясна граница и

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq f(x_0) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} f(x).$$

1.33. Постройте пример на монотонно растяща функция, дефинирана при  $x > 0$ , която е прекъсната в точките  $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$  и непрекъсната във всички останали точки.

1.34. Постройте пример на монотонно растяща функция, дефинирана при  $x > 0$ , която е прекъсната за всяко рационално число и непрекъсната за всяко ирационално число.

Решение. Множеството от положителните рационални числа може да се нареди в редица  $r_1, r_2, r_3, \dots$  например по начина, посочен на фиг. 6.



Фиг. 6

След като едно число се срещне веднаж, по-нататък ще го изпусваме. Така числото 1 се среща на първо място и следователно

$r_1 = 1$ , а числата  $\frac{2}{2}, \frac{3}{3}, \frac{4}{4}, \dots$  ще изпусваме. Второто число е  $\frac{1}{2}$ ,

т.е.  $r_2 = \frac{1}{2}$ ,  $r_3 = \frac{2}{3}$ ,  $r_4 = \frac{1}{3}$  и т.н. Така всяко положително

рационално число ще се среща в редицата точно един път.

Нека  $\{n_i\}$  е една редица от естествени числа такива, че  $1 \leq n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ . Тогава  $n_i \geq n_1 + i - 1$ . Да разгледаме редицата с общ член

$$S_k = \frac{1}{2^{n_1}} + \frac{1}{2^{n_2}} + \dots + \frac{1}{2^{n_k}}.$$

Ясно е, че тази редица е монотонно растяща. От

$$\begin{aligned} \frac{1}{2^n} \leq S_k &= \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} + \dots + \frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^{n+1}} + \dots + \frac{1}{2^{n+k-1}} \\ &= \frac{1}{2^n} \left( 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^{k-1}} \right) \leq \frac{1 - \frac{1}{2^k}}{1 - \frac{1}{2}} < \frac{1}{2^{n-1}} \end{aligned}$$

виждаме, че тя е ограничена. Следователно редицата  $\{S_k\}$  е сходяща при всеки избор на редицата  $\{n_k\}$ .

Нека  $x$  е произволно положително число и  $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$  са номерата на всички положителни рационални числа, по-малки от  $x$ . С  $f(x)$  ще означим границата на редицата

$$S_k(x) = \frac{1}{2^{n_1}} + \frac{1}{2^{n_2}} + \dots + \frac{1}{2^{n_k}}.$$

Да вземем две произволни положителни числа  $x$  и  $y$  такива, че  $x < y$ . Нека  $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$  са номерата на рационалните числа от интервала  $[x, y)$ . От

$$\frac{1}{2^{n_1}} \leq S_k(y) - S_k(x) = \frac{1}{2^{n_1}} + \frac{1}{2^{n_2}} + \dots + \frac{1}{2^{n_k}} < \frac{1}{2^{n_1-1}}$$

с граничен преход получаваме

$$0 < \frac{1}{2^{n_1}} \leq f(y) - f(x) \leq \frac{1}{2^{n_1-1}}.$$

Оттук следва, че функцията  $f(x)$  е строго растяща. Според забележката към зад. 1.32 функцията  $f(x)$  има лява и дясна граница във всяка точка от интервала  $[0, +\infty)$ .

Нека  $x_0$  е ирационално число. Да разгледаме редици  $\{x_k\}$  и  $\{y_k\}$  такива, че  $0 < x_k < x_0 < y_k$  за всяко  $k \in \mathbb{N}$  и  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = \lim_{k \rightarrow \infty} y_k = x_0$ . С  $r_k$  да означим рационалното число от интервала  $[x_k, y_k]$  с въз-  
можно най-малък номер  $n_k$ . Ясно е, че  $\lim_{k \rightarrow \infty} r_k = x_0$  и според

зад. 1.28 редицата от знаменателите на  $r_k$  дивергира към  $+\infty$ , а оттам очевидно и  $n_k \rightarrow +\infty$ . И от неравенството

$$\frac{1}{2^{n_k}} \leq f(y_k) - f(x_k) \leq \frac{1}{2^{n_k-1}}$$

след граничен преход получаваме

$$0 \leq \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x) - \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x) \leq 0,$$

а това означава, че функцията  $f(x)$  е непрекъсната в точката  $x_0$ . Нека сега  $x_0$  е рационално число и нека неговият номер е  $n_0$ . Да разгледаме две редици  $\{x_k\}$  и  $\{y_k\}$  такива, че  $0 < x_k < x_0 < y_k$  за всяко  $k \in \mathbb{N}$  и  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = \lim_{k \rightarrow \infty} y_k = x_0$ . С  $r_k$  отново ще означим

рационалното число с възможно най-малък номер  $n_k$ , лежащо в интервала  $[x_k, y_k]$ . Тъй като  $x_0 \in [x_k, y_k]$ , то  $n_0 \leq n_k$  и след граничен преход в неравенството

$$\frac{1}{2^{n_0}} \leq \frac{1}{2^{n_k}} \leq f(y_k) - f(x_k)$$

получаваме

$$0 < \frac{1}{2^{n_0}} \leq \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x) - \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x),$$

т.е. лявата и дясната граница на  $f(x)$  в точката  $x_0$  са различни. Това означава, че функцията  $f(x)$  е прекъсната в точката  $x_0$ .

1.35. Докажете, че множеството  $M$  от точки, в които е прекъсната монотонната функция  $f(x)$ , е най-много изброимо, т.е. че, ако то е безкрайно, точките му могат да се наредят в редица.

Упътване. На всяка точка на прекъсване  $x_0$  съпоставете отворения интервал  $(\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x), \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x))$ . Покажете, че така

построените интервали нямат общи точки и са непазни. След това във всеки интервал изберете по едно рационално число и използвайте, че рационалните числа могат да се номерират.

1.36. Докажете, че функцията  $f(x) = a^x$ ,  $a > 0$ , е непрекъсната за всяко  $x$ .

Решение. Ще разгледаме само случая  $a > 1$ . Тогава функцията  $f(x) = a^x$  е растяща и съгласно зад. 1.32 съществуват границите



$$\lim_{x \rightarrow 0} a^x \text{ и } \lim_{x \rightarrow 0} a^{-x}$$

Според зад. 1.20 от гл. 1  $\lim_{x \rightarrow 0} a^x = \lim_{x \rightarrow 0} a^{-x} = 1 = a^0$ .

С това показахме, че функцията  $a^x$  е непрекъснатата отлясно в точката 0.

Нека сега редицата  $\{x_n\}$  клони към 0 със стойности, по-малки от 0. Тогава  $-x_n > 0$  и съгласно доказаното

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a^{-x_n} = 1 = a^0.$$

което показва, че функцията  $a^x$  е непрекъснатата отляво в точката 0.

Тъй като функцията  $a^x$  е непрекъснатата от ляво и непрекъснатата отлясно в точката 0, то тя е непрекъснатата в точката 0.

Нека  $x_0$  е произволно реално число. Да разгледаме произволна редица  $\{x_n\}$ , клоняща към  $x_0$ . От равенството

$$a^{x_n} - a^{x_0} = a^{x_0} (a^{x_n - x_0} - 1)$$


и от непрекъснатостта на  $a^x$  при  $x = 0$  следва  $\lim_{n \rightarrow \infty} a^{x_n} = a^{x_0}$ .

**1.37.** Нека функцията  $f(x)$  удовлетворява следните условия:

а) дефинирана е в интервала  $[a, b]$  и множеството от функционалните ѝ стойности е  $M$ ;

б)  $f(x)$  е строго растяща.

Докажете, че обратната ѝ функция  $\varphi(y)$  е непрекъснатата във всяка точка от  $M$  (фиг. 7).



Фиг. 7

**Решение.** Ако точката  $y_0$  е изолирана точка на  $M$ , то  $\varphi(y)$  е непрекъснатата в точката  $y_0$  по дефиниция.

Нека  $y_0$  е лява точка на съгъстяване на  $M$ . Да разгледаме произволна редица от точки  $y_n \in M$ ,  $y_n < y_0$ , клоняща към  $y_0$ .

Да въведем следните означения:  $x_n = \varphi(y_n)$ ,  $x_0 = \varphi(y_0)$  и  $M^* = \{y : y \in M \text{ и } y \leq y_0\}$ . Ясно е, че  $y_n = f(x_n)$  и  $y_0 = f(x_0)$ .

Тъй като  $\varphi(y)$  е обратна на растяща функция, тя е също растяща.

Сега ще приложим зад. 1.32. Да отбележим, че при доказателството в зад. 1.32 не беше съществено, че разгледаме интервала  $[a, b]$ , а само че точката  $b$  е лява точка на съгъстяване за дефиниционата област на

разглежданата там функция. За всяко  $y \in M^*$  имаме  $y \leq y_0$  и следователно  $\varphi(y) \leq \varphi(y_0)$ . Това означава, че в  $M^*$  функцията  $\varphi(y)$  е ограничена отгоре и според зад. 1.32 тя притежава лява граница в

точката  $y_0$  и

$$x_n = \varphi(y_n) \leq B = \lim_{\substack{y \rightarrow y_0 \\ y < y_0}} \varphi(y) = \sup_{y < y_0} \varphi(y) \leq \varphi(y_0) = x_0.$$

От  $x_n \leq B \leq x_0$  следва, че  $B \in [a, b]$  и тогава можем да пресметнем  $f(B)$ . Да отбележим изрично, че на това място използваме, че  $f(x)$  е дефинирана в интервал. Понеже  $f(x)$  е растяща,

то

$$y_n = f(x_n) \leq f(B) \leq f(x_0) = y_0.$$

След граничен преход получаваме

$$y_0 \leq f(B) \leq y_0, \text{ т.е. } f(B) = y_0,$$

а отгук имаме

$$\lim_{\substack{y \rightarrow y_0 \\ y < y_0}} \varphi(y) = B = \varphi(f(B)) = \varphi(y_0).$$

С това показахме, че  $\varphi(y)$  е непрекъснатата отляво в точката  $y_0$ . Аналогично се доказва, че ако  $y_0$  е десна точка на съгъстяване на  $M$ , то  $\varphi(y)$  е непрекъснатата отлясно.

**1.38.** Докажете, че функциите  $\sqrt[n]{x}$ ,  $\arcs \operatorname{tg} x$ ,  $\arcs \operatorname{sinh} x$ ,  $\arcs \operatorname{cosh} x$ ,  $\ln x$  и  $\arcs \operatorname{coid} x$  са непрекъснати във всяка точка на дефиниционната си област.

Упътване. Използвайте, че тези функции са обратни на монотонни функции, и приложете зад. 1.37.

**1.39.** Нека  $a > 1$  и  $n \in \mathbb{N}$ . Докажете, че съществува число  $A$  такова, че за всяко  $x > A$  е в сила  $a^x > x^n$ .

**Решение.** Нека  $x$  е произволно число, по-голямо от  $n + 1$ . Да означим  $k = [x]$ , т.е.  $k \leq x < k + 1$  и  $k \in \mathbb{N}$ . Тогава  $k \geq n + 1$ . Ако  $a = a - 1$ , то  $a > 0$  и

$$\begin{aligned} a^k \geq a^k &= (1+a)^k = \binom{k}{0} + \dots + \binom{k}{n+1} a^{n+1} + \dots + \binom{k}{k} a^k \\ &\geq \binom{k}{n+1} a^{n+1}, \quad x^n \leq (k+1)^n. \end{aligned}$$

Тъй като  $\binom{k}{n+1} a^{n+1} - (k+1)^n$  е полином на  $k$  от  $(n+1)$ -ва степен с коефициент пред  $k^{n+1}$ , равен на  $\frac{a^{n+1}}{(n+1)!}$ , то съгласно зад. 1.13 съществува число  $B$  такава, че за всяко  $k > B$  е изпълнено

$$\binom{k}{n+1} a^{n+1} \geq (k+1)^n.$$

Нека  $A = \max(n+1, B)$ . Тогава за всяко  $x > A$  ще бъдат изпълнени неравенствата

$$a^x \geq \binom{k}{n+1} a^{n+1} \geq (k+1)^n \geq x^n.$$

1.40. Докажете, че ако  $a > 1$  и  $\alpha > 0$ , то:

- а)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty$ ;      б)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = +\infty$ ;  
 в)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = +\infty$ ;      г)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{x^\alpha} = +\infty$ ;  
 д)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{\log_a x} = +\infty$ ;      е)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0$ ;  
 ж)  $\lim_{x \rightarrow 0} \log_a x = -\infty$ ;      з)  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x^\alpha \log_a x = 0$ .

Решение. а) Съгласно зад. 1.39 съществува число  $A$  такава, че при  $x > A$  е изпълнено  $a^x > x$ .

Нека  $B$  е произволно число. Да означим  $C = \max(A, B)$ . Тогава за всяко  $x > C$  ще бъде в сила  $a^x > x > B$ . С това показваме, че  $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty$ .

б) Да разгледаме редицата  $\log_a a^n = n$ . Тя е неограничена и следователно функцията  $\log_a x$  е неограничена отгоре. Тъй като при  $a > 1$  функцията  $\log_a x$  е монотонно растяща, то от зад. 1.32 следва  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = \infty$ .

в) Следва от а), б) и от равенството  $x^a = e^{a \ln x}$ .

г) Нека  $k = [a]$ . Съгласно зад. 1.39 съществува число  $A$  такава, че при  $x > A$  е изпълнено  $a^x > x^{k+2}$ .

Нека  $B$  е произволно число. Да означим  $C = \max(A, B)$ . Тогава за всяко  $x > C$  ще бъде в сила

$$a^x \geq x^{k+2} = x^{k+1} x \geq x^\alpha B.$$

Така получихме, че за всяко  $x > C$  ще е изпълнено  $\frac{a^x}{x^\alpha} \geq B$ , а това означава, че  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{x^\alpha} = +\infty$ .

д) Да положим  $\log_a x = t$ , т.е.  $x = a^t$ . От б) имаме

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} t = \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = +\infty.$$

Тогава

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{\log_a x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(a^t)^\alpha}{t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left( \frac{a^\alpha}{t^\alpha} \right) = \infty.$$

Последното равенство следва от в) и г).

ж) и з) Положете  $t = \frac{1}{x}$ .

## § 2. Пресмятане на някои граници

От дефиницията на Хайне (§ 1) и теоремите за граници на редиците следват теоремите.

**Теорема 1.** Ако функциите  $f(x)$  и  $g(x)$  притежават граници при  $x$ , клонящо към  $x_0$ , то функциите  $f(x) + g(x)$ ,  $f(x) - g(x)$  и  $f(x)g(x)$  притежават граници при  $x$ , клонящо към  $x_0$ , и са в сила равенствата:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x),$$



$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) - \lim_{x \rightarrow x_0} g(x),$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \lim_{x \rightarrow x_0} g(x).$$

**Теорема 2.** Ако функциите  $f(x)$  и  $g(x)$  притежават граници при  $x$ , клонящо към  $x_0$ , и  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0$ , то функцията  $\frac{f(x)}{g(x)}$  притежава граница при  $x$ , клонящо към  $x_0$ , и с в сила равенството

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}$$

**Теорема 3.** Ако съществуват границите  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$  и  $\lim_{x \rightarrow a} F(x)$ , то функцията

$\varphi(x) = F(f(x))$  притежава граница при  $x$ , клонящо към  $x_0$ , и е в сила равенството

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow a} F(x)$$

Понякога за удобство ще използваме следните понятия:

**Дефиниция 1.** Ще казваме, че функцията  $f(x)$  е безкрайно малка в точката  $x_0$ ,

ако  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ .

**Дефиниция 2.** Ще казваме, че функцията  $g(x)$  е безкрайно малка в точката  $x_0$  от по-висок ред, отколкото функцията  $f(x)$ , ако  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$ . Това ще отбелязваме така:  $g(x) = o(f(x))$  ( $x \rightarrow x_0$ ).

Непосредствено от теорема 1 следва, че ако  $h(x)$  и  $g(x)$  са безкрайно малки в точката  $x_0$  от по-висок ред, отколкото функцията  $f(x)$ , то и функциите  $h(x) \pm g(x)$ ,  $Ag(x)$  и  $f(x)g(x)$  са безкрайно малки от по-висок ред в точката  $x_0$ , отколкото функцията  $f(x)$ . Накратко това ще отбелязваме по следния начин:

$$o(f) + o(f) = o(f) \quad (x \rightarrow x_0),$$

$$Ao(f) = o(f) \quad (x \rightarrow x_0),$$

$$o(f) o(f) = o(f) \quad (x \rightarrow x_0).$$

Понякога, когато е ясно в коя точка се извършват пресмятанята, ще пишем само  $o(f)$  вместо  $o(f)(x \rightarrow x_0)$ .

При нашите разсъждения често ще използваме зад. 1.16 и 1.17.

**2.1. Пресметнете следните граници:**

а)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 1}{2x - 5}$ ;      б)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x + 5}{x^2 - 5}$ ;

в)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 2x - 1}{x^3 - 1}$ ;      г)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 12x + 20}$ ;

д)  $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 3x - 10}{3x^2 + 5x - 2}$ ;      е)  $\lim_{y \rightarrow -2} \frac{y^3 + 3y^2 + 2y}{y^2 - y - 6}$ ;

ж)  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$ ;      з)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - 1}{x - 1}, n \in \mathbb{N}$ ;

и)  $\lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3} \right)$ ;      к)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^3 - 2x^2 - x + 2}$ .

**Решение.** а) Като вземем предвид теоремите за граници на функции, получаваме:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 1}{2x + 5} = \frac{\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + x - 1)}{\lim_{x \rightarrow 1} (2x + 5)}$$

$$= \frac{\lim_{x \rightarrow 1} x^2 + \lim_{x \rightarrow 1} x - \lim_{x \rightarrow 1} 1}{\lim_{x \rightarrow 1} 2x + \lim_{x \rightarrow 1} 5} = \frac{\left( \lim_{x \rightarrow 1} x \right)^2 + 1 - 1}{\lim_{x \rightarrow 1} (2x + 5)}$$

$$= \frac{1}{2 + 5} = \frac{1}{7}.$$

в) Сега не можем да приложим директно теорема 2 за граница на частно на функции, тъй като  $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 5) = 0$ . Предварително

разлагаме на множители и съкращаваме множителите, които клонят към нула:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 2x - 1}{x^3 - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(3x+1)}{(x-1)(x^2+x+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x+1}{x^2+x+1} = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

з) В тази задача ще използваме формулата

$$(1) \quad a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1}).$$

Изразът  $a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + b^{n-1}$  се нарича спрегнат израз на израза  $a-b$ .

И така:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - 1}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + 1)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + 1) = n. \end{aligned}$$

в) Предварително трябва да приведем двете дроби към общ знаменател и да извършим необходимите съкращения:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3} \right) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1+x+x^2-3}{(1-x)(1+x+x^2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+2)}{(1-x)(x^2+x+1)} = - \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+2}{x^2+x+1} = -1. \end{aligned}$$

2.2. Пресметнете следните граници:

а)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^5 - (1+5x)}{x^2}$ ;

б)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^n - (1+nx)}{x^2}$ ,  $n \in \mathbf{N}$ ;

в)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+mx)^n - (1+nx)^m}{x^2}$ ,  $n, m \in \mathbf{N}$ ;

г)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1+x+x^2+\dots+x^n - (n+1)}{x-1}$ ,  $n \in \mathbf{N}$ ;

д)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{n+1} - (n+1)x + n}{(x-1)^2}$ ,  $n \in \mathbf{N}$ ;

е)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{n+1} - x^{k+1} + x^k - nx + n - 1}{(x-1)^2}$ ,  $n, k \in \mathbf{N}$ ;

ж)  $\lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{n}{1-x^n} - \frac{m}{1-x^m} \right)$ ,  $n, m \in \mathbf{N}$ .

Решение. а) От равенството

$$\begin{aligned} (1+x)^5 &= \binom{5}{0} + \binom{5}{1}x + \binom{5}{2}x^2 + \binom{5}{3}x^3 + \binom{5}{4}x^4 + \binom{5}{5}x^5 \\ &= 1 + 5x + 10x^2 + o(x^2) \end{aligned}$$

(с  $o(x^2)$  означиме  $\varphi(x) = \binom{5}{3}x^3 + \binom{5}{4}x^4 + \binom{5}{5}x^5$ , тъй като в

точката 0 имаме  $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = 0$  и  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x)}{x^2} = 0$ )

получаваме

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^5 - (1+5x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{10x^2 + o(x^2)}{x^2} = 10.$$

в) аналогично на пресмятанята в пример а) имаме

$$\begin{aligned} &\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+mx)^n - (1+nx)^m}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[ 1+nm x + \frac{n(n-1)}{2} m^2 x^2 + o(x^2) \right] - \left[ 1+nm x + \frac{m(m-1)}{2} n^2 x^2 + o(x^2) \right]}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[n(n-1)m^2 - m(m-1)n^2]x^2 + o(x^2)}{2x^2} = \frac{nm(n-m)}{2}. \end{aligned}$$



г) Ще използваме резултата от зад. 2.1, з):

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1+x+x^2+\dots+x^n-(n+1)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)+(x^2-1)+\dots+(x^n-1)}{x-1} \\ &= 1+2+3+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2} \end{aligned}$$

д) От равенства

$$\begin{aligned} \frac{x^{n+1}-(n+1)x+n}{(x-1)^2} &= \frac{x^{n+1}-x-n(x-1)}{(x-1)^2} \\ &= \frac{x(x-1)(x^{n-1}+x^{n-2}+\dots+1)-n(x-1)}{(x-1)^2} \\ &= \frac{x^n+x^{n-1}+\dots+1-(n+1)}{x-1}, \end{aligned}$$

като приложим резултата от г), получаваме

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{n+1}-(n+1)x+n}{(x-1)^2} = \frac{n(n+1)}{2}.$$

ж) Първи начин. С елементарни преобразувания тази задача се свежда до г):

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{n}{1-x^n} - \frac{m}{1-x^m} \right) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{n(1-x^m) - m(1-x^n)}{(1-x^n)(1-x^m)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{n(1-x)(1+x+x^2+\dots+x^{m-1}) - m(1-x)(1+x+x^2+\dots+x^{n-1})}{(1-x)^2(1+x+x^2+\dots+x^{m-1})(1+x+x^2+\dots+x^{n-1})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{n(1+x+x^2+\dots+x^{m-1}) - m(1+x+x^2+\dots+x^{n-1})}{1-x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \times \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(1+x+x^2+\dots+x^{n-1})(1+x+x^2+\dots+x^{m-1})} \\ &= \frac{1}{nm} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{n(1+x+x^2+\dots+x^{n-1}) - m-m(1+x+x^2+\dots+x^{n-1}-n)}{1-x} \\ &= \frac{1}{nm} \left( \frac{-nm(m-1)}{2} - \frac{-nm(n-1)}{2} \right) = \frac{n-m}{2}. \end{aligned}$$

Втори начин. В много случаи е удобно вместо да търсим граница при  $x \rightarrow x_0$ ,  $x_0 \neq 0$ , да положим  $t = x - x_0$  и да търсим граница при  $t \rightarrow 0$ . И така, полагаме  $t = x - 1$ . От равенствата

$$\begin{aligned} x^n &= (1+t)^n = \binom{n}{0} + \binom{n}{1}t + \binom{n}{2}t^2 + \binom{n}{3}t^3 + \dots + \binom{n}{n}t^n \\ &= 1 + nt + o(t) = 1 + nt + \frac{n(n-1)}{2}t^2 + o(t^2), \\ x^m &= (1+t)^m = \binom{m}{0} + \binom{m}{1}t + \binom{m}{2}t^2 + \binom{m}{3}t^3 + \dots + \binom{m}{m}t^m \\ &= 1 + mt + o(t) = 1 + mt + \frac{m(m-1)}{2}t^2 + o(t^2) \end{aligned}$$

получаваме

$$\begin{aligned} & \frac{n}{1-x^n} - \frac{m}{1-x^m} = \frac{n(1-x^m) - m(1-x^n)}{(1-x^n)(1-x^m)} \\ &= \frac{n \left[ -mt - \frac{m(m-1)}{2} + o(t^2) \right] - m \left[ -nt - \frac{n(n-1)}{2} + o(t^2) \right]}{[-nt + o(t)][-mt + o(t)]} \\ &= \frac{-nm(m-1)}{2} + \frac{mn(n-1)}{2} + \frac{o(t^2)}{t^2} \\ &= \frac{(-n + \frac{o(t)}{t}) \left( -m + \frac{o(t)}{t} \right)}{t^2}, \end{aligned}$$

откъдето след граничен преход имаме

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{n}{1-x^n} - \frac{m}{1-x^m} \right) = \frac{-\frac{nm(m-1)}{2} + \frac{mn(n-1)}{2}}{(-n)(-m)} = \frac{n-m}{2}$$

2.3. Пресметнете границите:

а)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x}$ ;

в)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 - x + 1}{3x^3 + x^2 - x}$ ;

л)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x-1}{x^3 + x^2 - 2}$ ;

ж)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x^3 + 2x + 1}{x^3 - 1}$ ;

и)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1-x+x^2-x^4}{x^2+1}$ ;

к)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+1)^2(x^2+1)^2(x^3+1)^2 \dots (x^n+1)^2}{(x^n+1)^{n+1}}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .

Решение. а) Непосредствено от зад. 1.17, ж) следва

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x} = 2 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0.$$

б) Първи начин. Да изнесем пред скоби от числителя и от знаменателя най-високите степени на  $x$  и да приложим а):

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - x + 1}{2x^3 + x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^3}}{2 + \frac{1}{x}} = \frac{1}{2}.$$

Втори начин. Да използваме резултата от зад. 1.16. Числителят и знаменателят са полиноми от една и съща степен — втора, и следователно търсената граница е равна на частното от коефициентите пред вторите степени:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1x^2 - x + 1}{2x^2 + x} = \frac{1}{2}.$$

г) Знаменателят е от по-висока степен, отколкото числителя. Следователно съгласно зад. 1.16, б) имаме

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+2}{x^2-3x-1} = 0.$$

е) Числителят е от по-висока степен, отколкото знаменателя, и частното от коефициентите пред най-високите степени е положително число. Следователно

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 - 1}{x^3 - x^2 + x + 2} = +\infty.$$

ж) Отново числителят е от по-висока степен, отколкото знаменателя, но сега частното от коефициентите пред най-високите степени е отрицателно число. Следователно

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x^3 + 2x + 1}{x^2 - 1} = -\infty.$$

з) Първи начин. Да изнесем пред скоби от числителя и от знаменателя най-високите степени. Тогава

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^4 - x^3 + 1}{x^3 - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} x \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^4}}{1 - \frac{1}{x^3}} = -\infty \cdot 2 = -\infty.$$



Втори начин. Отново числителят на дробта е от по-висока степен, отколкото знаменателя, и следователно границата ще бъде  $+\infty$  или  $-\infty$ , но понеже  $x \rightarrow -\infty$ , сега не е достатъчно да съобразим какъв е знакът на частното от коефициентите пред най-високите степени. В този случай трябва да разберем дали разликата от степените показатели е четно или нечетно число: ако тази разлика е четна, знакът пред безкрайността ще бъде еднакъв със знака на частното от коефициентите пред най-високите степени, а ако разликата е нечетно число, ще трябва да вземем противоположния знак (докажете това твърдение!). Тъй като в нашия случай въпросната разлика е 1, т.е. нечетно число, а частното от коефициентите е 2, т.е. е положително число, то

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^4 - x^3 + 1}{x^3 - 1} = -\infty.$$

к) Числителят е от степен  $2(1 + 2 + 3 + \dots + n) = n(n+1)$ , числителя, и в знаменателя коефициентът пред най-високата степен е равен на 1. Следователно

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+1)^2 (x^2+1)^2 \dots (x^n+1)^2}{(x^n+1)^{n+1}} = 1.$$

2.4. Пресметнете границите:

а)  $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{2t}{1-t^2};$

б)  $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{2t}{(1-t^2)^2};$

в)  $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{2t^2+2}{t^2-3t+2};$

г)  $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2-1}{t^2-4t^2+5t^2-2};$

д)  $\lim_{t \rightarrow -1} \frac{3t+2}{t^2+3t+2};$

е)  $\lim_{t \rightarrow 4} \frac{t^2-5t+4}{(t-4)^2};$

ж)  $\lim_{t \rightarrow 2} \frac{t^2+1}{t^2-5t+8t-4};$

з)  $\lim_{t \rightarrow 2} \frac{t^2-4}{t^2-5t+8t-4}.$

Решение. а) Имаме

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{2t}{1-t^2} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{2t}{1+t} \lim_{t \rightarrow 1} \frac{1}{1-t} = 1 \cdot (+\infty) = +\infty.$$

При намирането на границата използвахме, че  $1-t \rightarrow 0$  с положителни стойности и съгласно зад. 1.17, д)

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{1}{1-t} = +\infty.$$

б) В този случай знаменателят е винаги положително число и затова лявата и дясната граница на частното са равни на  $+\infty$ . Оттук, като вземем предвид, че числителят има положителна граница, съгласно зад. 1.17, г) получаваме

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{2t}{(1-t^2)^2} = +\infty.$$

в) От равенството

$$\frac{2t^2+2}{(t-1)(t-2)} = \frac{2t^2+2}{t-2} \cdot \frac{1}{t-1},$$

като вземем предвид, че  $t-1 > 0$  и  $\lim_{t \rightarrow 1} (t-1) = 0$ , получа-

$$\text{ваме } \lim_{t \rightarrow 1} \frac{2t^2+2}{t^2-3t+2} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{2t^2+2}{t-2} \cdot \lim_{t \rightarrow 1} \frac{1}{t-1} = (-4) \cdot (-\infty) = +\infty.$$

г) От равенството

$$\frac{t^2-1}{t^2-4t^2+5t-2} = \frac{(t+1)(t-1)}{(t-1)^2(t-2)} = \frac{t+1}{t-2} \cdot \frac{1}{t-1},$$

като вземем предвид, че  $t-1 > 0$  и  $\lim_{t \rightarrow 1} (t-1) = 0$ , получа-

ваме

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2-1}{t^2-4t^2+5t-2} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t+1}{t-2} \cdot \lim_{t \rightarrow 1} \frac{1}{t-1} = (-2) \cdot (+\infty) = -\infty.$$

2.5. Пресметнете границите:

- а)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x^2}$ ; б)  $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{1+2x}-3}{\sqrt{x}-2}$ ;
- в)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}-1}{3\sqrt{x}-1}$ ; г)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2+p^2}-p}{\sqrt{x^2+q^2}-q}$ ,  $p, q > 0$ ;
- д)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x}-3\sqrt{1-x}}{x}$ ; е)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x^2}-4\sqrt{1-2x}}{\sqrt{1+x}-3\sqrt{1-x}}$ ;
- ж)  $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt{9+2x}-5}{3\sqrt{x}-2}$ ; з)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{7+x^2}-\sqrt{3+x}}{x-1}$ ;
- и)  $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt{x+2}-3\sqrt{x+20}}{4\sqrt{x+9}-2}$ ;
- к)  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{a+\sqrt{x-a}}}{\sqrt{x^2-a^2}}$ ,  $a > 0$ ; л)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x}$ ;
- м)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[2]{1+ax}-1}{x}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ; н)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-1-\frac{x}{2}}{x^2}$ ;
- о)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[2]{1+x}-1-\frac{x}{n}}{x^2}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ;
- п)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{8}}{x^3}$ ;
- р)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[2]{1+\alpha x} - \sqrt[2]{1+\beta x} - 1}{x}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ;

**Решение.** При решаването на тези задачи ще използваме, че функцията  $\sqrt{x}$  е непрекъсната за всяко  $x \geq 0$  (зад. 1.10). Един от стандартните методи за решаване на такива задачи е използване на формула (1) за премахване на радикалите.

а) След умножаване на числителя и знаменателя със спрегнатия израз на числителя получаваме

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x^2}-1)(\sqrt{1+x^2}+1)}{x^2(\sqrt{1+x^2}+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}+1} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

в) Първи начин. Умножаваме и разделяме на спрегнатите изрази на числителя и знаменателя:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}-1}{3\sqrt{x}-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)(\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{x}+1)}{(3\sqrt{x}-1)(\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{x}+1)(\sqrt{x}+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{x}+1}{\sqrt{x}+1} = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Втори начин. Полагаме  $\sqrt{x} = t$ . Очевидно  $t \rightarrow 1$  и следователно

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}-1}{3\sqrt{x}-1} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2-1}{t^3-1} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t+t+1}{t+1} = \frac{3}{2}.$$

е) За да премахнем радикалите в числителя, ще използваме формула (1) при  $n = 12$ , а за знаменателя — при  $n = 6$ . За да опростим пресмятанята, ще въведем следните означения:  $a = \sqrt[3]{1+x^2}$ ,  $b = \sqrt[4]{1-2x}$ ,  $c = \sqrt{1+x}$  и  $d = \sqrt[3]{1-x}$ .

Тогава спрегнатите изрази на числителя и знаменателя ще бъдат съответно

$$A = a^{11} + a^{10}b + a^9b^2 + \dots + ab^{10} + b^{11},$$

$$B = c^5 + c^4d + c^3d^2 + c^2d^3 + cd^4 + d^5.$$

От  $x \rightarrow 0$  следва, че  $a \rightarrow 1$ ,  $b \rightarrow 1$ ,  $c \rightarrow 1$ ,  $d \rightarrow 1$ ,  $A \rightarrow 12$  и  $B \rightarrow 6$ . Тогава



$$\begin{aligned} & \frac{\sqrt[3]{1+x^2} - \sqrt[4]{1-2x}}{\sqrt{1+x} - \sqrt[3]{1-x}} = \frac{(a-b)AB}{(c-d)BA} = \frac{(a^2 - b^{12})B}{(c^6 - d^6)A} \\ & = \frac{[(1+x^2)^4 - (1-2x)^3]B}{[(1+x)^3 - (1-x)^2]A} = \frac{[(1+o(x)) - (1-3.2x+o(x))]B}{[(1+3x+o(x)) - (1-2x+o(x))]A} \\ & = \frac{[6x+o(x)]B}{[5x+o(x)]A}. \end{aligned}$$

Да отбележим, че с  $o(x)$  означиме събирасми, които съдържат  $x$  на степен, по-голяма или равна на 2. Ясно е, че те са безкрайно малки от ред, по-висок, отколкото  $x$ . Сега имаме

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x^2} - \sqrt[4]{1-2x}}{\sqrt{1+x} - \sqrt[3]{1-x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(6x+o(x))B}{(5x+o(x))A} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(6 + \frac{o(x)}{x}\right)B}{\left(5 + \frac{o(x)}{x}\right)A} = \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{12} = \frac{3}{5}. \end{aligned}$$

Втори начин. Нека  $a$ ,  $b$ ,  $c$  и  $d$  са функциите от първи начин. Ще пресметнем четири помощни граници:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x^2} - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x(a^2 + a + 1)} = 0, \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt[4]{1-2x}}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x(b^3 + b^2 + b + 1)} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(c+1)} = \frac{1}{2}, \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt[3]{1-x}}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(d^2 + d + 1)} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

Оттук получаваме

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x^2} - \sqrt[4]{1-2x}}{\sqrt{1+x} - \sqrt[3]{1-x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x^2} - 1 + 1 - \sqrt[4]{1-2x}}{\sqrt{1+x} - \sqrt[3]{1-x}} = \frac{0 + \frac{1}{2}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3\sqrt{1+x^2} - 1 - 1 - \sqrt[4]{1-2x}}{x}}{\frac{\sqrt{1+x} - 1 - 1 - \sqrt[3]{1-x}}{x}} = \frac{3}{5}. \end{aligned}$$

м) Да положим  $\sqrt[n]{1+\alpha x} = t$ . Тогава  $t \rightarrow 1$ ,  $x = \frac{t^n - 1}{\alpha}$  и

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+\alpha x} - 1}{x} &= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{(t-1)a}{t^n - 1} \\ &= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{a}{t^{n-1} + t^{n-2} + \dots + 1} = \frac{a}{n}. \end{aligned}$$

р) Първи начин. Ще използваме резултата от м). За целта правим следните преобразувания:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt[n]{1+\alpha x} \sqrt[m]{1+\beta x} - 1}{x} &= \frac{(\sqrt[n]{1+\alpha x} - 1) + (\sqrt[m]{1+\beta x} - 1)}{x} \\ &= \frac{(\sqrt[n]{1+\alpha x} - 1) \sqrt[m]{1+\beta x} + \sqrt[m]{1+\beta x} - 1}{x} \\ &= \frac{\sqrt[n]{1+\alpha x} - 1}{x} \sqrt[m]{1+\beta x} + \frac{\sqrt[m]{1+\beta x} - 1}{x}. \end{aligned}$$

Оттук получаваме

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+\alpha x} \sqrt[m]{1+\beta x} - 1}{x} = \frac{\alpha}{n} + \frac{\beta}{m}.$$

Втори начин. Да означим  $\sqrt{nm}(\sqrt{1+\alpha x})^m (\sqrt{1+\beta x})^n = t$ . Очевидно  $t \rightarrow 1$  при  $x \rightarrow 0$ .

Да направим следните преобразувания:

$$\frac{\sqrt[n]{1+\alpha x} \sqrt[m]{1+\beta x} - 1}{x} = \frac{\sqrt{nm}(\sqrt{1+\alpha x})^m (\sqrt{1+\beta x})^n - 1}{x}$$

$$= \frac{[1 + m\alpha x + o(x)][1 + \beta x + o(x)] - 1}{x(1 + t + t^2 + \dots + t^{m-1})} = \frac{m\alpha + n\beta + \frac{o(x)}{x}}{1 + t + t^2 + \dots + t^{m-1}}$$

Отук следва

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha \sqrt[1]{1 + \alpha x} + \beta x - 1}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{m\alpha + n\beta + \frac{o(x)}{x}}{1 + t + t^2 + \dots + t^{m-1}} = \frac{m\alpha + n\beta}{m}$$

2.6. Пресметнете следните граници:

а)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + 3}}{3\sqrt{x^3 + 1}}$ ;

б)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 3}}{3\sqrt{x^3 + 1}}$ ;

в)  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x})$ ;

г)  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 - 1})$ ;

д)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 1} + x)$ ;

е)  $\lim_{x \rightarrow \infty} (3\sqrt{x^3 + 3x^2} - \sqrt{x^2 + 2x})$ ;

ж)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (3\sqrt{x^3 + 3x^2} + \sqrt{x^2 + 2x})$ ;

з)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}$ ;

и)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x(\sqrt{x^2 + 1} + x)$ .

к)  $\lim_{x \rightarrow \infty} x(\sqrt{x^2 + 2x} - 2\sqrt{x^2 + x + x})$ .

Решение. а) Задачата ще решим, като изнесем най-високите степени на  $x$  пред радикалите:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + 3}}{3\sqrt{x^3 + 1}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x\sqrt{1 + \frac{3}{x^2}}}{x^3\sqrt{1 + \frac{1}{x^3}}} = -1.$$

При изнасянето на  $x$  от  $\sqrt{x^2 + 3}$  използвахме, че  $x \rightarrow \infty$  и следователно можем да смятаме, че  $x > 0$ , откъдето имаме  $\sqrt{x^2} = x$ .

б) Аналогично на пример а)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 3}}{3\sqrt{x^3 + 1}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x\sqrt{1 + \frac{3}{x^2}}}{x^3\sqrt{1 + \frac{1}{x^3}}} = -1.$$

Сега от  $x \rightarrow -\infty$  следва, че можем да смятаме, че  $x < 0$  и тогава  $\sqrt{x^2} = -x$ .

в) Като умножим и разделим със спрегнатия израз, получаваме

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x}) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = 0.$$

д) Като изнесем  $x$  пред корена и положим  $t = \frac{1}{x}$ , ще сведем решението до зад. 2.5, а). Тогава

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 1} + x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left( -x\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + x \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\sqrt{1+t^2} + 1}{t} \cdot \frac{t}{t} = \frac{1}{2} \cdot 0 = 0. \end{aligned}$$

Използвахме, че  $x \rightarrow -\infty$  и следователно можем да смятаме, че  $x < 0$ , откъдето  $\sqrt{x^2} = -x$ .

к) Да положим  $t = \frac{1}{x}$ . Тогава  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} t = 0$ . Да

направим преобразуването



$$x(\sqrt{x^2+2x}-2\sqrt{x^2+x+x})$$

$$= x^2 \left( \sqrt{1 + \frac{2}{x}} - 2\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1 \right) = \frac{\sqrt{1+2t} - 2\sqrt{1+t} + 1}{t^2}$$

Границата  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2t} - 2\sqrt{1+t} + 1}{t^2}$  можем да намерим по

два начина.

Първи начин.

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2t} - 2\sqrt{1+t} + 1}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+2t}+1)^2 - 4(1+t)}{t^2(\sqrt{1+2t}+1+2\sqrt{1+t})}$$

$$= \frac{1}{4} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2\sqrt{1+2t} - 2 - 2t}{t^2} = \frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(1+2t) - (1+t)^2}{t^2(\sqrt{1+2t}+1+t)} = -\frac{1}{4}$$

Втори начин. Ще използваме резултата от зад. 2.5, п):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{8}}{x^3} = \frac{1}{16}$$

Нека  $\varphi(x) = \frac{\sqrt{1+x} - 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{8}}{x^3}$ . Тогава от  $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = \frac{1}{16}$

имаме  $x^3\varphi(x) = o(x^2)$ . Така получихме

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$$

Да приложим този резултат в нашия случай:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2t} - 2\sqrt{1+t} + 1}{t^2}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\left[ 1 + \frac{2t}{t} - \frac{4t^2}{8} + o(t^2) \right] - 2 \left[ 1 + \frac{t}{2} - \frac{t^2}{8} + o(t^2) \right] + 1}{t^2} \\ = \lim_{t \rightarrow 0} \left( -\frac{1}{4} + \frac{o(t^2)}{t^2} \right) = -\frac{1}{4}$$

2.7. Пресметнете следните граници:

а)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x}$ ;

б)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{x}$ ;

в)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{\sin 5x}$ ;

г)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin nx}{\sin mx}$ ,  $m \neq 0$ ;

д)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x}$ ;

е)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(a+x) - \sin(a-x)}{x}$ .

Решение. При решаването на тези задачи ще използваме непрекъснатостта на тригонометричните функции и основната граница  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ . Да отбележим изрично, че съгласно

теорема 3 от  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$  следва  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin(f(x))}{f(x)} = 1$ .

а) За да използваме основната граница, аргументът на синуса и знаменателят трябва да бъдат равни на една и съща функция, кляюща към нула. За това ще умножим и разделим с 2:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 2 \frac{\sin 2x}{2x} = 2$$

в) За да сведем до основната граница, ще умножим и разделим на  $x$ :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{\sin 5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{4x} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{4}{5}$$

д) От непрекъснатостта на  $\cos x$  и основната граница получаваме

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} = 1.$$

е) След елементарни тригонометрични преобразувания имаме

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(a+x) - \sin(a-x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos a \sin x}{x} = 2 \cos a.$$

2.8. Пресметнете следните граници:

а)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin \pi x}{x-1};$

б)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\frac{\pi}{2} - k};$

в)  $\lim_{x \rightarrow \frac{3\pi}{2}} \frac{\cos x}{3\pi - x};$

г)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{1-2\cos x}{x - \frac{\pi}{3}};$

д)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\cos x - \sin x}{\frac{\pi}{4} - x};$

е)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\operatorname{tg}^3 x - 3 \operatorname{tg} x}{\frac{\pi}{3} - x};$

Решение. а) Полагаме  $x-1=t$ . Тогава  $t \rightarrow 0$  и

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin \pi x}{x-1} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin \pi(t+1)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\sin \pi t}{t} = -\pi.$$

в) Полагаме  $\frac{3\pi}{2} - x = t$ . Тогава  $t \rightarrow 0$  и

$$\lim_{x \rightarrow \frac{3\pi}{2}} \frac{\cos x}{\frac{3\pi}{2} - x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos\left(\frac{3\pi}{2} - t\right)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\sin t}{t} = -1$$

г) Като използваме равенството  $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ , получаваме

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{1-2\cos x}{x - \frac{\pi}{3}} = 2 \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\cos \frac{\pi}{3} - \cos x}{x - \frac{\pi}{3}}$$

$$= 2 \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin \frac{x - \frac{\pi}{3}}{2} \sin \frac{x + \frac{\pi}{3}}{2}}{x - \frac{\pi}{3}} = \sqrt{3}.$$

2.9. Пресметнете границите:

а)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos ax}{x^2};$

б)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - 1}{x^2};$

в)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{1 - \cos \sqrt{x}};$

г)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos ax - \cos bx}{x^2};$

д)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x}{x^2};$

е)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos a_1 x \cos a_2 x \dots \cos a_n x}{x^2};$

ж)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \sqrt{\cos 2x}}{x^2};$       з)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \sin x} - \sqrt{\cos x}}{x^2}$

Решение. а) Като използваме формулата  $1 - \cos a = 2 \sin^2 \frac{a}{2}$ , получаваме

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos ax}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{ax}{2}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^2 \sin^2 \frac{x}{2}}{4 \left(\frac{ax}{2}\right)^2} = \frac{a^2}{2}.$$



Да отбележим, че тези разсъждения могат да се направят при  $a \neq 0$ , тъй като делим на числото  $a$ . При  $a = 0$  функцията е тъждествено равна на нула и тогава очевидно имаме

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 0}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0 = \frac{0^2}{2}.$$

С това показахме, че при всяко  $a$  е в сила

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos ax}{x^2} = \frac{a^2}{2}.$$

г) Задачата може да се реши, като в числителя се приложи формулата за разлика от косинуси и след това се използва основната граница. Друг възможен начин е тази задача да се сведе до а):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos ax - \cos bx}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos ax - 1 + 1 - \cos bx}{x^2} = -\frac{a^2}{2} + \frac{b^2}{2}.$$

д) Ще сведем до зад. а):

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x + \cos x - \cos x \cos 2x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \cos x \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2} = \frac{1^2}{2} + \frac{2^2}{2} = \frac{5}{2}. \end{aligned}$$

е) като имаме предвид а) и л), ще докажем с принципа на математическата индукция, че за всяко естествено число  $n$  е в сила

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos a_1 x \cos a_2 x \dots \cos a_n x}{x^2} = \frac{a_1^2}{2} + \frac{a_2^2}{2} + \dots + \frac{a_n^2}{2}.$$

При  $n = 1$  равенството е вярно — това е точно а).  
Нека при  $n = k$  е в сила

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos a_1 x \cos a_2 x \dots \cos a_k x}{x^2} = \frac{a_1^2}{2} + \frac{a_2^2}{2} + \dots + \frac{a_k^2}{2}.$$

Тогава

$$\begin{aligned} &\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos a_1 x \cos a_2 x \dots \cos a_k x \cdot \cos a_{k+1} x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos a_1 x \cdot \cos a_2 x \dots \cos a_k x}{x^2} \cos a_{k+1} x + \frac{1 - \cos a_{k+1} x}{x^2} \\ &= \left( \frac{a_1^2}{2} + \frac{a_2^2}{2} + \dots + \frac{a_k^2}{2} \right) + \frac{a_{k+1}^2}{2}. \end{aligned}$$

което трябваше да се докаже.

2.10. Пресметнете следните граници:

а)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{\sin^3 x}$ ;      б)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \sin x} - \sqrt{1 - \sin x}}{\operatorname{tg} x}$ ;

в)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2 - \sqrt{1 + \cos x}}}{\sin^2 x}$ ;      г)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x}$ ;

д)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{1 - 2\cos x}{\sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right)}$ ;      е)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\operatorname{tg}^3 x - 3\operatorname{tg} x}{\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)}$ ;

ж)  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x})$ ;      з)  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\cos \sqrt{x+1} - \cos \sqrt{x})$ .

Решение. г) Да положим  $\cos x = t^6$ . От  $x \rightarrow 0$  следва  $t \rightarrow 1$  и

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x} &= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^6 - t^2}{1 - t^{12}} \\ &= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{-t^2}{1 + t + t^2 + \dots + t^{11}} = -\frac{1}{12}. \end{aligned}$$

е) От равенствата

$$\begin{aligned} \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) &= \cos x \cos \frac{\pi}{6} - \sin x \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x - \frac{1}{2} \sin x \\ &= \frac{\cos x}{2} (\sqrt{3} - \operatorname{tg} x) \end{aligned}$$

получаваме

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\operatorname{tg}^2 x - 3 \operatorname{tg} x}{\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\operatorname{tg} x (\operatorname{tg} x - \sqrt{3}) (\operatorname{tg} x + \sqrt{3})}{\frac{\cos x}{2} (\sqrt{3} - \operatorname{tg} x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{2 \operatorname{tg} x (\operatorname{tg} x + \sqrt{3})}{\cos x} = \frac{2\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{3}}{\frac{1}{2}} = 24.$$

ж) От равенството

$$\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x} = 2 \sin \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{2} \cos \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{2},$$

като приложим зад. 2.6, в) и 1.21., получаваме

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x}) = 0.$$

2.11. Пресметнете следните граници:

- а)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x}$ ;      б)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 3x}{x}$ ;  
 в)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin \operatorname{tg} x}{x}$ ;      г)  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\arcsin \operatorname{tg} x - \arcsin \operatorname{tg} x_0}{x - x_0}$ ;  
 д)  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\arcsin x - \arcsin x_0}{x - x_0}$ ,  $-1 < x_0 < 1$ ;

е)  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\arcsin \cos x - \arcsin \cos x_0}{x - x_0}$ ,  $-1 < x_0 < 1$ ;

ж)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - \arcsin \operatorname{tg} x}{x^3}$ ;      з)  $\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} \frac{\sqrt{\pi - \sqrt{\arcsin \cos x}}}{\sqrt{x+1}}$ ;

и)  $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left( \arcsin \operatorname{tg} \frac{x+1}{x+2} - \frac{\pi}{4} \right)$ ;

к)  $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left( \arcsin \operatorname{tg} \frac{x+1}{x+2} - \arcsin \operatorname{tg} \frac{x}{x+2} \right)$ .

Решение. а) Да положим  $t = \arcsin x$ , т.е.  $x = \sin t$ . От непрекъснатостта на функцията  $\arcsin \sin x$  (зад. 1.38) следва, че при  $x \rightarrow 0$  имаме  $t \rightarrow 0$ . Тогава

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sin t} = 1.$$

г) Да положим  $t = \arcsin \operatorname{tg} x$ , т.е.  $x = \operatorname{tg} t$ . От непрекъснатостта на функцията  $\arcsin \operatorname{tg} x$  (зад. 1.38) следва, че при  $x \rightarrow 0$  имаме  $t \rightarrow 0$ . Тогава

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\arcsin \operatorname{tg} x - \arcsin \operatorname{tg} x_0}{x - x_0} &= \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{t - t_0}{\operatorname{tg} t - \operatorname{tg} t_0} \\ &= \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{(t - t_0) \cos t \cdot \cos t_0}{\sin(t - t_0)} = \cos^2 t_0 = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 t_0} = \frac{1}{1 + x_0^2}. \end{aligned}$$

ж) От  $\lim_{x \rightarrow 0} (\arcsin x - \arcsin \operatorname{tg} x) = 0$  и от основната граница

имаме

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - \arcsin \operatorname{tg} x}{\sin (\arcsin x - \arcsin \operatorname{tg} x)} = 1.$$

Тогава

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - \arcsin \operatorname{tg} x}{x^3}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\arcsin x - \arcsin \operatorname{tg} x)}{\sin(\arcsin x - \arcsin \operatorname{tg} x)} \frac{\sin(\arcsin x - \arcsin \operatorname{tg} x)}{x^3} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - \arcsin \operatorname{tg} x}{\sin(\arcsin x - \arcsin \operatorname{tg} x)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\arcsin x - \arcsin \operatorname{tg} x)}{x^3} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\arcsin x) \cos(\arcsin \operatorname{tg} x) - \cos(\arcsin x) \sin(\arcsin \operatorname{tg} x)}{x^3} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \frac{1}{1+x^2} - \frac{x}{1+x^2} \sqrt{1-x^2}}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1-x^2}}{x^2} = \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

2.12. Докажете, че:

а)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ ;

в)  $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x\right)^{\frac{1}{x}} = e$ .

Решение. а) Нека  $\epsilon$  е произволно положително число. От  

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = e$$
следва, че съществува число  $n_0$  такова, че при  $n > n_0$  са изпълнени  
неравенствата

$$e - \epsilon < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} < e + \epsilon.$$

Нека  $A = n_0 + 1$  и нека  $x$  е произволно число, по-голямо от  $A$ .  
Да означим с  $n$  числото  $[x]$ , т.е.  $n$  е естествено число, за което  
 $n \leq x < n + 1$ . Оттук следва, че  $n_0 < n$  и следователно са в сила  
неравенствата

$$e - \epsilon < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} < e + \epsilon,$$

или

$$\left| \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - e \right| < \epsilon \text{ за всяко } x > A.$$

б) Да положим  $-x = t$ . Понеже  $x \rightarrow -\infty$ , то  $t \rightarrow \infty$ . Тогава

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x &= \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{t}\right)^{-t} = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{t}{t-1}\right)^t \\
&= \lim_{t \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{t-1}\right)^{t-1} \left(1 + \frac{1}{t-1}\right)\right] = e \cdot 1 = e.
\end{aligned}$$

в) Ако положим  $t = \frac{1}{x}$  и приложим резултата от а) и б), ще  
се окаже, че съществуват лявата и дясната граница при  $x \rightarrow 0$ , и че  
тези две граници са равни на  $e$ , а това означава, че границата при  
 $x \rightarrow 0$  съществува и

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e.$$

2.13. Да се докаже, че ако  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ ,  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$ ,  
 $a > 0$  и  $f(x) > 0$ , то

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x))^{g(x)} = a^b.$$

Решение. Верността на твърдението следва от непрекъснатостта на  $e^x$ ,  $\ln x$  и равенството  $a^x = e^{x \ln a}$ .

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x))^{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} e^{g(x) \ln f(x)} = e^{b \ln a} = a^b.$$

2.14. Да се докаже, че ако  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$ , то

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{f(x)}{x}\right)^x = e^a.$$



Решение. От  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$  следва  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0$ . Тогава според зад. 2.12

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{f(x)}{x} \right)^{\frac{x}{f(x)}} = e.$$

Сега от равенството

$$\left( 1 + \frac{f(x)}{x} \right)^x = \left[ \left( 1 + \frac{f(x)}{x} \right)^{\frac{x}{f(x)}} \right]^{f(x)}$$

и зад. 2.13 получаваме

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{f(x)}{x} \right)^x = e^a.$$

2.15. Докажете следните основни равенства:

а)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{\ln y}{y-1} = 1;$

б)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1;$  в)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a, a > 0.$

Решение. а) От непрекъснатостта на функцията  $\ln x$  и равенството  $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$  получаваме

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln e = 1$$

б) Да положим  $t = e^x$ . От  $x \rightarrow 0$  и непрекъснатостта на  $e^x$  следва  $t = e^x \rightarrow e^0 = 1$ . Сега да заместим  $x$  с  $\ln t$  и приложим а):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t - 1}{\ln t}.$$

в) Следва непосредствено от б) и формулата  $a^x = e^{x \ln a}$ .

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln a} - 1}{x \ln a} \ln a = \ln a.$$

2.16. Нека функциите  $f(x)$  и  $g(x)$  удовлетворяват условията:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow x_0} |g(x)| = \infty \quad \text{и} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - 1) g(x) = a. \quad \text{Докажете, че}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = e^a.$$

Решение. От равенството

$$f(x)^{g(x)} = \left[ (1 + (f(x) - 1))^{\frac{1}{f(x) - 1}} \right]^{(f(x) - 1)g(x)},$$

както използваме условията на задачата, зад. 2.12. и 2.13, получаваме исканото равенство.

2.17. Пресметнете следните граници:

а)  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln x - \ln x_0}{x - x_0}, x_0 > 0;$

б)  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{e^x - e^{x_0}}{x - x_0};$

в)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \cos x - 1}{x};$

г)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x^2};$

д)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^{\cos x} - a}{x^2}, a > 0;$

е)  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x \ln a - a \ln x}{x - a}, a > 0;$

ж)  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{a^x - x^a}{x - a}, a > 0;$

з)  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left( \frac{1}{a^x} - \frac{1}{a^{x+1}} \right), a > 0;$

и)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos ax}{\ln \cos bx}, b \neq 0;$

к)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sqrt{1+x}} - e^{\frac{x}{2}}}{x^2}.$

Решение. С елементарни преобразуваания решението на тези задачи се свежда до основните граници, намисрени в зад. 2.15.

а) От равенството

$$\frac{\ln x - \ln x_0}{x - x_0} = \frac{1}{x_0} \cdot \frac{\ln t}{t - 1},$$

като вземем предвид, че  $t = \frac{x}{x_0} \rightarrow 1$  при  $x \rightarrow x_0$ , получаваме

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln x - \ln x_0}{x - x_0} = \frac{1}{x_0}.$$

б) От равенството

$$\frac{e^x - e^{x_0}}{x - x_0} = e^{x_0} \frac{e^{t-x_0} - 1}{t - 1},$$

като вземем предвид, че  $t = x - x_0 \rightarrow 0$  при  $x \rightarrow x_0$ , получаваме

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{e^x - e^{x_0}}{x - x_0} = e^{x_0}.$$

в) От равенството

$$\frac{e^x \cos x - 1}{x} = \frac{(e^t - 1 + 1) \cos x - 1}{x} = \frac{e^t - 1}{x} \cos x + \frac{\cos x - 1}{x^2} x,$$

като вземем предвид, че  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$  (зад. 2.9, а), получаваме

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \cos x - 1}{x} = 1.$$

г) Да направим следните преобразуваания при  $\alpha \neq 0$ :

$$\frac{1 - \cos^\alpha x}{x^2} = \frac{1 - e^{\alpha \ln \cos x}}{x^2}$$

$$= -\frac{e^{\alpha \ln \cos x} - 1}{\alpha \ln \cos x} \cdot \frac{\alpha \ln \cos x}{\cos x - 1} \cdot \frac{\cos x - 1}{x^2}.$$

От това равенство, като вземем предвид, че  $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$  и

$\lim_{x \rightarrow 0} (\alpha \ln \cos x) = 0$ , получаваме

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^\alpha x}{x^2} = \frac{\alpha}{2}.$$

Очевидно този резултат е верен и при  $\alpha = 0$ .

и) От равенството (при  $a \neq 0$ )

$$\frac{\ln \cos ax}{\ln \cos bx} = \frac{\ln \cos ax}{\cos ax - 1} \cdot \frac{\cos ax - 1}{x^2} \cdot \frac{x^2}{\cos bx - 1} \cdot \frac{\cos bx - 1}{\ln \cos bx},$$

като вземем предвид, че  $\lim_{x \rightarrow 0} \cos ax = \lim_{x \rightarrow 0} \cos bx = 1$ ,

получаваме  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos ax}{\ln \cos bx} = \frac{a^2}{b^2}$ .

Очевидно този резултат е верен и при  $a = 0$ .

к) От равенството

$$\frac{e^{\sqrt{1+x}} - e^{\frac{1}{2}}}{x^2} = e^{\frac{1}{2}} \frac{e^{\sqrt{1+x} - \frac{1}{2}} - 1}{\sqrt{1+x} - 1 - \frac{x}{2}} \cdot \frac{x}{x^2},$$

като вземем предвид, че  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1 - \frac{x}{2}}{x^2} = -\frac{1}{8}$  (зад. 2.5,

и), получаваме

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sqrt{x}} - e^{-1 + \frac{x}{2}}}{x^2} = -\frac{e}{8}.$$

2.18. Пресметнете следните граници:

а)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x+1}{x-2} \right)^{2x-1};$

в)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{3x+4}{2x+2} \right)^x;$

д)  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1+\operatorname{tg} x}{1+\sin x} \right)^{\frac{1}{\sin^2 x}};$

ж)  $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x + \sin x)^{\frac{1}{x}};$

и)  $\lim_{x \rightarrow 0} (1+2\sin x)^{\operatorname{cosec} x};$

л)  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{a^2+b^2}{a^x+b^x} \right)^{\frac{1}{x}}, a > 0, b > 0;$

н)  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{xe^x+1}{x^x+1} \right)^{\frac{1}{x}}.$

Решение. Решението на тези задачи се основава на зад. 2.16.

а) Тъй като  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+1}{x-2} = 1$ ,  $\lim_{x \rightarrow \infty} |2x-1| = +\infty$  и

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[ \left( \frac{x+1}{x-2} - 1 \right) (2x-1) \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3(2x-1)}{x-2} = 6,$$

то

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x+1}{x-2} \right)^{2x-1} = e^6.$$

в) В този случай не може да се приложи зад. 2.16, тъй като

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+4}{2x+2} = \frac{3}{2}. \text{ От равенството}$$

$$\left( \frac{3x+4}{2x+2} \right)^x = e^{\ln \frac{3x+4}{2x+2}}.$$

както използваме непрекъснатостта на  $\ln x$  и  $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$  получаваме

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{3x+4}{2x+2} \right)^x = \infty.$$

г) Тъй като

$$(1+\sin x)^{\operatorname{cosec} x} = \left[ (1+\sin x)^{\frac{1}{\sin x}} \right]^{\operatorname{cosec} x},$$

съгласно зад. 2.12 и зад. 2.13 получаваме

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+\sin x)^{\operatorname{cosec} x} = e^1 = e.$$

л) Тъй като  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^2+b^2}{a^x+b^x} = 1$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{1}{x} \right| = \infty$ ,

то трябва да намерим границата

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{a^2-b^2}{a^x-b^x} - 1 \right) \cdot \frac{1}{x}.$$

От равенството

$$\left( \frac{a^2+b^2}{a^x+b^x} - 1 \right) \frac{1}{x} = \frac{1}{a^x+b^x} \cdot \frac{a^2-a^x+b^2-b^x}{x}$$



$$= \frac{1}{a^x + b^x} \left( a^x \cdot \frac{a^{x^2-x} - 1}{x^2-x} \cdot \frac{x^2-x}{x} + b^x \cdot \frac{b^{x^2-x} - 1}{x^2-x} \cdot \frac{x^2-x}{x} \right)$$

след граничен преход получаваме

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{a^x + b^x}{a^x + b^x} - 1 \right) \frac{1}{x} = \frac{1}{2} \left( 1 \cdot \ln a \cdot (-1) + 1 \cdot \ln b \cdot (-1) \right) = \ln \frac{1}{\sqrt{ab}}$$

Тогава

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{a^x + b^x}{a^x + b^x} \right)^{\frac{1}{x}} = e^{\ln \frac{1}{\sqrt{ab}}} = \frac{1}{\sqrt{ab}}$$

2.19. Пресметнете следните граници:

а)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \cos \frac{x}{n} + a \sin \frac{x}{n} \right)^n, n \in \mathbb{N};$

б)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos^n \frac{x}{\sqrt{n}}, n \in \mathbb{N};$

в)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} \right)^n, n \in \mathbb{N}, a, b \geq 0;$

г)  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left( \sqrt[n]{x} - n^{-1} \sqrt{x} \right), n \in \mathbb{N}, x > 0;$

д)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1^n + 2^n + \dots + n^n}{n^{\alpha+1}}, n \in \mathbb{N}, \alpha > 0;$

е)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left( \sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \sin \frac{3\pi}{n} + \dots + \sin \frac{n\pi}{n} \right), n \in \mathbb{N};$

ж)  $\lim_{t \rightarrow \infty} \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \cos \frac{x}{2^3} \dots \cos \frac{x}{2^n}.$

Решение. При решението на тези задачи ще използваме факта, че ако е известна границата  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$  и е дадена конкретна редица  $x_n \rightarrow x_0$ , то  $f(x_n) \rightarrow A$ .

а) Да разгледаме функцията

$$\varphi(t) = \left( \cos \frac{x}{t} + a \sin \frac{x}{t} \right)^t.$$

Имаме  $\lim_{t \rightarrow \infty} \left( \cos \frac{x}{t} + a \sin \frac{x}{t} \right) = 1$ . От равенството

$$\left( \cos \frac{x}{t} + a \sin \frac{x}{t} - 1 \right) t = \frac{\cos \frac{x}{t} - 1}{\frac{1}{t}} + a \frac{\sin \frac{x}{t}}{\frac{1}{t}} \cdot x,$$

като използваме зад. 2.9, а), получаваме

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left( \cos \frac{x}{t} + a \sin \frac{x}{t} - 1 \right) t = 0 + ax = ax.$$

Тогава  $\lim_{t \rightarrow \infty} \varphi(t) = e^{ax}$ .

Да разгледаме редицата с общ член  $t_n = n$ . От  $n \rightarrow \infty$  следва

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(t_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \cos \frac{x}{n} + a \sin \frac{x}{n} \right)^n = e^{ax}.$$

б) Да разгледаме функцията

$$\varphi(t) = (\cos x)^{\frac{1}{t}}.$$

Тъй като  $\lim_{t \rightarrow 0} \cos x = 1$  и съгласно зад. 2.9, а)

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\cos x - 1}{\frac{1}{t}} = -\frac{x^2}{2},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}$$

Да разгледаме редицата  $t_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ . От  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$

$$\text{следва } \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(t_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \cos \frac{x}{\sqrt{n}} \right)^n = e^{-\frac{x^2}{2}}$$

д) Съгласно първата теорема на Шолц (зад. 1.4 от гл. 1), за да докажем, че разглежданата редица е сходяща, е достатъчно да покажем, че редицата  $\frac{n^\alpha}{n^{\alpha+1} - (n-1)^{\alpha+1}}$  е сходяща и да намерим нейната граница. За целта ще разгледаме функцията  $\varphi(t) = \frac{t^{\alpha+1} - (t-1)^{\alpha+1}}{t^\alpha}$ .

Да отбележим изрично, че понеже не искаме числото  $\alpha$  непременно да е естествено, не можем да разложим числителя на множители.

От равенството

$$\begin{aligned} \frac{t^{\alpha+1} - (t-1)^{\alpha+1}}{t^\alpha} &= \frac{(t-1)^{\alpha+1} \left[ \left( \frac{t}{t-1} \right)^{\alpha+1} - 1 \right]}{t^\alpha} = \frac{(t-1)^{\alpha+1} \left[ e^{(\alpha+1) \ln \frac{t}{t-1}} - 1 \right]}{t^{\alpha+1}} \cdot \frac{1}{t} \\ &= \left( \frac{t-1}{t} \right)^{\alpha+1} \frac{(\alpha+1) \left[ e^{(\alpha+1) \ln \frac{t}{t-1}} - 1 \right]}{(\alpha+1) \ln \frac{t}{t-1}} \cdot \frac{\ln \frac{t}{t-1}}{\frac{t}{t-1} - 1} \cdot \frac{t}{t-1} \end{aligned}$$

получаваме, че  $\lim_{t \rightarrow \infty} \varphi(t) = 1 \cdot (\alpha+1) \cdot 1 \cdot 1 = \alpha+1$ .

Тогава

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^\alpha}{n^{\alpha+1} - (n-1)^{\alpha+1}} = \frac{1}{\alpha+1}$$

е) От равенството (зад. 3.16 от гл. 0)

$$\begin{aligned} & \frac{1}{n} \left( \sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \sin \frac{3\pi}{n} + \dots + \sin \frac{n\pi}{n} \right) = \\ &= \frac{\sin \frac{n\pi}{2n} \sin \frac{n+1}{2n} \pi}{n \sin \frac{\pi}{2n}} \end{aligned}$$

следва, че трябва да пресметнем границата

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \frac{\pi}{2n}$$

Но от

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2n} = 0 \text{ и } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \text{ виждаме, че}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{\pi}{2n}}{\frac{\pi}{2n}} = \frac{\pi}{2}$$

Тогава търсената граница е  $\frac{2}{\pi}$ .

з) От равенството

$$\begin{aligned} \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \dots \cos \frac{x}{2^n} &= \frac{1}{2^n} \cdot 2^n \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \dots \cos \frac{x}{2^n} \\ &= \frac{\frac{x}{2^n} \cdot \sin x}{\sin \frac{x}{2^n} \cdot x} \end{aligned}$$

следва, че трябва да пресметнем границата

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{x}{2^n}}{\sin \frac{x}{2^n}} = 0$$

и  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 1$  виждаме, че  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{2^n \sin \frac{x}{2^n}} = 1$ .

Тогава търсената граница е  $\frac{\sin x}{x}$ .

### § 3. Глобални свойства на непрекъснатите функции

**Дефиниция 1.** Ще казваме, че функцията  $f(x)$  е непрекъснатата в множеството  $D$ , ако  $f(x)$  е непрекъснатата във всяка точка от множеството  $D$ .

**Дефиниция 2.** Ще казваме, че множеството  $F$  е затворено, ако границата на всяка сходяща редица от точки, принадлежащи на  $F$ , също принадлежи на  $F$ .

**Дефиниция 3.** Ще казваме, че множеството  $K$  е компактно, ако то е затворено и всъщност означава, че множеството  $K$  е ограничено и затворено. (Това е множеството  $D$ , ако съществува число  $k > 0$  такова, че за всеки две числа  $x$  и  $y$ , принадлежащи на  $D$ , е изпълнено неравенството

$$|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|.$$

**3.1.** Докажете, че ако функцията  $f(x)$  удовлетворява условието на Липшиц в множеството  $D$ , то тя е непрекъснатата.

**Решение.** Нека  $x_0$  е произволна точка от  $D$ . Да разгледаме произволна редица  $\{x_n\}$ ,  $x_n \in D$ , клоняща към  $x_0$ . Тогава

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x - x_0| = 0 \quad \text{и от неравенството}$$

$$|f(x_n) - f(x_0)| \leq k|x_n - x_0|$$

след граничен преход получаваме

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n) - f(x_0)| = 0, \quad \text{т.е.} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0),$$

което означава, че  $f(x)$  е непрекъснатата в точката  $x_0$ .

**3.2.** Нека  $F$  е затворено множество и нека функцията  $f(x)$  удовлетворява следните условия:

- а) дефинирана е в  $F$  и приема стойности в  $F$ ;
- б) удовлетворява условието на Липшиц в множеството  $F$  с константа  $k \in (0, 1)$ .

Докажете, че уравнението  $f(x) = x$  има точно едно решение.

**Решение.** Да разгледаме редицата  $\{x_n\}$ , дефинирана по следния начин:  $x_1$  е произволно число от  $F$  и за всяко естествено число  $n$  е изпълнено  $x_{n+1} = f(x_n)$ .

От условие б) имаме

$$|x_{n+2} - x_{n+1}| = |f(x_{n+1}) - f(x_n)| \leq k|x_{n+1} - x_n|$$

за всяко  $n \in \mathbb{N}$ . Тогава от неравенствата

$$|x_3 - x_2| \leq k|x_2 - x_1|,$$

$$|x_4 - x_3| \leq k|x_3 - x_2|,$$

$$\dots$$

$$|x_{n+1} - x_n| \leq k|x_n - x_{n-1}|$$

чрез заместване получаваме, че за всяко  $n \in \mathbb{N}$  е изпълнено

$$|x_{n+1} - x_n| \leq k^{n-1}|x_2 - x_1|.$$

От неравенството на триъгълника следва

$$\begin{aligned} |x_n - x_{n+p}| &= |x_n - x_{n+1} + x_{n+1} - x_{n+2} + \dots + x_{n+p-1} - x_{n+p}| \\ &\leq |x_n - x_{n+1}| + |x_{n+1} - x_{n+2}| + \dots + |x_{n+p-1} - x_{n+p}| \\ &\leq (k^{n-1} + k^n + k^{n+1} + \dots + k^{n+p-2})|x_2 - x_1| \\ &= k^{n-1} \frac{1 - k^p}{1 - k} |x_2 - x_1| \leq \frac{k^{n-1}|x_2 - x_1|}{1 - k}. \end{aligned}$$

Нека  $\varepsilon$  е произволно положително число. От  $0 < k < 1$  следва  $\lim_{n \rightarrow \infty} k^{n-1} = 0$ . Тогава съществува число  $n_0$  такова, че за всяко  $n > n_0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , е в сила

$$k^{n-1} < \frac{\varepsilon(1-k)}{|x_2 - x_1|}. \quad (\text{Ако } x_2 = x_1, \text{ ясно е, че } x_n = x_1 \text{ за всяко } n \in \mathbb{N} \text{ и редицата } \{x_n\} \text{ е сходяща.})$$

Така получихме, че за всяко естествено число  $n > n_0$  и за произволно естествено число  $p$  е изпълнено

$$|x_n - x_{n+p}| < \frac{k^{n-1}|x_2 - x_1|}{1 - k} > \varepsilon.$$

Съгласно теоремата на Коши редицата  $\{x_n\}$  е сходяща. Нека  $x_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ . Тъй като множеството  $F$  е затворено, то  $x_0 \in F$ .

От условието на Липшиц

$$|f(x_n) - f(x_0)| < k|x_n - x_0|$$



получаваме, че  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$ , а оттук след граничен преход в равенството  $x_{n+1} = f(x_n)$  следва, че  $x_0 = f(x_0)$ . Така покажем, че числото  $x_0$  е исканото решение.

Съществуването на две различни решения  $x'$  и  $x''$  на уравнението  $x = f(x)$  противоречи на условието на Липшиц:

$$|x' - x''| = |f(x') - f(x'')| \leq k|x' - x''| < |x' - x''|.$$

**3.3.** Нека  $0 < a < 1$  и  $b$  е произволно реално число. Докажете, че уравнението на Кеплер  $x - a \sin x = b$  има едно единствено решение.

**Решение.** Да разгледаме функцията  $f(x) = a \sin x + b$ . Тя е дефинирана в затворено множество — множество на всички реални числа, и удовлетворява условието на Липшиц — ако  $x$  и  $y$  са произволни реални числа, то

$$\begin{aligned} |(a \sin x + b) - (a \sin y + b)| &= a |\sin x - \sin y| \\ &= 2a \left| \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2} \right| < a|x-y|. \end{aligned}$$

Тъй като  $0 < a < 1$ , можем да приложим зад. 3.2.

**3.4.** Нека множеството  $K$  е компактно и нека функцията  $f(x)$  удовлетворява условията:

а) дефинирана е в множеството  $K$  и функционалните ѝ стойности принадлежат на  $K$ ;

б) за всеки две числа  $x$  и  $y$  от  $K$  с изпълнено

$$|f(x) - f(y)| \leq |x - y|.$$

Докажете, че уравнението  $x = f(x)$  има точно едно решение.

**Решение.** Нека  $\{b_n\}$  е редица от числа  $0 < b_n < 1$  и нека  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1$ . Да разгледаме функциите  $g_n(x) = b_n f(x)$ . От условие б) следва

$$|g_n(x) - g_n(y)| = b_n |f(x) - f(y)| \leq b_n |x - y|,$$

т. е. функциите  $g_n(x)$  удовлетворяват условието на Липшиц с константи, по-малки от 1. Тъй като множеството  $K$  е компактно, то е затворено. С това показваме, че условията на зад. 3.2 са изпълнени, и следователно за всяко естествено число  $n$  съществува  $x_n \in K$  такава, че  $x_n = b_n f(x_n)$ .

Тъй като  $x_n \in K$ , а  $K$  е компактно множество, можем да изберем

сходяща подредица  $\{x_{n_k}\}$  на редицата  $\{x_n\}$ . Нека  $x_0 = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}$ . Множеството  $K$  е затворено. Следователно  $x_0 \in K$ .

Очевидно  $b_{n_k} \rightarrow 1$ . Функцията  $f(x)$  удовлетворява условието на Липшиц в множеството  $K$  и следователно (зад. 3.1) тя е непрекъсната в  $K$ . Като вземем предвид това, след граничен преход в равенството  $x_{n_k} = b_{n_k} f(x_{n_k})$  получаваме  $x_0 = f(x_0)$ .

Единствеността на решението следва от условието на Липшиц както в зад. 3.2.

В следващите задачи ще използваме следната

**Теорема 1** (за междинните стойности). Нека функцията  $f(x)$  е дефинирана и непрекъсната в интервала  $[a, b]$  и нека  $f(a) \cdot f(b) < 0$ . Тогава съществува точка  $\xi \in (a, b)$ , за която  $f(\xi) = 0$ .

**3.5.** Нека функцията  $f(x)$  е дефинирана и непрекъсната в затворения интервал  $[a, b]$  и приема стойности в същия интервал. Докажете, че уравнението  $x = f(x)$  има поне едно решение.

**Упътване.** Разгледайте функцията  $\varphi(x) = f(x) - x$ , покажете, че  $\varphi(a) \cdot \varphi(b) \leq 0$  и приложете теорема 1.

**3.6.** Нека функцията  $f(x)$  е дефинирана и непрекъсната в интервала  $[a, b]$ . Докажете, че необходимо и достатъчно условие  $f(x)$  да бъде обратима е тя да бъде строго монотонна.

**Решение.** Достатъчността на условието е очевидна.

**Необходимост.** Нека  $f(x)$  е обратима, т. е. нека от  $x_1 \neq x_2$  следва  $f(x_1) \neq f(x_2)$ . Ще разгледаме случая, когато  $f(a) < f(b)$  и ще докажем, че функцията  $f(x)$  е строго растяща. Да допуснем, че съществуват две числа  $x_1$  и  $x_2$  от  $[a, b]$  такива, че  $x_1 < x_2$  и  $f(x_1) \geq f(x_2)$ . От обратимостта на  $f(x)$  следва, че  $f(x_1) \neq f(x_2)$ , т. е.  $f(x_1) > f(x_2)$ . Ясно е, че поне една от точките  $x_1$  и  $x_2$  е вътрешна на интервала  $[a, b]$ .

Съществуват няколко възможности:  $x_1$  съвпада с  $a$ ,  $x_2$  съвпада с  $b$ ;  $x_1 \neq a$  и  $x_2 \neq b$ , като  $f(x_1) < f(a)$  или  $f(x_1) > f(a)$ . Ще разгледаме една от тях, а всички останали се разглеждат аналогично. Нека например


$$a < x_1 < x_2 < b \text{ и } f(x_1) > f(a) \text{ (фиг. 8)}.$$

Да изберем число  $B$  такава, че  $\max f(a), f(x_2) < B < f(x_1)$ . Такива числа има, тъй като  $f(a) < f(x_1)$  и  $f(x_2) < f(x_1)$ . Да разгледаме функцията  $\varphi(x) = f(x) - B$ . Тя е непрекъсната в интервала  $[a, b]$ .

От  $\varphi(x_1) \cdot \varphi(a) = (f(x_1) - B)(f(a) - B) < 0$  съгласно теорема 1 следва, че съществува точка  $\xi_1 \in (a, x_1)$  такава, че  $\varphi(\xi_1) = 0$ , т. е.

$$f(\xi_1) = B.$$

От  $\varphi(x_1) \cdot \varphi(x_2) = (f(x_1) - B)(f(x_2) - B) < 0$  съгласно теорема 1 съществува точка  $\xi_2 \in (x_1, x_2)$  такава, че  $\varphi(\xi_2) = 0$ , т. е.  $f(\xi_2) = B$ .



Фиг. 8

Ясно е, че  $\xi_1 \neq \xi_2$  и  $f(\xi_1) = f(\xi_2) = B$ , което противоречи на обратимостта на  $f(x)$ .

3.7. Нека функцията  $f(x)$  е дефинирана и непрекъсната в интервала  $[0, 1]$  и нека  $f(x) \in [0, 1]$  за всяко  $x \in [0, 1]$ . С  $f^{(k)}(x)$  да означим  $f(f(\dots f(x) \dots))$  ( $k$  пъти). Нека за всяко  $x_0 \in [0, 1]$  съществува естествено число  $k(x_0)$  такава, че  $f^{(k(x_0))}(x_0) = x_0$ . Докажете, че или  $f(x) = x$ , или  $f^{(k)}(x) = x$ .

Упътване. Нека  $x_1$  и  $x_2$  са две произволни числа от интервала  $[0, 1]$ , за които  $f(x_1) = f(x_2)$ . Ясно е, че  $f^{(k_1)}(x_1) = f^{(k_1)}(x_2)$  за всяко  $k \in \mathbb{N}$ . Да означим  $k_1 = k(x_1)$  и  $k_2 = k(x_2)$ . Тогава

$$f^{(k_1+k_2)}(x_1) = \underbrace{f \circ \dots \circ f}_{k_2 \text{ пъти}} \circ \underbrace{f \circ \dots \circ f}_{k_1 \text{ пъти}}(x_1) = f^{(k_2)}(x_2) = x_2,$$

$$f^{(k_1+k_2)}(x_2) = \underbrace{f \circ \dots \circ f}_{k_1 \text{ пъти}} \circ \underbrace{f \circ \dots \circ f}_{k_2 \text{ пъти}}(x_2) = f^{(k_1)}(x_1) = x_1.$$

Оттук получаваме

$$x_1 = f^{(k_1+k_2)}(x_1) = f^{(k_1+k_2)}(x_2) = x_2.$$

С това показваме, че от равенството  $f(x_1) = f(x_2)$  следва  $x_1 = x_2$ , т.е. функцията  $f(x)$  е обратима.

За да докажете твърдението на задачата, приложете зад. 3.6.  
3.8. Докажете, че уравнението  $x^n = a$ , където  $n$  е естествено, а  $a$  — положително число, има точно едно положително решение (вж. зад. 1.7).

Упътване. Приложете теоремата за междинните стойности за функцията  $\varphi(x) = x^n - a$ .

3.9. Докажете, че ако  $P(x)$  е полином от нечетна степен, то уравнението  $P(x) = 0$  има поне едно реално решение.

Упътване. Разгледайте например случая, когато коефициентът пред най-високата степен е положителен. Като използвате, че  $\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = -\infty$  и  $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty$ , постройте интервал, в

краищата на който  $P(x)$  приема стойности с различни знаци и приложете теоремата за междинните стойности.

3.10. Намерете всички функции  $f(x)$ , които удовлетворяват следните условия:

а)  $f(x)$  е дефинирана за всяко  $x$ ;

б)  $f(x)$  е непрекъсната в точката 0;

в)  $f(x+y) = f(x)+f(y)$  за всеки две числа  $x$  и  $y$ .

Решение. Нека функцията  $f(x)$  удовлетворява условията на задачата. От условие в), като положим  $x=y=0$ , получаваме  $2f(0) = f(0)$ , откъдето  $f(0) = 0$ . Сега, като положим  $y = -x$ , имаме  $f(x)+f(-x) = f(0) = 0$ , т.е.  $f(x)$  е нечетна функция.

От принципа на математическата индукция следва, че за всеки  $n$  реални числа е изпълнено

$$f(x_1+x_2+\dots+x_n) = f(x_1)+f(x_2)+\dots+f(x_n).$$

Оттук, като положим  $x_i = x$ ,  $i=1, 2, \dots, n$ , виждаме, че равенството  $f(nx) = nf(x)$  е изпълнено за всяко реално число  $x$  и за всяко естествено число  $n$ .

Да положим сега  $x = \frac{1}{n}$ . Получаваме  $nf(\frac{1}{n}) = f(1)$  или

$$f(\frac{1}{n}) = f(1) \cdot \frac{1}{n} = a \cdot \frac{1}{n}, \text{ където } a = f(\frac{1}{1}).$$

Да разгледаме произволно положително рационално число

$r = \frac{n}{m}$ . Имаме

$$f(\frac{n}{m}) = nf(\frac{1}{m}) = n \cdot \frac{1}{m} a = \frac{n}{m} a = r a.$$



От нечетността на  $f(x)$  следва, че полученото равенство е вярно за всяко рационално число.

Да отбележим, че в разсъжденията дотук не използвахме условие б) — непрекъснатостта на  $f(x)$  в точката 0.

Сега ще докажем, че функцията  $f(x)$  е непрекъснатата във всяка точка. Нека  $x_0$  е произволно число и нека  $x_n \rightarrow x_0$ . Тогава  $x_n - x_0 \rightarrow 0$  и от условие б) следва, че  $f(x_n - x_0) \rightarrow f(0) = 0$ . От равенството

$$f(x_n) = f(x_n - x_0 + x_0) = f(x_n - x_0) + f(x_0)$$

получаваме

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0),$$

което според дефиницията на Хайне означава, че  $f(x)$  е непрекъсната в точката  $x_0$ .

Нека  $x_0$  е произволно число и нека  $\{r_n\}$  е редица от рационални числа, клоняща към  $x_0$ . От една страна, имаме

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(r_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a r_n = a x_0,$$

а, от друга, поради непрекъснатостта на  $f(x)$  е изпълнено

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(r_n) = f(x_0). \text{ Следователно } f(x_0) = a x_0.$$

С това показваме, че ако  $f(x)$  удовлетворява условията на задачата, то  $f(x) = ax$ . С непосредствена проверка се вижда, че за всяко  $a$  функцията  $f(x) = ax$  е решение на задачата.

Забележка. Вместо условие в) може да се поиска функцията да бъде монотонна или ограничена в някой отворен краен интервал, съдържащ точката 0. Може да се докаже, че съществуват непрекъснати, немонотонни и неограничени около нулата функции  $f(x)$ , които удовлетворяват в).

3.11. Намерете всички функции  $f(x)$ , които удовлетворяват следните условия:

а)  $f(x)$  е дефинирана за всяко  $x$ ;

б)  $f(x)$  е непрекъснатата в точката 0;

в)  $f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{f(x)+f(y)}{2}$  за всеки две числа  $x$  и  $y$ .

Упътване. Нека функцията  $f(x)$  удовлетворява условието на

задачата. Положете  $f(0) = b$ ,  $f(1) = a$ .

а) Покажете, че  $2f\left(\frac{x}{2}\right) = f(x) + b$ ;

б) Положете  $g(x) = f(x) - b$  и покажете, че  $g(x+y) = g(x) + g(y)$  за всеки две реални числа  $x$  и  $y$ ;

в) Приложете зад. 3.10 и покажете, че  $f(x) = ax + b$ .

3.12. Намерете всички функции  $f(x)$ , които удовлетворяват следните условия:

а)  $f(x)$  е дефинирана за всяко  $x$ ;

б)  $f(x)$  е непрекъснатата в точката 0;

в)  $f(x+y) = f(x)f(y)$  за всеки две числа  $x$  и  $y$ .

Упътване. Разгледайте случая, когато  $f(x)$  не е тъждествено равна на нула. Покажете, че  $f(x) > 0$  за всяко  $x$ . Положете  $\varphi(x) = \ln f(x)$  и за функцията  $\varphi(x)$  приложете зад. 3.10 и покажете, че  $f(x) = a^x$  където  $a = f(1)$ .

3.13. Намерете всички функции  $f(x)$ , които удовлетворяват следните условия:

а)  $f(x)$  е дефинирана при  $x > 0$ ;

б)  $f(x)$  е непрекъснатата в точката 1;

в)  $f(xy) = f(x) + f(y)$  за всеки две положителни числа  $x$  и  $y$ .

Упътване. Разгледайте функцията  $\varphi(x) = f(e^x)$ , приложете зад. 3.10 и покажете, че ако  $f(x)$  не е константа, съществува положително число  $a \neq 1$  такова, че  $f(x) = \log_a x$ .

3.14. Намерете всички функции  $f(x)$ , които удовлетворяват следните условия:

а)  $f(x)$  е дефинирана за всяко  $x > 0$ ;

б)  $f(x)$  е непрекъснатата в точката 1;

в)  $f(xy) = f(x)f(y)$  за всеки две положителни числа  $x$  и  $y$ .

Упътване. Покажете, че или  $f(x)$  е тъждествено равна на нула, или  $f(x) > 0$  за всяко  $x > 0$ . Във втория случай положете  $\varphi(x) = \ln f(x)$  и за функцията  $\varphi(x)$  приложете зад. 3.13. Означете  $a = \ln f(e)$  и покажете, че  $f(x) = x^a$ .

3.15. Намерете всички функции  $f(x)$ , които удовлетворяват следните условия:

а)  $f(x)$  е дефинирана за всяко  $x$ ;

б) съществува положително число  $a$  такова, че  $f(a) = 0$ ;

в)  $f(x)$  е непрекъснатата навсякъде;

г)  $f(x) > 0$  за всяко  $0 \leq x < a$ ;

д)  $f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y)$  за всеки две реални числа  $x$  и  $y$ .

Упътване. Покажете, че

а)  $f(0) = 1$ ;

б)  $f(x) = f(-x)$  за всяко  $x$ ;

в)  $f\left(\frac{a}{2}\right) = \cos \frac{\pi}{4}$ ;



$$г) f\left(\frac{a}{2^n}\right) = \cos \frac{\pi}{2^{n+1}}$$

$$д) f\left(\frac{m\pi}{2^n}\right) = \cos \frac{m\pi}{2^{n+1}}$$

е) Ако  $x_0$  е произволно положително число, то съществува редица от числа  $\left\{\frac{m_k a}{2^{n_k}}\right\}$ , която клони към  $x_0$ ;

$$ж) f(x) = \cos\left(\frac{\pi x}{2a}\right).$$

3.16. Намерете всички функции  $f(x)$ , които удовлетворяват следните условия:

а)  $f(x)$  е дефинирана за всяко  $x$ ;

б)  $f(x)$  е непрекъсната в точката 0;

в)  $f(x) = \cos \frac{x}{2} f\left(\frac{x}{2}\right)$  за всяко  $x$ .

Упътване. Докажете, че за всяко  $x$  и за всяко  $n$  е в сила:

$$f(x) = \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \cos \frac{x}{2^3} \cdots \cos \frac{x}{2^n} f\left(\frac{x}{2^n}\right).$$

След това, като приложите зад. 2.19. ж, покажете, че при  $x \neq 0$  е в сила

$$f(x) = f(0) \frac{\sin x}{x}.$$

3.17. Намерете всички функции  $f(x)$ , които удовлетворяват следните условия:

а)  $f(x)$  е дефинирана за всяко  $x$ ;

б)  $f(x)$  е непрекъсната в точката 0;

в)  $f(x) = e^{\frac{x}{2}} f\left(\frac{x}{2}\right)$  за всяко  $x$ .

Дефиниция 5. Ще казваме, че функцията  $f(x)$ , дефинирана в  $D_f$ , е равномерно непрекъсната в множеството  $D \subset D_f$ , ако за всяко положително число  $\epsilon$  може да се намери положително число  $\delta$  такова, че за всеки две числа  $x$  и  $y$  от  $D$ , удовлетворяващи неравенството  $|x - y| < \delta$ , е изпълнено  $|f(x) - f(y)| < \epsilon$ .

Дефиниция 6. Функцията

$$\omega(\delta, f, D) = \sup_{\substack{|x-y| < \delta \\ x, y \in D}} |f(x) - f(y)|$$

се нарича модул на непрекъснатост на функцията  $f(x)$  в множеството  $D$ .

Теорема 2 (Кантор). Ако функцията  $f(x)$  е дефинирана и непрекъсната в компактното множество  $K$ , то тя е равномерно непрекъсната в  $K$ .

В частност всяка непрекъсната функция е равномерно непрекъсната във всеки краен и затворен интервал, съдържащ се в дефиниционната ѝ област.

Теорема 3. Необходимо и достатъчно условие за равномерна непрекъснатост на функцията  $f(x)$  в множеството  $D$  е

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \omega(\delta, f, D) = 0.$$

От тази теорема непосредствено следва, че ако съществуват положително число  $\epsilon_0$  и две редици  $\{x_n\}$  и  $\{y_n\}$  такива, че  $x_n \in D$ ,  $y_n \in D$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - y_n| = 0$  и  $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \epsilon_0$ , то функцията  $f(x)$  не е равномерно непрекъсната в  $D$ .

3.18. Докажете, че ако функцията  $f(x)$ , дефинирана в  $D_f$ , удовлетворява условието на Липшиц в множеството  $D \subset D_f$ , тя е равномерно непрекъсната в  $D$ .

Решение. Съгласно условието на задачата съществува константа  $K_D > 0$  такова, че за всеки две числа  $x$  и  $y$  от  $D$  е в сила неравенството

$$|f(x) - f(y)| \leq K_D |x - y|.$$

Нека  $\epsilon$  е произволно положително число. Да му съпоставим числото  $\delta = \frac{\epsilon}{K_D}$ . Тогава за всеки две числа  $x$  и  $y$

от  $D$ , удовлетворяващи  $|x - y| < \delta$ , е изпълнено

$$|f(x) - f(y)| \leq K_D |x - y| < K_D \delta = \epsilon.$$

3.19. Докажете, че ако функцията  $f(x)$  е непрекъсната в интервала  $[a, \infty)$  и съществува границата  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = B$ , то  $f(x)$

е равномерно непрекъсната в  $D = [a, \infty)$ .

Решение. Нека  $\epsilon$  е произволно положително число. От  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = B$  следва, че съществува число  $A > a$  такова, че

$$\text{за всяко } x \geq A \text{ е изпълнено } |f(x) - B| < \frac{\epsilon}{3}.$$

Да разгледаме крайния и затворен интервал  $[a, A]$ . Съгласно теоремата на Кантор  $f(x)$  е равномерно непрекъсната в него, т. е. съществува положително число  $\delta$  такова, че за всеки две числа  $x$  и  $y$ , удовлетворяващи неравенствата  $a \leq x \leq A$ ,  $a \leq y \leq A$  и

$$|x - y| < \delta, \text{ е изпълнено } |f(x) - f(y)| < \frac{\epsilon}{3}.$$

Сега ще покажем, че за всеки две числа  $x$  и  $y$  от интервала  $[a, \infty)$ , удовлетворяващи неравенството  $|x - y| < \delta$ , е изпълнено  $|f(x) - f(y)| < \epsilon$ .

Възможни са три случая:

а) Нека  $a \leq x \leq A, a \leq y \leq A$  и  $|x - y| < \delta$ . Тогава съгласно избора на числото  $\delta$

$$|f(x) - f(y)| < \frac{\epsilon}{3} < \epsilon.$$

б) Нека  $x \geq A$  и  $y \geq B$ . Тогава съгласно избора на числото  $A$  е изпълнено

$$|f(x) - f(y)| = |(f(x) - B) + (B - f(y))|$$

$$\leq |f(x) - B| + |B - f(y)| < \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} < \epsilon.$$

в) Нека  $a \leq x \leq A \leq y$  и  $|x - y| < \delta$ . Тогава  $|x - A| < \delta$  и съгласно избора на числата  $\delta$  и  $A$  имаме

$$|f(x) - f(y)| = |(f(x) - f(A)) + (f(A) - B) + (B - f(y))|$$

$$\leq |f(x) - f(A)| + |f(A) - B| + |B - f(y)| < \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \epsilon.$$

**3.20.** Докажете, че ако функцията  $f(x)$  е дефинирана и непрекъсната в отворения интервал  $(a, b)$  и съществуват границите  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$  и  $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = B$ , то функцията  $f(x)$  е равномерно непрекъсната в  $(a, b)$ .

Упътване. Разгледайте функцията

$$g(x) = \begin{cases} A & \text{при } x = a, \\ f(x) & \text{при } a < x < b, \\ B & \text{при } x = b. \end{cases}$$

Покажете, че тя е равномерно непрекъсната в  $[a, b]$  и след това използвайте очевидния факт, че ако една функция е равномерно

непрекъсната в дадено множество, то тя е равномерно непрекъсната и във всяко негово подмножество.

**3.21.** Докажете, че ако функцията  $f(x)$  е равномерно непрекъсната в крайния отворен интервал  $(a, b)$ , то съществуват границите:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \text{ и } \lim_{x \rightarrow b} f(x).$$

Решение. Нека  $\epsilon$  е произволно положително число. Тъй като  $f(x)$  е равномерно непрекъсната, то съществува число  $\delta$  такова, че за всеки две числа  $x$  и  $y$  от  $(a, b)$ , удовлетворяващи неравенството  $|x - y| < \delta$ , е изпълнено  $|f(x) - f(y)| < \epsilon$ .

Нека  $\{x_n\}$  е произволна редица от числа  $x_n \in (a, b)$ , клоняща към  $a$ . Съгласно теоремата на Коши съществува число  $n_0$  такова, че при  $n > n_0$  за всяко  $p$  е изпълнено  $|x_{n+p} - x_n| < \delta$ . Тогава според избора на числото  $\delta$  имаме  $|f(x_{n+p}) - f(x_n)| < \epsilon$  при  $n > n_0$  и произволно естествено число  $p$ , т. е. редицата  $\{f(x_n)\}$  удовлетворява условията на Коши и следователно е сходяща. С това показахме, че съществува границата  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ . Аналогично се доказва, че съществува и другата граница.

**3.22.** Докажете, че всяка функция, която е ограничена, монотонна и непрекъсната в даден краен или безкраен интервал, е равномерно непрекъсната.

Упътване. Приложете зад. 1.32 и 3.19 или 3.20.

**3.23.** Докажете, че следващите функции са равномерно непрекъснати в посочените множества:

а)  $f(x) = x^2$  в  $[a, b]$ ; б)  $f(x) = x^3$  в  $[a, b]$ ;

в)  $f(x) = \sqrt{x}$  в  $[1, \infty)$ ; г)  $f(x) = \sqrt{x}$  в  $[0, \infty)$ ;

д)  $f(x) = \sin x^2$  в  $[-3, 3]$ ; е)  $f(x) = \sin \sqrt{x}$  в  $[0, \infty)$ ;

ж)  $f(x) = \frac{1}{x}$  в  $[\frac{1}{2}, \infty)$ ; з)  $f(x) = \sqrt[3]{x}$  в  $[0, \infty)$ ;

и)  $f(x) = x \cos \frac{1}{x}$  в  $(0, \infty)$ ; к)  $f(x) = e^{-x^2}$  в  $(-\infty, \infty)$ ;



л)  $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$  в  $(0, \infty)$ .

Решение. а) Първи начин. Функцията  $f(x) = x^2 \epsilon$  непрекъсната в крайния и затворен интервал  $[a, b]$  и съгласно теоремата на Кантор е равномерно непрекъснатата.

Втори начин. Да означим  $c = \max(|a|, |b|)$ . Ясно е, че от  $x \in [a, b]$  следва  $|x| \leq c$ . Тогава

$$|x^2 - y^2| = |x - y| |x + y| \leq |x - y| (|x| + |y|) \leq 2c |x - y|$$

и следователно  $f(x) = x^2$  удовлетворява условието на Липшиц (константата  $k = 2c$  зависи само от интервала  $[a, b]$ ). Като приложим зад. 3.18, получаваме, че  $x^2$  е равномерно непрекъснатата в  $[a, b]$ .

в) Равномерната непрекъснатост на функцията  $\sqrt{x}$  в интервала  $[1, \infty)$  следва от неравенството

$$\left| \sqrt{x} - \sqrt{y} \right| = \frac{|x - y|}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \leq \frac{|x - y|}{2}$$

и зад. 3.18.

г) Нека  $a \geq 0$  и  $b \geq 0$ . От неравенството

$$|a - b| \leq |a| + |b| = a + b = |a + b|$$

след умножаване с  $|a - b|$  получаваме

$$|a - b|^2 \leq |a - b| |a + b| = |a^2 - b^2|$$

или

$$|a - b| \leq \sqrt{a^2 - b^2}.$$

Ако в това неравенство положим  $a = \sqrt{x}$  и  $b = \sqrt{y}$ , виждаме, че при  $x \geq 0$  и  $y \geq 0$  е в сила

$$\left| \sqrt{x} - \sqrt{y} \right| \leq \sqrt{|x - y|}.$$

Нека е произволно положително число. Да му съпоставим числото  $\delta = \epsilon^2$ . Тогава за всеки две числа  $x \geq 0$  и  $y \geq 0$ , които удовлетворяват неравенството  $|x - y| < \delta$ , е изпълнено

$$\left| \sqrt{x} - \sqrt{y} \right| \leq \sqrt{|x - y|} \leq \sqrt{\epsilon^2} = \epsilon.$$

ж) Първи начин. От

$$\left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right| = \left| \frac{y - x}{xy} \right| < 4 |y - x| \text{ при } x \geq \frac{1}{2}$$

съгласно зад. 3.18 следва равномерната непрекъснатост на функцията  $\frac{1}{x}$  в интервала  $\left[ \frac{1}{2}, \infty \right)$ .

Втори начин. Като вземем предвид, че  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ , съгласно зад. 3.19 получаваме, че  $\frac{1}{x}$  е равномерно непрекъснатата в интервала  $\left[ \frac{1}{2}, \infty \right)$ .

и) Ще използваме следната

Лема. Ако функцията  $f(x)$  е равномерно непрекъснатата в интервалите  $(a, b)$  и  $(b, c)$  и ако съществува  $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = B$ , то  $f(x)$  е равномерно непрекъснатата в  $(a, b) \cup (b, c)$ .

Доказателство. Нека е произволно положително число. Тогава:

а) от равномерната непрекъснатост на  $f(x)$  в интервала  $(a, b)$  (съответно в  $(b, c)$ ) следва, че съществува число  $\delta_1 > 0$  ( $\delta_2 > 0$ ) такава, че за всеки две числа  $x$  и  $y$ , удовлетворяващи неравенствата  $a < x < b$ ,  $a < y < b$  и  $|x - y| < \delta_1$  (съответно  $b < x < c$ ,  $b < y < c$  и  $|x - y| < \delta_2$ ), е изпълнено  $|f(x) - f(y)| < \epsilon$ ;

б) от  $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = B$  следва, че съществува число  $\delta$ , такава, че за всяко  $x \in (a, b) \cup (b, c)$ , удовлетворяващо неравенството  $|x - b| < \delta$ , е изпълнено  $|f(x) - B| < \frac{\epsilon}{2}$ .

Сега на числото  $\epsilon$  да съпоставим числото  $\delta = \min(\delta_1, \delta_2, \delta)$ . Да разгледаме две произволни числа  $x$  и  $y$  от  $(a, b) \cup (b, c)$  такива, че  $|x - y| < \delta$ . От избора на числото  $\delta$  е ясно, че ако и двете числа  $x$  и  $y$  лежат в едни и същ интервал  $(a, b)$  или  $(b, c)$ , то  $|f(x) - f(y)| < \epsilon$ .

Да разгледаме случая, когато  $x$  и  $y$  са в различни интервали. Нека например  $x \in (a, b)$ , а  $y \in (b, c)$ . От неравенствата  $x < b < y$  и  $|x - y| < \delta$  следва, че  $|x - b| < \delta$  и  $|b - y| < \delta$ . Тогава

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &= |(f(x) - B) + (B - f(y))| \leq |f(x) - B| + |B - f(y)| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon. \end{aligned}$$

Забележка. Условието за съществуване на  $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = B$  е съществено. В



зад. 3.24. г) е посочен пример на функция, която е равномерно непрекъснатата във всеки един от два отворени интервала с общ край, а не е равномерно непрекъснатата в тяхното обединение. Очевидно това условие е изпълнено, ако функцията  $f(x)$  е непрекъснатата в  $(a, c)$ .

За да докажем, че функцията  $x \cos \frac{1}{x^2}$  е равномерно непрекъсната в интервала  $(0, \infty)$ , ще покажем, че тя е равномерно непрекъсната в интервалите  $(0, 1]$  и  $[1, \infty)$  и тъй като  $x \cos \frac{1}{x^2}$  е непрекъснатата, твърдението ще следва от лемата.

Равномерната непрекъснатост на  $x \cos \frac{1}{x^2}$  в интервала  $(0, 1]$

следва от равенството  $\lim_{x \rightarrow 0} x \cos \frac{1}{x^2} = 0$  и зад. 3.20.

Като използваме неравенството

$$|\cos \alpha - \cos \beta| = \left| 2 \sin \frac{\beta - \alpha}{2} \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \right| \leq |\alpha - \beta|,$$

получаваме при  $x \geq 1$  и  $y \geq 1$

$$\left| x \cos \frac{1}{x^2} - y \cos \frac{1}{y^2} \right|$$

$$= \left| x \cos \frac{1}{x^2} - x \cos \frac{1}{y^2} + x \cos \frac{1}{y^2} - y \cos \frac{1}{y^2} \right|$$

$$\leq x \left| \cos \frac{1}{x^2} - \cos \frac{1}{y^2} \right| + |x - y| \left| \cos \frac{1}{y^2} \right|$$

$$\leq x \left| \frac{1}{x^2} - \frac{1}{y^2} \right| + |x - y| \leq \frac{|x - y|}{x^2 y^2} |x - y| + |x - y|$$

$$\leq \left( \frac{1}{y^2} + \frac{1}{xy} + 1 \right) |x - y| \leq 3 |x - y|.$$

От зад. 3.18 следва, че  $f(x) = x \cos \frac{1}{x^2}$  е равномерно непрекъсната в интервала  $[1, \infty)$ .

3.24. Докажете, че следните функции не са равномерно непрекъснати в посочените множества:

а)  $f(x) = x^2$  в  $[0, \infty)$ ; б)  $f(x) = \sin \frac{1}{x}$  в  $(0, \infty)$ ;

в)  $f(x) = \ln x$  в  $(0, 1]$ ; г)  $f(x) = \frac{|\sin x|}{x}$  в  $(-1, 0) \cup (0, 1)$ .

Решение. а) Да разгледаме редиците  $x_n = \sqrt{n+1}$  и  $y_n = \sqrt{n}$ .

Имаме

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = 0$$

и  $|f(x_n) - f(y_n)| = 1$ , което според следствието на теорема 3 означава, че  $f(x) = x^2$  не е равномерно непрекъснатата в интервала  $[0, \infty)$ .

б) да разгледаме редиците  $x_n = \frac{2}{\pi(4n+1)}$  и  $y_n = \frac{2}{\pi(4n+3)}$ . Ясно е, че

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{2}{\pi(4n+1)} - \frac{2}{\pi(4n+3)} \right) = 0 \text{ и } |f(x_n) - f(y_n)| = 2.$$

в) Да разгледаме редиците  $x_n = e^{-n}$  и  $y_n = e^{-(n+1)}$ . Имаме

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (e^{-n} - e^{-(n+1)}) = 0 \text{ и } |f(x_n) - f(y_n)| = |\ln e^{-n} - \ln e^{-(n+1)}| = 1.$$

г) Нека  $x_n > 0$  и  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ . Тогава, ако  $y_n = -x_n$ , то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - y_n| = 0 \text{ и } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\sin x_n}{x_n} - \frac{\sin y_n}{y_n} \right|$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \frac{\sin x_n}{x_n} = 2,$$

от което следва, че функцията  $f(x) = \frac{|\sin x|}{x}$  не е равномерно непрекъснатата в  $(-1, 0) \cup (0, 1)$ . Да обърнем внимание на това, че от

$$\text{съществуването на } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{|\sin x|}{x} = -1 \text{ и } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{|\sin x|}{x} = 1 \text{ след-}$$

на равномерната непрекъснатост на функцията  $f(x) = \frac{|\sin x|}{x}$  във всеки един от интервалите  $(-1, 0)$  и  $(0, 1)$ .

**3.25.** Изследвайте относно равномерна непрекъснатост в посочените множества следните функции:

а)  $f(x) = \sin \frac{\pi}{x}$  в  $(0, 1)$ ; б)  $f(x) = \frac{\sin x}{x}$  в  $(-1, 0) \cup (0, 1)$ ;

в)  $f(x) = \operatorname{arctg} x$  в  $(-\infty, \infty)$ ; г)  $f(x) = e^x \cos \frac{1}{x}$  в  $(0, 1)$ ;

д)  $f(x) = x + \sin x$  в  $(0, \infty)$ ; е)  $f(x) = \sin x^2$  в  $(0, \infty)$ .

**3. 26.** Пресметнете модула на непрекъснатост в посочените интервали на следните функции:

а)  $f(x) = x^2$  в  $[0, 1]$ ; б)  $f(x) = x^2$  в  $[0, \infty)$ ;

в)  $f(x) = \frac{1}{x}$  в  $[\frac{1}{2}, \infty)$ ; г)  $f(x) = \frac{1}{x}$  в  $(0, \infty)$ ;

д)  $f(x) = \sqrt{x}$  в  $[0, \infty)$ ; е)  $f(x) = \ln x$  в  $[1, \infty)$ ;

ж)  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$  в  $(0, \infty)$ ; з)  $f(x) = \sin \frac{1}{x}$  в  $(0, \infty)$ .

Решение. а) Да означим  $D = [0, 1]$ .

Нека  $0 \leq x < y \leq 1$ , където  $0 < h \leq \delta \leq 1$ . Тогава

$$|f(y) - f(x)| = |(x+h)^2 - x^2| = 2hx + h^2 \leq 2(1-h)h + h^2 \leq 2h - h^2 \leq 2\delta - \delta^2.$$

Последното неравенство следва от това, че квадратният тричлен  $2h - h^2$  при  $0 < h \leq 1$  е монотонно растяща функция. Така получихме, че  $2\delta - \delta^2$  е една горна граница на множеството от стойностите на  $|f(y) - f(x)|$  при  $|x - y| \leq \delta \leq 1$  и следователно

$$\sup_{\substack{|x-y| \leq \delta \\ x \in D, y \in D}} |f(x) - f(y)| \leq 2\delta - \delta^2,$$

тъй като  $\sup |f(x) - f(y)|$  е най-малката горна граница.

От друга страна, ако  $x = 1 - \delta$  и  $y = 1$ , имаме

$$|f(y) - f(x)| = |1 - (1 - \delta)^2| = 2\delta - \delta^2 \leq \sup_{\substack{|x-y| \leq \delta \\ x \in D, y \in D}} |f(x) - f(y)|,$$

откъдето получаваме

$$\omega(\delta, x^2, D) = \sup_{\substack{|x-y| \leq \delta \\ x \in D, y \in D}} |f(x) - f(y)| = 2\delta - \delta^2 \quad \text{при } \delta \leq 1.$$

Очевидно  $\omega(\delta, x^2, D) = 1$  при  $\delta > 1$ .

б) Нека  $D = [0, \infty)$ . Да разгледаме редиците  $x_n = n$  и  $y_n = n + \delta$ .  
Имаме

$$|f(y_n) - f(x_n)| = 2n\delta + \delta^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty,$$

откъдето

$$\omega(\delta, x^2, D) = \infty.$$

д) Да означим  $D = [0, \infty)$ . Нека  $x$  и  $y$  са произволни числа от  $D$  такива, че  $|x - y| \leq \delta$ . От неравенството (вж. зад. 3.23, г)

$$|\sqrt{y} - \sqrt{x}| \leq \sqrt{|x - y|} \leq \sqrt{\delta}$$

получаваме, че  $\sqrt{\delta}$  е една горна граница на множеството от стойностите на  $|\sqrt{y} - \sqrt{x}|$  при  $|x - y| \leq \delta$ ,  $x \in D, y \in D$ . Следователно

$$\sup_{\substack{|x-y| \leq \delta \\ x \in D, y \in D}} |\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{\delta}.$$

От друга страна, нека  $y = \delta$  и  $x = 0$ . Тогава

$$\sup_{\substack{|x-y| \leq \delta \\ x \in D, y \in D}} |\sqrt{x} - \sqrt{y}| \geq |\sqrt{\delta} - \sqrt{0}| = \sqrt{\delta}.$$

С това показваме, че  $\omega(\delta, \sqrt{x}, D) = \sqrt{\delta}$ .

з) Да означим  $D = (0, \infty)$ .

От неравенството

$$\left| \sin \frac{1}{x} - \sin \frac{1}{y} \right| \leq \left| \sin \frac{1}{x} \right| + \left| \sin \frac{1}{y} \right| \leq 2,$$

което е изпълнено за произволни две числа от  $D$ , следва

$$\sup_{\substack{|x-y| \leq \delta \\ x \in D, y \in D}} \left| \sin \frac{1}{x} - \sin \frac{1}{y} \right| \leq 2.$$

От друга страна, нека  $n$  е толкова голямо, че да е изпълнено неравенството

$$\left| \frac{2}{\pi(4n+1)} - \frac{2}{\pi(4n+3)} \right| < \delta.$$

Тогава

$$\begin{aligned} \sup_{\substack{|x-y| \leq \delta \\ x \in D, y \in D}} \left| \sin \frac{1}{x} - \sin \frac{1}{y} \right| \\ \geq \left| \sin \frac{\pi(4n+1)}{2} - \sin \frac{\pi(4n+3)}{2} \right| = 2. \end{aligned}$$

С това показваме, че

$$\omega(\delta, \sin \frac{1}{x}, D) = 2.$$

3.27. Като използваме пресметнатите в предишната задача модули на непрекъснатост, изследвайте относително равномерна

непрекъснатост съответните функции с помощта на теорема 3.

Например от  $\omega(\delta, x^2, D) = 2\delta - \delta^2$ , където  $D = [0, 1]$  и

$\lim_{\delta \rightarrow 0} (2\delta - \delta^2) = 0$ , следва равномерната непрекъснатост на  $x^2$

в  $[0, 1]$ , а от  $\omega(\delta, \sin \frac{1}{x}, D) = 2$ , където  $D = (0, \infty)$  и  $\lim_{\delta \rightarrow 0} 2 = 2$ ,

следва, че  $\sin \frac{1}{x}$  не е равномерно непрекъснатата в  $(0, \infty)$ .