

## Размерност. Лема на Noether за нормализация.

### 1. Базис и степен на трансцендентност на крайно породено разширение

Нека  $F = k(a_1, \dots, a_n) \supset k$  е крайно породено разширение на  $k$  и  $a_1, \dots, a_d$  е максимално трансцендентно над  $k$  подмножество на  $a_1, \dots, a_n$ . Тогава за  $\forall d + 1 \leq i \leq n$  елементът  $a_i$  е алгебричен над  $k(a_1, \dots, a_d)$  и съществува  $g_i(a_1, \dots, a_d, x) \in k(a_1, \dots, a_d)[x]$  с корен  $x = a_i$ . След умножение на  $g_i$  с най-малкия общ знаменател на коефициентите на този полином на  $x$  получаваме полином  $f_i(a_1, \dots, a_d, x) \in k[a_1, \dots, a_d, x]$  с корен  $x = a_i$ .

Твърдим, че  $a_1, \dots, a_d \in F = k(a_1, \dots, a_n)$  е максимално трансцендентно над  $k$  подмножество на  $a_1, \dots, a_n$  тогава и само тогава, когато  $a_1, \dots, a_d$  са трансцендентни над  $k$  и  $F \supset k(a_1, \dots, a_d)$  е крайно разширение. Наистина, ако  $a_1, \dots, a_d \in F = k(a_1, \dots, a_n)$  са трансцендентни над  $k$  и  $F \supset k(a_1, \dots, a_d)$  е крайно разширение, то за всяко  $d + 1 \leq i \leq n$  елементът  $a_i \in F$  е алгебричен над  $k(a_1, \dots, a_d)$  и  $a_1, \dots, a_d$  е максимално трансцендентно над  $k$  подмножество на  $a_1, \dots, a_n$ . Нека  $a_1, \dots, a_d$  е максимално трансцендентно над  $k$  подмножество на  $a_1, \dots, a_n$ . Ако  $d = n$ , то  $F = k(a_1, \dots, a_n)$  е от крайна степен 1 над себе си. Оттук нататък ще предполагаме, че  $d < n$  и ще работим с индукция по  $n$ . За  $1 = n > d$  имаме  $d = 0$  и  $F = k(a_1) \supset k$  е разширение на  $k$  с алгебричен над  $k$  елемент  $a_1$ . Следователно  $[k(a_1) : k] = \deg_k a_1 < \infty$ . В общия случай, преномерираме  $a_1, \dots, a_n$  по такъв начин, че  $a_1, \dots, a_{n-1}$  да съдържа максимално трансцендентно над  $k$  подмножество  $a_1, \dots, a_d$  на  $a_1, \dots, a_n$ . Тогава  $a_n$  е алгебричен над  $k(a_1, \dots, a_d)$ , а оттам и над  $k(a_1, \dots, a_{n-1})$ . Следователно  $F = k(a_1, \dots, a_{n-1}, a_n) = k(a_1, \dots, a_{n-1})(a_n) \supseteq k(a_1, \dots, a_{n-1})$  е крайно разширение. По индукционно предположение,  $k(a_1, \dots, a_{n-1}) \supseteq k(a_1, \dots, a_d)$  е крайно разширение. Оттук,  $F = k(a_1, \dots, a_n) \supseteq k(a_1, \dots, a_d)$  е алгебрично разширение от степен

$$[F : k(a_1, \dots, a_d)] = [F : k(a_1, \dots, a_{n-1})][k(a_1, \dots, a_{n-1}) : k(a_1, \dots, a_d)] < \infty.$$

**ЛЕМА-ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10.1.** *Нека  $F = k(a_1, \dots, a_n) \supset k$  е крайно породено разширение на поле  $k$  и  $a_1, \dots, a_d$  е максимално трансцендентно над  $k$  подмножество на  $a_1, \dots, a_n$ . Тогава всяко трансцендентно над  $k$  подмножество  $\{b_1, \dots, b_r\} \subseteq F$  има  $r \leq d$  елемента и всяко максимално трансцендентно над  $k$  подмножество  $\{c_1, \dots, c_s\} \subseteq F$  има  $s = d$  елемента.*

*Произволно максимално трансцендентно над  $k$  подмножество  $\{c_1, \dots, c_s\} \subseteq F$  се нарича базис на трансцендентност на  $F$  над  $k$ .*

*Броят на елементите в един, а оттам и всеки един базис на трансцендентност на  $F$  над  $k$  е степента на трансцендентност на  $F$  над  $k$  и се бележи с  $\text{trdeg}_k F$ .*

**Доказателство:** С индукция по  $1 \leq i \leq \min(r, d)$  ще докажем, че елементите  $b_1, \dots, b_i, a_{i+1}, \dots, a_d$  са трансцендентни над  $k$  и  $F \supset k(b_1, \dots, b_i, a_{i+1}, \dots, a_d)$  е крайно разширение. Тогава допускането  $r > d$  води до  $[F : k(b_1, \dots, b_d)] < \infty$  и изисква алгебричността на  $b_{d+1}, \dots, b_r$  над  $k(b_1, \dots, b_d)$ . Това противоречи на

трансцендентността на  $b_1, \dots, b_r$  над  $k$ . В частност, всяко максимално трансцендентно над  $k$  подмножество  $\{c_1, \dots, c_s\} \subset F$  има  $s \leq d$  елемента. Ако  $s < d$ , то трансцендентността на  $c_1, \dots, c_s, a_{s+1}, \dots, a_d$  води до противоречие с максималността на трансцендентното над  $k$  подмножество  $\{c_1, \dots, c_s\} \subseteq F$ .

За  $i = 1$  твърдим, че  $b_1, a_2, \dots, a_d$  са трансцендентни над  $k$  и  $F \supseteq k(b_1, a_2, \dots, a_d)$  е крайно разширение. За целта използваме, че  $a_1, \dots, a_d$  е максимално трансцендентно над  $k$  подмножество на  $a_1, \dots, a_n$ , така че  $F \supseteq k(a_1, \dots, a_d)$  е крайно разширение. Следователно  $b_1 \in F$  е алгебричен над  $k(a_1, \dots, a_d)$  и съществува полином  $f_1 \in k[a_1, \dots, a_d, x]$  с корен  $x = b_1$ . Полиномът  $f_1$  зависи от поне едно  $a_i$  поради трансцендентността на  $b_1$  над  $k$ . След евентуална преномерация на  $a_1, \dots, a_d$  можем да считаме, че  $f_1$  зависи от  $a_1$ . Тогава  $f_1$  е алгебрична зависимост на  $a_1$  над  $k(b_1, a_2, \dots, a_d)$  и  $k(b_1, a_1, a_2, \dots, a_d) \supseteq k(b_1, a_2, \dots, a_d)$  е крайно разширение. Полето  $F$  е крайно разширение на  $k(a_1, \dots, a_d)$ , а оттам и на  $k(b_1, a_1, \dots, a_d)$ , така че

$$\begin{aligned} [F : k(b_1, a_2, \dots, a_d)] &= \\ &= [F : k(b_1, a_1, \dots, a_d)][k(b_1, a_1, \dots, a_d) : k(b_1, a_2, \dots, a_d)] < \infty. \end{aligned}$$

Ако допуснем, че  $b_1, a_2, \dots, a_d$  са алгебрично зависими и съществува полином  $h_1 \in k[y_1, \dots, y_d]$  с  $h_1(b_1, a_2, \dots, a_d) = 0$ , то  $h_1$  зависи от  $b_1$  поради трансцендентността на  $a_2, \dots, a_d$  над  $k$ . Следователно  $k(b_1, a_2, \dots, a_d) \supseteq k(a_2, \dots, a_d)$  е крайно разширение и

$$[F : k(a_2, \dots, a_d)] = [F : k(b_1, a_2, \dots, a_d)][k(b_1, a_2, \dots, a_d) : k(a_2, \dots, a_d)].$$

Това противоречи на трансцендентността на  $a_1, a_2, \dots, a_d$  над  $k$  и доказва трансцендентността на  $b_1, a_2, \dots, a_d$  над  $k$ .

Да допуснем, че сме доказали трансцендентността на  $b_1, \dots, b_{i-1}, a_i, \dots, a_d$  над  $k$  и крайността на разширението  $F \supseteq k(b_1, \dots, b_{i-1}, a_i, \dots, a_d)$ . Тогава елементът  $b_i \in F$  е алгебричен над  $k(b_1, \dots, b_{i-1}, a_i, \dots, a_d)$  и съществува полином  $f_i \in k[b_1, \dots, b_{i-1}, a_i, \dots, a_d, x]$  с корен  $x = b_i$ . Този полином зависи от поне едно  $a_j$  с  $i \leq j \leq d$ , съгласно трансцендентността на  $b_1, \dots, b_{i-1}$  над  $k$ . След евентуална пермутация на  $a_i, \dots, a_d$  можем да считаме, че  $f_i$  зависи от  $a_i$ . Това позволява да разглеждаме  $f_i$  като алгебрична зависимост на  $a_i$  над  $k(b_1, \dots, b_i, a_{i+1}, \dots, a_d)$  и да получим, че  $k(b_1, \dots, b_i, a_i, a_{i+1}, \dots, a_d) \supseteq k(b_1, \dots, b_i, a_{i+1}, \dots, a_d)$  е крайно разширение. В резултат, степента

$$\begin{aligned} [F : k(b_1, \dots, b_i, a_{i+1}, \dots, a_d)] &= \\ &= [F : k(b_1, \dots, b_i, a_i, \dots, a_d)][k(b_1, \dots, b_i, a_i, \dots, a_d) : k(b_1, \dots, b_i, a_{i+1}, \dots, a_d)] \end{aligned}$$

е крайна, защото  $k(b_1, \dots, b_{i-1}, a_i, \dots, a_d) \subseteq k(b_1, \dots, b_i, a_i, a_{i+1}, \dots, a_d)$  и

$$[F : k(b_1, \dots, b_i, a_i, a_{i+1}, \dots, a_d)] \leq [F : k(b_1, \dots, b_{i-1}, a_i, \dots, a_d)] < \infty.$$

Ако допуснем, че  $b_1, \dots, b_i, a_{i+1}, \dots, a_d$  са алгебрично зависими над  $k$  и анулират полином  $h_i \in k[b_1, \dots, b_i, a_{i+1}, \dots, a_d]$ , то  $h_i$  зависи от  $b_i$  поради трансцендентността на  $\{b_1, \dots, b_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_d\} \subseteq \{b_1, \dots, b_{i-1}, a_i, a_{i+1}, \dots, a_d\}$  над  $k$ . Следователно  $k(b_1, \dots, b_i, a_{i+1}, \dots, a_d) \supseteq k(b_1, \dots, b_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_d)$  е крайно разширение и степента

$$\begin{aligned} [F : k(b_1, \dots, b_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_d)] &= \\ &= [F : k(b_1, \dots, b_i, a_{i+1}, \dots, a_d)][k(b_1, \dots, b_i, a_{i+1}, \dots, a_d) : k(b_1, \dots, b_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_d)] \end{aligned}$$

е крайна. В резултат, елементът  $a_i \in F$  е алгебричен над  $k(b_1, \dots, b_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_d)$ , противно на индукционното предположение за трансцендентност на елементите  $b_1, \dots, b_{i-1}, a_i, a_{i+1}, \dots, a_d$  над  $k$ . Това доказва трансцендентността на елементите  $b_1, \dots, b_i, a_{i+1}, \dots, a_d$  над  $k$  и твърдението, Q.E.D.

## 2. Размерност на афинно многообразие

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10.2.** *Размерността на квази-афинно или квази-проективно многообразие  $X$  е степента на трансцендентност*

$$\dim X = \text{tr deg}_{\bar{k}} \bar{k}(X)$$

на полето на рационалните функции  $\bar{k}(X)$  на  $X$ .

След евентуално преминаване към афинно Зариски отворено подмножество виждаме, че функционалното поле  $\bar{k}(X)$  е крайно породено разширение на  $\bar{k}$ , така че размерността на многообразие е естествено число.

Интуитивно, размерността на афинно многообразие е броят на алгебрично независимите променливи, параметризиращи това многообразие. Едномерните многообразия се наричат криви, а двумерните - повърхнини.

**ТВЪРДЕНИЕ 10.3.** *Нека  $X$  е афинно или проективно многообразие,  $\emptyset \neq Y \subseteq X$  е непразно подмножество, т.е.  $Y$  е неприводимо Зариски затворено подмножество на  $X$ . В такъв случай,  $\dim(Y) \leq \dim(X)$  с равенство  $\dim(Y) = \dim(X)$  тогава и само тогава, когато  $Y = X$ .*

**Доказателство:** В следващите разглеждания считаме, че  $X$  и  $Y$  са определени над  $k$ . Достатъчно е да докажем твърдението за афинно многообразие  $X$ . Тогава за произволно проективно многообразие  $X \subseteq \mathbb{P}^n(k)$  и произволно стандартно афинно Зариски отворено подмножество  $U_i \subseteq \mathbb{P}^n(k)$  с  $Y \cap U_i \neq \emptyset$  имаме  $X \cap U_i \neq \emptyset$ , откъдето  $k(Y) = k(Y \cap U_i)$ ,  $k(X) = k(X \cap U_i)$ . В резултат,  $\dim(X) = \text{tr deg}_k k(X) = \text{tr deg}_k k(X \cap U_i) = \dim(X \cap U_i)$ ,  $\dim(Y) = \dim(Y \cap U_i)$ , откъдето

$$\dim(Y) = \dim(Y \cap U_i) \leq \dim(X \cap U_i) = \dim(X).$$

В случая на равенство  $\dim Y = \dim X$  получаваме  $Y \cap U_i = X \cap U_i$ . Оттук следва съвпадението  $Y = Y \cap U_i = X \cap U_i = X$  на съответните Зариски затворени обвивки.

Отсега нататък предполагаме, че  $\emptyset \neq Y \subseteq X \subseteq k^n$  са афинни многообразия. Тъждественото вложение  $\text{Id} : Y \hookrightarrow X$  индуцира обратното включване  $I(X) \subseteq I(Y)$  на идеалите на тези афинни многообразия в  $k[x_1, \dots, x_n]$ . В резултат получаваме епиморфизъм  $\text{Id}^* : k[X] \rightarrow k[Y]$  на афинните координатни пръстени с ядро  $I(Y)/I(X)$ . Класовете на афинните координати пораждат афинния координатен пръстен като  $k$ -алгебра и

$\text{Id}^* : k[X] = k[x_1 + I(X), \dots, x_n + I(X)] \longrightarrow k[x_1 + I(Y), \dots, x_n + I(Y)] = k[Y]$   
е естественят епиморфизъм с  $\text{Id}^*(x_i + I(X)) = x_i + I(Y)$  за  $\forall 1 \leq i \leq n$  и  $\text{Id}^*|_k = \text{Id}_k$ . След евентуална пермутация на  $x_1, \dots, x_n$  можем да считаме, че  $x_1 + I(X), \dots, x_d + I(X)$  са трансцендентни над  $k$  и  $x_i + I(X)$  е алгебрично над  $k(x_1 + I(X), \dots, x_d + I(X))$  за  $\forall d+1 \leq i \leq n$ . Пропускайки произволна полиномиална зависимост на  $x_1 + I(X), \dots, x_d + I(X), x_i + I(X)$  над  $k$  по модул идеала  $I(Y) \supseteq I(X)$  получаваме полиномиална зависимост на  $x_1 + I(Y), \dots, x_d + I(Y), x_i + I(Y)$  над  $k$ . Оттук следва, че  $x_i + I(Y)$  са алгебрични над  $k(x_1 + I(Y), \dots, x_n + I(Y))$  за  $\forall d+1 \leq i \leq n$ . Следователно произволен базис на трансцендентност на  $k(x_1 + I(Y), \dots, x_d + I(Y))$  над  $k$  е базис на трансцендентност на  $k(Y)$  над  $k$ . По този начин,  $\dim(Y) = \text{tr deg}_k k(Y) \leq d = \dim(X)$ . Ако  $\dim(Y) = \dim(X) = d$ , то  $x_1 + I(Y), \dots, x_d + I(Y)$  са трансцендентни над  $k$ . В такъв случай е достатъчно да докажем, че

$$\text{Id}^* : k[X] \rightarrow k[Y]$$

е изоморфизъм на  $k$ -алгебри, за да стигнем до извода, че  $\text{Id} : Y \rightarrow X$  е изоморфизъм и  $Y = X$ . Вече видяхме, че  $\text{Im}(\text{Id}^*) = k[Y]$ . Ако  $\xi \in \text{Ker}(\text{Id}^*)$ , то

използваме алгебричността на  $\xi$  над  $k(x_1 + I(X), \dots, x_d + I(X))$  за да получим полиномиалната зависимост

$$a_m \xi^m + a_{m-1} \xi^{m-1} + \dots + a_1 \xi + a_0 = 0 \quad (10.1)$$

на  $\xi$  с коефициенти  $a_i \in k(x_1 + I(X), \dots, x_d + I(X))$  за  $\forall 0 \leq i \leq m$ . Ако допуснем, че  $\xi \neq 0$ , то след евентуално деление на (10.1) с подходяща степен на  $\xi$  можем да предположим, че  $a_0(x_1 + I(X), \dots, x_d + I(X)) \neq 0$ . Прилагайки  $\text{Id}^*$  към (10.1) получаваме  $a_0(x_1 + I(Y), \dots, x_d + I(Y)) = 0$ . Това противоречи на трансцендентността на  $x_1 + I(Y), \dots, x_d + I(Y)$  над  $k$  и доказва, че  $\text{Ker}(\text{Id}^*) = \{0\}$ . Следователно  $\text{Id}^* : k[X] \rightarrow k[Y]$  е изоморфизъм на  $k$ -алгебри и  $Y = X$ , Q.E.D.

**ЗАДАЧА 10.4.** Нека  $k$  е алгебрично затворено поле,  $f \in k[x_1, \dots, x_n] \setminus k$  е неразложим полином. Да се докаже, че афинната хиперравнина  $X = V(f) \subseteq k^n$  има размерност  $\dim(X) = n - 1$ .

**Упътване:** Ако  $f(x_1, \dots, x_n)$  зависи от  $x_n$ , то можем да разглеждаме  $f$  като алгебрична зависимост на  $\bar{x}_n \in k[X]$  над разширението  $k(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_{n-1}) = k(x_1 + I(X), \dots, x_{n-1} + I(X))$ . Следователно произволен базис на трансцендентност на  $k(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_{n-1})$  над  $k$  е базис на трансцендентност на  $K(X) = F(k[X])$  над  $k$ . Ако допуснем, че съществува нетривиална полиномиална зависимост  $g(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_{n-1}) = 0$ , то

$$g(x_1, \dots, x_{n-1}) \in I(X) = IV(f) = r(\langle f \rangle) = \langle f \rangle.$$

Използвайте, че всеки нетъждествено нулев полином  $fh \in \langle f \rangle$  зависи от  $x_n$ .

**ЗАДАЧА 10.5.** Да се докаже, че ако афинният координатен пръстен  $k[X]$  на афинно алгебрично множество  $\emptyset \neq X \subseteq k^n$  е крайномерно линейно пространство над  $k$ , то  $X$  е крайно множество.

**Упътване:** Използвайте, че  $x_1 + I(X), \dots, x_n + I(X)$  са цели над  $k$ .

**ЗАДАЧА 10.6.** Да се докаже, че ако съществува доминантно рационално изображение  $\varphi : X \dashrightarrow Y$  на квази-афинните или квази-проективните многообразия  $X, Y$ , то  $\dim(X) \geq \dim(Y)$ . Ако  $\mathcal{D}$  е областта на регулярност на доминантното рационално изображение  $\varphi : X \dashrightarrow Y$ , то слойта на  $\varphi$  над обща точка на  $\varphi(\mathcal{D})$  е краен тогава и само тогава, когато  $\dim(X) = \dim(Y)$ .

### 3. Бирационалност на многообразие с афинно пространство или афинна хиперповърхнина

Следващата теорема представя произволно крайно породено разширение  $F$  на чисто трансцендентно разширение  $k(x_1, \dots, x_d)$  на алгебрично затворено поле  $k$  като просто разширение  $F = k(x_1, \dots, x_d, \theta)$  чрез сепарабелен над  $k(x_1, \dots, x_d)$  елемент  $\theta$ .

**ТЕОРЕМА 10.** Нека  $k$  е алгебрично затворено поле,  $F = k(a_1, \dots, a_n)$  е крайно породено разширение на  $k$  с  $\text{trdeg}_k k(a_1, \dots, a_n) < n$  над  $k$ . Тогава съществува базис на трансцендентност  $b_1, \dots, b_d$  на  $F$  над  $k$  и сепарабелен над  $k(b_1, \dots, b_d)$  елемент  $\theta \in F$ , така че  $F = k(b_1, \dots, b_d, \theta)$  и минималният полином  $g \in k(b_1, \dots, b_d)[x]$  на  $\theta$  над  $k(b_1, \dots, b_d)$  е от вида  $g = f \frac{h'}{h''}$  за неразложим над  $k$  и над  $k(b_1, \dots, b_d)$  полином  $f \in k[b_1, \dots, b_d, x]$ ,  $h', h'' \in k[b_1, \dots, b_d]$ ,  $h''(b_1, \dots, b_d) \neq 0$ .

**Доказателство:** Ако  $d = \text{trdeg}_k F$  е степента на трансцендентност на  $F$  над  $k$ , то работим с индукция по  $n - d \geq 1$ .

В случая  $n - d = 1$  можем да считаме, че  $a_1, \dots, a_d$  е базис на трансцендентност на  $F = k(a_1, \dots, a_d, a_{d+1})$  над  $k$  и  $a_{d+1}$  е алгебричен над  $F_0 :=$

$k(a_1, \dots, a_d)$ . Твърдим, че минималният полином  $g \in k(a_1, \dots, a_d)[x]$  на  $a_{d+1}$  над  $k(a_1, \dots, a_d)$  е от вида  $g = f \frac{h'}{h''}$  за неразложим над  $k$  и над  $k(a_1, \dots, a_d)$  полином  $f \in k[a_1, \dots, a_d, a_{d+1}]$  и  $h', h'' \in k[a_1, \dots, a_d]$ ,  $h''(a_1, \dots, a_d) = 0$ . По-точно,  $g = \frac{g'}{h''}$  за  $g' \in k[a_1, \dots, a_d, x]$ ,  $h'' \in k[a_1, \dots, a_d]$  с  $h''(a_1, \dots, a_d) \neq 0$ . Разлагаме  $g' = f_1 \dots f_s$  в неразложими над  $k$  множители  $f_1, \dots, f_s \in k[a_1, \dots, a_d, x]$ . Тогава  $g = f_1 f_2 \dots f_{s-1} \frac{f_s}{h''}$  е разлагане на  $g$  над  $k(a_1, \dots, a_d)$ . След евентуална пермутация на  $f_1, \dots, f_s$  можем да считаме, че  $f_2, \dots, f_s \in k[a_1, \dots, a_d]$ , така че  $g = f_1 \frac{h'}{h''}$  за неразложим над  $k$  полином  $f := f_1 \in k[a_1, \dots, a_d, x]$  и  $h' := f_2 \dots f_s \in k[a_1, \dots, a_d]$ . Ако допуснем, че  $f = g_1 g_2$  за  $g_i \in k(a_1, \dots, a_d)[x]$ , то съществуват  $g'_i \in k[a_1, \dots, a_d, x]$  и  $h'_i \in k[a_1, \dots, a_d]$  с  $g_i = \frac{g'_i}{h'_i}$ . Следователно  $h'_1 h'_2 f = g'_1 g'_2$  е равенство на полиноми от  $k[a_1, \dots, a_d, x]$ . Неразложимият над  $k$  полином  $f \in k[a_1, \dots, a_d, x]$  дели  $g'_1$  след евентуална пермутация на  $g'_1$  и  $g'_2$ . Всички останали неразложими над  $k$  делители на  $g'_1$ , както и  $g'_2$  са полиноми от  $k[a_1, \dots, a_d]$ . Следователно  $g_2 = \frac{g'_2}{h'_2} \in k(a_1, \dots, a_d)$  и  $f \in k[a_1, \dots, a_d, x]$  е неразложим над  $k(a_1, \dots, a_d)$ .

Ако минималният полином  $g \in k(a_1, \dots, a_d)[x]$  на  $a_{d+1}$  над  $k(a_1, \dots, a_d)$  е сепарабелен, то теоремата е доказана в случая  $n - d = 1$ . Ако  $g \in k(a_1, \dots, a_d)[x]$  не е сепарабелен, то  $g \in k(a_1, \dots, a_d)[x]$  и  $\frac{\partial g}{\partial x} \in k(a_1, \dots, a_d)[x]$  имат общ корен, откъдето и общ делител, зависещ от  $x$ . Съгласно неразложимостта на  $g$  над  $k(a_1, \dots, a_d)$ , най-големият общ делител  $k(a_1, \dots, a_d)[x] \ni \text{GCD}\left(g, \frac{\partial g}{\partial x}\right) = g$ .

Вземайки предвид  $g = f \frac{h'}{h''}$  за неразложим над  $k$  полином  $f \in k[a_1, \dots, a_d, x]$  и  $h', h'' \in k[a_1, \dots, a_d]$ , получаваме  $k[a_1, \dots, a_d, x] \ni \text{GCD}\left(f, \frac{\partial f}{\partial x}\right) = f(x)$ . От  $\deg_x \frac{\partial f}{\partial x} < \deg_x f$  следва  $\frac{\partial f}{\partial x} \equiv 0 \in k[a_1, \dots, a_d, x]$ .

Твърдим, че съществува  $1 \leq i \leq d$ , така че  $\frac{\partial f}{\partial a_i} \neq 0 \in k[a_1, \dots, a_d, x]$ . В противен случай, степенните показатели на всички променливи  $a_1, \dots, a_d, x$  в мономите на полинома  $f \in k[a_1, \dots, a_d, x]$  с ненулеви коефициенти  $c_\alpha$  се делят на характеристиката  $\text{char}(k) = \text{char}(F) = p$ . В алгебрично затвореното поле  $k$  съществува  $p$ -ти корен  $\sqrt[p]{c_\alpha} \in k$  от всяко  $c_\alpha \in k$ , така че  $f(a_1, \dots, a_d, x) = f_0(a_1, \dots, a_d, x)^p$  за някакъв полином  $f_0 \in k[a_1, \dots, a_d, x]$ . Това противоречи на неразложимостта на  $f \in k[a_1, \dots, a_d, x]$  над  $k$  и доказва съществуването на  $1 \leq i \leq d$  с  $\frac{\partial f}{\partial a_i} \neq 0 \in k[a_1, \dots, a_d, x]$ .

Да означим  $F_1 = k(a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_d, a_{d+1})$  и да забележим, че  $a_i$  е алгебричен над  $F_1$ , съгласно  $\frac{\partial f}{\partial a_i} \neq 0$ . Твърдим, че  $a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_d, a_{d+1}$  са трансцендентни над  $k$ . При допускане на обратното,  $\text{trdeg}_k F_1 < d$ . Вземайки предвид, че  $F = F_1(a_i)$  е крайно разширение на  $F_1$ , получаваме  $\text{trdeg}_k F = \text{trdeg}_k F_1 < d$ . Това противоречи на  $\text{trdeg}_k F = d$  и доказва трансцендентността на  $a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_d, a_{d+1}$  над  $k$ . Вече доказахме, че минималният полином  $g_i$  на  $a_i$  над  $F_1$  е от вида  $g_i = f_i \frac{h'_i}{h''_i}$  за неразложим над  $k$  и  $F_1$  полином  $f_i \in k[a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_d, a_{d+1}, x]$  и  $h'_i, h''_i \in k[a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_{d+1}]$ . Полиномите  $f_i \equiv f$  съвпадат, защото

$$f(a_1, \dots, a_{i-1}, x, a_{i+1}, \dots, a_{d+1}) \in F_1[x]$$

има корен  $a_i$  и се дели на  $g_i$  над  $F_1$ . Ако  $f = g_i h_i = \frac{g'_i h'_i}{g''_i h''_i}$  за полиноми  $g'_i, h'_i \in k[a_1, \dots, a_{i-1}, x, a_{i+1}, \dots, a_{d+1}]$ ,  $g''_i, h''_i \in k[a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_{d+1}]$ , то  $f g''_i h''_i = g'_i h'_i$ . Всеки полином от  $k[a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_{d+1}]$  има единствено с точност до множители от  $k^*$  разлагане в крайно произведение от неразложими над  $k$  множители. В случая,  $g'_i = f h''_i$  за  $h''_i \in k[a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_{d+1}]$  и  $h'_i \in k[a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_{d+1}]$ , откъдето  $g_i = \frac{g'_i}{g''_i} = f \frac{h''_i}{g''_i} = f_i \frac{h'_i}{h''_i}$ . Сега от

$fh_i'''h_i'' = f_i h_i' g_i''$  следва  $f = f_i \in k[a_1, \dots, a_{i-1}, x, a_{i+1}, \dots, a_{d+1}]$  поради неразложимостта на  $f$  и  $f_i$  над  $k$ , тяхната зависимост от  $x$  и независимостта на  $h_i''', h_i'', h_i', g_i''$  от  $x$ . Предположението  $\frac{\partial f}{\partial a_i} \neq 0$  гарантира сепарабелността на  $a_i$  над чисто трансцендентното разширение  $F_1 \supset k$  и доказва случая  $n - d = 1$ .

В общия случай с  $n - d \geq 2$  можем да предполагаме, че  $a_n$  е алгебрично над  $k(a_1, \dots, a_{n-1})$ . По индукционно предположение съществува базис на трансцендентност  $c_1, \dots, c_d$  на  $k(a_1, \dots, a_{n-1})$  над  $k$  и сепарабелен над  $k(c_1, \dots, c_d)$  елемент  $\theta_1$ , така че  $k(a_1, \dots, a_{n-1}) = k(c_1, \dots, c_d, \theta_1)$ . За разширението  $F = k(c_1, \dots, c_d, \theta_1, a_n)$  със сепарабелен над  $k(c_1, \dots, c_d)$  елемент  $\theta_1$  и алгебричен над  $k(c_1, \dots, c_d)$  елемент  $a_n$  съществува примитивен елемент  $\theta_2 \in F$  над  $k(c_1, \dots, c_d)$ , така че  $F = k(c_1, \dots, c_d, \theta_2)$ . Повтаряйки разглежданията от случая  $n - d = 1$  получаваме базис на трансцендентност  $b_1, \dots, b_d$  на  $F$  над  $k$  и сепарабелен над  $k(b_1, \dots, b_d)$  елемент  $\theta \in F$ , така че  $F = k(b_1, \dots, b_d, \theta)$  и минималният полином  $g \in k(b_1, \dots, b_d)[x]$  на  $\theta$  над  $k(b_1, \dots, b_d)$  е от вида  $g = f \frac{h'}{h''}$  за неразложим над  $k$  и над  $k(b_1, \dots, b_d)$  полином  $f \in k[b_1, \dots, b_d, x]$  и  $h', h'' \in k[b_1, \dots, b_d]$ ,  $h''(b_1, \dots, b_d) \neq 0$ , Q.E.D.

Сега ще реализираме разширенията  $F = k(b_1, \dots, b_d, \theta) \supset k$  с базис на трансцендентност  $b_1, \dots, b_d$  над  $k$  и сепарабелен над  $k(b_1, \dots, b_d)$  елемент  $\theta$  като функционално поле на неприводима афинна хиперповърхнина.

**СЛЕДСТВИЕ 10.7.** *Нека  $k$  е алгебрично затворено поле,  $F = k(b_1, \dots, b_d, \theta)$  за трансцендентни над  $k$  елементи  $b_1, \dots, b_d$  и сепарабелен над  $k(b_1, \dots, b_d)$  елемент  $\theta$ , чийто минимален полином над  $k(b_1, \dots, b_d)$  е от вида  $g = f \frac{h'}{h''}$  за неразложим над  $k$  и над  $k(b_1, \dots, b_d)$  полином  $f \in k[b_1, \dots, b_d, x]$  и  $h', h'' \in k[b_1, \dots, b_d]$ ,  $h''(b_1, \dots, b_d) \neq 0$ . Тогава  $Z(f) \subset k^{d+1}$  е неприводима афинна хиперповърхнина с функционално поле  $k(Z(f)) \simeq F$ .*

**Доказателство:** Алгебричната структура на полето

$$F = k(b_1, \dots, b_d)(\theta) = k(b_1, \dots, b_d)[\theta] = l_{k(b_1, \dots, b_d)}(1, \theta, \dots, \theta^{m-1})$$

за  $m = \deg_x g = \deg_x f$  се определя напълно от полинома  $f \in k[b_1, \dots, b_d, x]$ . По-точно, събирането в  $F = k(b_1, \dots, b_d)[\theta]$  се определя напълно от събирането в чисто трансцендентното над  $k$  разширение  $k(b_1, \dots, b_d)$ . Умножението в  $F = k(b_1, \dots, b_d)[\theta]$  се индуцира от умножението на полиноми на  $\theta$  с коефициенти от  $k(b_1, \dots, b_d)$ . С помощта на  $f$  представяме  $\theta^l \in l_{k(b_1, \dots, b_d)}(1, \theta, \dots, \theta^{m-1})$  за всички  $l \geq m$ .

По Теоремата на Hilbert за нулите, идеалът  $IZ(f) = r(\langle f \rangle)$ . Неразложимият над  $k$  полином  $f$  поражда прост идеал  $\langle f \rangle \triangleleft k[b_1, \dots, b_d, x]$ , така че радикалът  $r(\langle f \rangle) = \langle f \rangle$  и  $IZ(f) = \langle f \rangle$  е прост идеал. Това е необходимо и достатъчно условие за неприводимостта на  $Z(f) \subset k^{d+1}$ .

Функционалното поле  $k(Z(f)) = k(\overline{x}_1, \dots, \overline{x}_d, \overline{x}_{d+1})$  се поражда от елементите си  $\overline{x}_i = x_i + IZ(f) \in k(Z(f))$ ,  $1 \leq i \leq d + 1$  над  $k$ . Твърдим, че  $\overline{x}_1, \dots, \overline{x}_d$  са трансцендентни над  $k$ . В противен случай съществува нетъждествено нулев полином  $g(x_1, \dots, x_d) \in IZ(f) = \langle f \rangle$ . Но полиномът  $f \in k[x_1, \dots, x_d, x_{d+1}]$ , зависещ от  $x_{d+1}$  не може да дели полинома  $g(x_1, \dots, x_d)$ , който не зависи от  $x_{d+1}$ . Това доказва трансцендентността на  $\overline{x}_1, \dots, \overline{x}_d$  над  $k$ . Полиномът  $f$  задава алгебрична зависимост на  $\overline{x}_{d+1}$  над  $k(\overline{x}_1, \dots, \overline{x}_d)$ . Следователно

$$\begin{aligned} k(Z(f)) &= k(\overline{x}_1, \dots, \overline{x}_d)(\overline{x}_{d+1}) = k(\overline{x}_1, \dots, \overline{x}_d)[\overline{x}_{d+1}] = \\ &= l_{k(\overline{x}_1, \dots, \overline{x}_d)}(1, \overline{x}_{d+1}, \dots, \overline{x}_{d+1}^{m-1}). \end{aligned}$$

Събирането и умножението в  $k(Z(f))$  се определят напълно от полинома  $f \in k[x_1, \dots, x_d, x_{d+1}]$  и съвпадат със съответните операции в  $F$ . Следователно полетата  $F$  и  $k(Z(f))$  са изоморфни, Q.E.D.

**СЛЕДСТВИЕ 10.8.** *Всяко квази-афинно или квази-проективно многообразие  $X$  над алгебрично затворено поле  $k$  е бирационално на афинно пространство  $k^d$ ,  $d = \dim(X)$  или на неприводима хиперповърхнина  $V(f) \subset k^{d+1}$  в афинно пространство.*

**Доказателство:** Можем да заменим  $X$  с квази-афинно Зариски отворено подмножество  $X_o$ , без да променяме функционалното поле  $k(X) = k(X_o)$ . Ако  $X_o \subseteq k^n$ , то  $k(X_o) = k(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$  е крайно породено разширение на  $k$ .

При  $\text{trdeg}_k k(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n) = n$  полето  $k(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$  съвпада с функционалното поле на афинното пространство  $k^n$ . Следователно  $X$  и  $X_o$  са бирационални на  $k^n$ .

За  $\text{trdeg}_k k(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n) = d < n$  прилагаме Теорема 10 и получаваме базис на трансцендентност  $b_1, \dots, b_d$  на  $k(X_o) = k(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$  над  $k$ , както и трансцендентен над  $k$  елемент  $\theta \in k(X_o)$ , така че  $k(X_o) = k(b_1, \dots, b_d, \theta)$  и минималният полином  $g$  на  $\theta$  над  $K(b_1, \dots, b_d)$  е от вида  $g = f \frac{h'}{h''}$  за неразложим над  $k$  и над  $k(b_1, \dots, b_d)$  полином  $f \in k[b_1, \dots, b_d, x]$  и  $h', h'' \in k[b_1, \dots, b_d]$ ,  $h''(b_1, \dots, b_d) \neq 0$ . Съгласна Лема 10.7,  $Z(f) \subset k^{d+1}$  е неприводима хиперповърхнина с функционално поле  $k(Z(f)) = k(b_1, \dots, b_d, \theta) = k(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n) = k(X_o)$ . В резултат,  $X_o$  и  $X$  са бирационални на  $Z(f)$ , Q.E.D.

#### 4. Цяла зависимост

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10.9.** *Комутативният пръстен с единица  $S$  е цял над своя подпръстен с единица  $R$ , ако всеки елемент  $s \in S$  е цял над  $R$ , т.е. за  $\forall s \in S$  съществуват  $n \in \mathbb{N}$  и  $r_0, r_1, \dots, r_{n-1} \in R$ , така че*

$$s^n + r_{n-1}s^{n-1} + \dots + r_1s + r_0 = 0.$$

**ТВЪРДЕНИЕ 10.10.** *Нека  $R$  е подпръстен с единица на комутативен пръстен с единица  $S$ , а  $s$  е елемент на  $S$ . Тогава следните условия са еквивалентни:*

- (i)  $s$  е цял над  $R$ ;
- (ii) подпръстенът  $R[s]$  на  $S$  е крайно породен  $R$ -модул;
- (iii) подпръстенът  $R[s]$  на  $S$  се съдържа в подпръстен с единица  $S_o$  на  $S$ , който е крайно породен  $R$ -модул  $S_o = Rs_1 + \dots + Rs_n$ .

**Доказателство:** (i)  $\Rightarrow$  (ii) Ако  $s$  е цял над  $R$ , то

$$s^n = \sum_{i=0}^{n-1} (-r_i)s^i \in R1_S + Rs + \dots + Rs^{n-1} = R^{(n)}[s]$$

принадлежи на  $R$ -модула  $R^{(n)}[s]$  на полиномите на  $s$  от степен  $\leq n-1$  с коефициенти от  $R$ . С индукция по  $m \geq n$ , ако  $s^m = \sum_{j=0}^{n-1} \rho_{m,j}s^j \in R^{(n)}[s]$ , то

$$\begin{aligned} s^{m+1} &= \sum_{j=0}^{n-2} \rho_{m,j}s^{j+1} + \rho_{m,n-1}s^n = \sum_{i=1}^{n-1} \rho_{m,i-1}s^i + \rho_{m,n-1} \left[ \sum_{i=0}^{n-1} (-r_i)s^i \right] = \\ &= -\rho_{m,n-1}r_0 + \sum_{i=1}^{n-1} (\rho_{m,i-1} - \rho_{m,n-1}r_i)s^i \in R^{(n)}[s], \end{aligned}$$

така че  $R[s] = \sum_{j=0}^{\infty} Rs^j \subseteq R^{(n)}[s] = R1_S + Rs + \dots + Rs^{n-1} \subseteq R[s]$  и  $R[s] = R^{(n)}[s]$

е крайно породен  $R$ -модул.

Импликацията (ii)  $\Rightarrow$  (iii) е тривиална с  $S_o := R[s]$ .

(iii)  $\Rightarrow$  (i) Нека  $S_o$  е подпръстен с единица на  $S$ , съдържащ  $R[s]$ , който е крайно породен  $R$ -модул,  $S_o = Rs_1 + \dots + Rs_m$ . Тогава умножението с  $s$  е изображение

$\mu_s : S_o \rightarrow S_o$ ,  $\mu_s(\sigma) = s\sigma$  на  $S_o$  в себе си. Още повече,  $\mu_s$  е хомоморфизъм на  $R$ -модули, защото

$$\mu_s(\sigma + \tau) = s(\sigma + \tau) = s\sigma + s\tau = \mu_s(\sigma) + \mu_s(\tau) \quad \text{и}$$

$$\mu_s(r\sigma) = s(r\sigma) = (sr)\sigma = (rs)\sigma = r(s\sigma) = r\mu_s(\sigma) \quad \text{за } \forall \sigma, \tau \in S_o, \forall r \in R.$$

Да забележим, че  $\mu_s$  се определя еднозначно от образите  $\mu_s(s_1), \dots, \mu_s(s_m)$  на пораждащите на  $S_o$  като  $R$ -модул. За  $\forall 1 \leq i \leq m$  съществуват  $r_{i,j} \in R$ , така че  $S_o \ni \mu_s(s_i) = \sum_{j=1}^m r_{i,j}s_j$ . Образуваме  $m \times m$ -матрицата  $\mu_s E_m$  и  $m \times m$ -матрицата  $M_o = (r_{i,j})_{i,j=1}^m$ . Забелязваме, че

$$(\mu_s E_m - M_o) \begin{pmatrix} s_1 \\ \dots \\ s_i \\ \dots \\ s_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu_s(s_1) - \sum_{j=1}^m r_{1,j}s_j \\ \dots \\ \mu_s(s_i) - \sum_{j=1}^m r_{i,j}s_j \\ \dots \\ \mu_s(s_m) - \sum_{j=1}^m r_{m,j}s_j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \dots \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Нека  $(\mu_s E_m - M_o)^*$  е  $m \times m$ -матрицата, която в  $i$ -ти ред и  $j$ -ти стълб съдържа адюнгираното количество на  $(j, i)$ -тия елемент на  $\mu_s E_m - M_o$ . Тогава произведението  $(\mu_s E_m - M_o)^*(\mu_s E_m - M_o) = \det(\mu_s E_m - M_o)E_m$  е скалярна матрица и

$$\begin{pmatrix} \det(\mu_s E_m - M_o)s_1 \\ \dots \\ \det(\mu_s E_m - M_o)s_i \\ \dots \\ \det(\mu_s E_m - M_o)s_m \end{pmatrix} = (\mu_s E_m - M_o)^*(\mu_s E_m - M_o) \begin{pmatrix} s_1 \\ \dots \\ s_i \\ \dots \\ s_m \end{pmatrix} = \\ = (\mu_s E_m - M_o)^* \begin{pmatrix} 0 \\ \dots \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \dots \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Полиномът

$$\det(\mu_s E_m - M_o) = \mu_s^m - \left( \sum_{i=1}^m r_{i,i} \right) \mu_s^{m-1} + c_2 \mu_s^{m-2} + \dots + c_{m-1} \mu_s + (-1)^m \det(M_o) \quad (10.2)$$

на  $\mu_s$  с коефициенти  $c_i \in R$  е хомоморфизъм  $\det(\mu_s E_m - M_o) : S_o \rightarrow S_o$  на  $R$ -модули, действащ по правилото

$$\det(\mu_s E_m - M_o)(\sigma) = \left( \sum_{i=0}^m c_i \mu_s^{m-i} \right) (\sigma) = \sum_{i=0}^m c_i s^{m-i} \sigma$$

върху  $\forall \sigma \in S_o$ . Да отбележим, че  $\det(\mu_s E_m - M_o)$  се анулира тъждествено върху  $S_o$ , защото се анулира върху всеки от пораждащите  $s_1, \dots, s_m$  на  $S_o$  като  $R$ -модул. В частност, стойността на  $\det(\mu_s E_m - M_o)$  върху единицата  $1_S = 1_R$  е

$$s^m - \left( \sum_{i=1}^m r_{i,i} \right) s^{m-1} + c_2 s^{m-2} + \dots + c_{m-1} s + (-1)^m \det(M_o) = 0.$$

По определение, това означава, че  $s \in S$  е цял над  $R$ , Q.E.D.



**СЛЕДСТВИЕ 10.11.** Нека  $R$  е комутативен подпръстен с единица на комутативен пръстен с единица  $S$ , а  $s_1, \dots, s_n \in S$  са елементи на  $S$ . В такъв случай, крайно породената  $R$ -алгебра  $R[s_1, \dots, s_n]$  е крайно породен  $R$ -модул тогава и само тогава, когато  $s_1, \dots, s_n$  са цели над  $R$ .

**Доказателство:** Ако  $R$  е комутативен подпръстен с единица на комутативен пръстен с единица  $S$ , то  $S$  е  $R$ -алгебра. Да предположим, че крайно породената  $R$ -алгебра  $R[s_1, \dots, s_n]$  е крайно породен  $R$ -модул. Тогава съгласно Твърдение 10.10, всяко  $s_i$  е цяло над  $R$ , защото подпръстенът  $R[s_i]$  на  $S$  се съдържа в подпръстена с единица  $R[s_1, \dots, s_n] \subseteq S$ , който е крайно породен  $R$ -модул.

Ако  $s_1, \dots, s_n$  са цели над  $R$ , то с индукция по  $1 \leq i \leq n$  ще докажем, че  $A_i = R[s_1, \dots, s_i]$  е крайно породен  $R$ -модул. По Твърдение 10.10,  $A_1 = R[s_1]$  е крайно породен  $R$ -модул. Да допуснем, че  $A_{i-1} := R[s_1, \dots, s_{i-1}]$  е крайно породен  $R$ -модул. Тогава съществуват полиноми  $f_j(s_1, \dots, s_{i-1}) \in R[s_1, \dots, s_{i-1}] = A_{i-1}$ , така че  $A_{i-1} = \sum_{j=1}^m Rf_j$ . Разглеждаме

$$A_i := R[s_1, \dots, s_{i-1}, s_i] = R[s_1, \dots, s_{i-1}][s_i] = A_{i-1}[s_i]$$

като  $A_{i-1}$ -алгебра. Понеже  $R$  е подпръстен на  $A_{i-1}$ , елементът  $s_i \in S$  е цял над  $A_{i-1}$ . Съгласно Твърдение 10.10, пръстенът  $A_i = A_{i-1}[s_i]$  е крайно породен  $A_{i-1}$ -модул. С други думи, съществуват полиноми  $g_s(s_1, \dots, s_i) \in A_{i-1}[s_i] = R[s_1, \dots, s_i]$ , така че

$$A_i = \sum_{s=1}^p A_{i-1}g_s = \sum_{s=1}^p \left( \sum_{j=1}^m f_j R \right) g_s = \sum_{s=1}^p \sum_{j=1}^m (f_j g_s) R$$

се поражда като  $R$ -модул от  $pm$  полиноми  $f_j g_s$ ,  $1 \leq j \leq m$ ,  $1 \leq s \leq p$ . В частност,  $A_n = R[s_1, \dots, s_n]$  е крайно породен  $R$ -модул, Q.E.D.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10.12.** Нека  $S$  е пръстен с единица,  $R$  е подпръстен с единица на  $S$ . Тогава  $S$  е цял над  $R$ , ако всеки елемент  $s \in S$  е цял над  $R$ .

От Твърдени 10.10 и Следствие 10.11 непосредствено се получава следното

**СЛЕДСТВИЕ 10.13.** Нека  $S$  е комутативен пръстен с единица,  $R$  е подпръстен с единица на  $S$  и  $s_1, \dots, s_n \in S$ . Тогава следните условия са еквивалентни на крайно породената  $R$ -алгебра  $R[s_1, \dots, s_n]$ :

- (i) пръстенът  $R[s_1, \dots, s_n]$  е цял над  $R$ ;
- (ii)  $R[s_1, \dots, s_n]$  е крайно породен  $R$ -модул;
- (iii) пораждащите  $s_1, \dots, s_n$  на  $R[s_1, \dots, s_n]$  като  $R$ -алгебра са цели над  $R$ .

**ЛЕМА 10.14.** Нека  $T$  е комутативен пръстен с единица,  $S$  е подпръстен с единица на  $T$ , а  $R$  е подпръстен с единица на  $S$ . Ако  $T$  е цял над  $S$  и  $S$  е цял над  $R$ , то  $T$  е цял над  $R$ .

**Доказателство:** За  $\forall t \in T$  съществуват  $n \in \mathbb{N}$  и  $s_0, \dots, s_{n-1} \in S$ , така че

$$t^n + s_{n-1}t^{n-1} + \dots + s_1t + s_0 = 0.$$

Това позволява разглеждането на  $t$  като цял над  $R[s_0, \dots, s_{n-1}]$  елемент на  $T$ .

Следователно  $R[s_0, \dots, s_{n-1}][t] = \sum_{j=1}^p R[s_0, \dots, s_{n-1}]\mu_j$  е крайно породен модул над  $R[s_0, \dots, s_{n-1}]$ , съгласно Твърдение 10.10. По предположение,  $s_0, \dots, s_{n-1} \in S$  са цели над  $R$ , така че  $R[s_0, \dots, s_{n-1}] = \sum_{i=1}^q R\lambda_i$  е крайно породен  $R$ -модул по Следствие 10.11. Оттук  $R[s_0, \dots, s_{n-1}][t] = \sum_{i=1}^q \sum_{j=1}^p R\lambda_i\mu_j$  е подпръстен с единица на  $T$ , който е крайно породен  $R$ -модул. Сега от  $R[t] \subseteq R[s_0, \dots, s_{n-1}, t]$

получаваме, че  $t$  е цял над  $R$ , прилагайки Твърдение 10.10. Това доказва, че пръстенът  $T$  е цял над своя подпръстен с единица  $R$ , Q.E.D.

### 5. Лема на Noether за нормализация

**ТЕОРЕМА 11.** (Лема на Noether за нормализация) *Нека  $k$  е поле,  $A = k[\eta_1, \dots, \eta_n]$  е крайно породена  $k$ -алгебра без делители на нулата, която не е крайномерно линейно пространство над  $k$ , а  $F$  е полето от частни на  $A$ . Ако  $F$  е от степен на трансцендентност  $\text{tr deg}_k(F) = d$  над  $k$ , то съществува базис на трансцендентност  $\xi_1, \dots, \xi_d \in A$  на  $F$  над  $k$ , така че  $k$ -алгебрата  $A = k[\eta_1, \dots, \eta_n]$  е цяла над  $k[\xi_1, \dots, \xi_d]$ .*

**Доказателство:** Степента на трансцендентност  $d$  на  $F$  над  $k$  е максималният брой на трансцендентните над  $k$  елементи  $\eta_1, \dots, \eta_d$  на пораждащото множество  $\eta_1, \dots, \eta_n$  на  $F = k(\eta_1, \dots, \eta_n)$  над  $k$ . Оттук,  $d \leq n$ . Ако  $d = n$ , то  $\eta_1, \dots, \eta_n$  е базис на трансцендентност на  $F$  над  $k$  с необходимите свойства.

Отсега нататък ще предполагаме, че  $n > d$ . Ще работим с индукция по броя на пораждащите  $n$  на  $A$  като  $k$ -алгебра. Съгласно алгебричността на  $\eta_1, \dots, \eta_n$  над  $k$ , съществува полином  $0 \neq f(t_1, \dots, t_n) \in k[t_1, \dots, t_n]$  с

$$0 = f(\eta_1, \dots, \eta_n) = \sum_{\alpha} c_{\alpha} \eta_1^{\alpha_1} \dots \eta_n^{\alpha_n},$$

където  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in (\mathbb{Z}^{\geq 0})^n$  и сумата е крайна.

Твърдим, че  $\text{tr deg}_k(F) = d \geq 1$ , защото в противен случай  $[F : k] < \infty$  и  $\eta_1, \dots, \eta_n \in A \subseteq F$  са алгебрични, а оттам и цели над полето  $k$ . Тогава по Следствие 10.11, крайно породената  $k$ -алгебра  $A = k[\eta_1, \dots, \eta_n]$  е крайномерно линейно пространство над полето  $k$ , противно на предположението. Това доказва, че  $\text{tr deg}_k(F) \geq 1$ . След евентуална преномерация на  $\eta_1, \dots, \eta_n$  можем да считаме, че  $\eta_1$  е трансцендентно над  $k$ .

Избираме достатъчно голямо естествено число  $N$ , така че  $N > \alpha_i$  за  $\forall \alpha$  с  $c_{\alpha} \neq 0$  и  $\forall 1 \leq i \leq n$ . Полагаме

$$\zeta_i = \eta_i - \eta_1^{N^{i-1}} \quad \text{за } \forall 2 \leq i \leq n.$$

Въвеждаме лексикографската наредба на мономи  $x^{\alpha} > x^{\beta}$  с  $x_n > x_{n-1} > \dots > x_1$ . По-точно,  $x^{\alpha} > x^{\beta}$  точно когато, съществува  $1 \leq i \leq n$ , така че  $\alpha_n = \beta_n$ ,  $\alpha_{n-1} = \beta_{n-1}$ ,  $\dots$ ,  $\alpha_{i+1} = \beta_{i+1}$ ,  $\alpha_i > \beta_i$ . Нека  $c_{\gamma} \eta^{\gamma}$  е максималният относно обратната лексикографска наредба моном на  $f$  с ненулев коефициент  $c_{\gamma} \neq 0$ . Представяме

$$0 = f\left(\eta_1, \zeta_2 + \eta_1^N, \dots, \zeta_n + \eta_1^{N^{n-1}}\right) = f\left(\eta_1, \eta_1^N, \dots, \eta_1^{N^{n-1}}\right) + f_o(\eta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_n)$$

чрез полином  $f_o$  на  $\eta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_n$ , чиито всички мономи са кратни на поне един от елементите  $\zeta_2, \dots, \zeta_n$ . Твърдим, че мономът  $c_{\gamma} \eta_1^{\gamma_1 + \gamma_2 N + \dots + \gamma_n N^{n-1}}$  е старши член на полинома

$$f\left(\eta_1, \eta_1^N, \dots, \eta_1^{N^{n-1}}\right) = \sum_{\alpha} c_{\alpha} \eta_1^{\alpha_1 + \alpha_2 N + \dots + \alpha_n N^{n-1}},$$

т.е. степенният му показател е строго по-голям от степенните показатели на всички останали мономи с ненулев коефициент. При допускане на противното съществува моном на  $\eta_i$  със степенен показател  $\alpha_1 + \alpha_2 N + \dots + \alpha_n N^{n-1} \geq \gamma_1 + \gamma_2 N + \dots + \gamma_n N^{n-1}$ . Ако положим  $\lambda_i := \gamma_i - \alpha_i$  за  $\forall 1 \leq i \leq n$ , то получаваме неравенството  $\lambda_1 + \lambda_2 N + \dots + \lambda_n N^{n-1} \leq 0$ . Съгласно определеното на лексикографската наредба с  $x_n > x_{n-1} > \dots > x_1$  и избора на  $c_{\gamma} \eta_1^{\gamma}$  като старши моном на  $f(\eta_1, \dots, \eta_n)$ , съществува индекс  $1 \leq i \leq n$ , така че  $\gamma_i > \alpha_i$ ,  $\gamma_{i+1} = \alpha_{i+1}, \dots, \gamma_n = \alpha_n$ . Оттук,  $\lambda_1 + \lambda_2 N + \dots + \lambda_i N^{i-1} \leq 0$  с

$\lambda_i > 0$  води до противоречие при избор на достатъчно голямо  $N \in \mathbb{N}$  и доказва, че  $c_\gamma \eta_1^{\gamma_1 + \gamma_2 N + \dots + \gamma_n N^{n-1}} \neq 0$  е старшият моном на  $f(\eta_1, \eta_1^N, \dots, \eta_1^{N^{n-1}})$ . Степенните показатели на  $\eta_1$  в мономите на  $f_o(\eta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_n)$  са строго по-малки от  $\gamma_1 + \gamma_2 N + \dots + \gamma_n N^{n-1}$ , така че можем да разглеждаме полинома  $f(\eta_1, \zeta_2 + \eta_1^N, \dots, \zeta_n + \eta_1^{N^{n-1}}) = 0$  като цяла зависимост на  $\eta_1$  над  $k[\zeta_2, \dots, \zeta_n]$  след деление с  $c_\gamma \in k^*$ .

Да отбележим, че  $k[\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n] = k[\eta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_n]$ , съгласно  $\eta_i = \zeta_i + \eta_1^{N^{i-1}} \in k[\eta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_n]$  за  $\forall 2 \leq i \leq n$  и  $\zeta_i = \eta_i - \eta_1^{N^{i-1}} \in k[\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n]$  за  $\forall 2 \leq i \leq n$ . В резултат,  $F = k(\eta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_n)$  съвпада с полето от частни на  $k[\eta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_n]$ . По индукционно предположение имаме базис на трансцендентност  $\xi_1, \dots, \xi_d \in k[\zeta_2, \dots, \zeta_n]$  на  $k(\zeta_2, \dots, \zeta_n)$  над  $k$ , така че  $k[\zeta_2, \dots, \zeta_n]$  е цял над  $k[\xi_1, \dots, \xi_d]$ . Твърдим, че  $\xi_1, \dots, \xi_d \in k[\zeta_2, \dots, \zeta_n] \subset k[\eta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_n]$  е базис на трансцендентност на  $F$  над  $k$  и  $k[\eta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_n]$  е цял над  $k[\xi_1, \dots, \xi_d]$ . Наистина,  $\eta_1$  е алгебричен над  $k(\zeta_2, \dots, \zeta_n)$ , така че  $[F = k(\eta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_n) : k(\zeta_2, \dots, \zeta_n)] < \infty$ . От това, че  $\xi_1, \dots, \xi_d$  е базис на трансцендентност на  $k[\zeta_2, \dots, \zeta_n]$  над  $k$  имаме  $[k(\zeta_2, \dots, \zeta_n) : k(\xi_1, \dots, \xi_d)] < \infty$ . Следователно

$$[F : k(\xi_1, \dots, \xi_d)] = [F : k(\zeta_2, \dots, \zeta_n)][k(\zeta_2, \dots, \zeta_n) : k(\xi_1, \dots, \xi_d)] < \infty$$

и  $\xi_1, \dots, \xi_d$  е базис на трансцендентност на  $F$  над  $k$ . Пораждащият  $\eta_1$  на  $k[\eta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_n] = k[\zeta_2, \dots, \zeta_n][\eta_1]$  като  $k[\zeta_2, \dots, \zeta_n]$ -алгебра е цял над  $k[\zeta_2, \dots, \zeta_n]$ , така че целият пръстен  $k[\eta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_n]$  е цял над  $k[\zeta_2, \dots, \zeta_n]$ . Поради транзитивността на цялата зависимост и това, че  $k[\zeta_2, \dots, \zeta_n]$  е цял над  $k[\xi_1, \dots, \xi_d]$  получаваме, че  $k[\eta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_n]$  е цял над  $k[\xi_1, \dots, \xi_d]$ , Q.E.D.

Лемата на Noether за нормализация дава геометрична интерпретация на размерността на алгебрично многообразие. С нейна помощ се установява независимостта на степента на трансцендентност на функционалното поле от полето на константите.

**ЛЕМА 10.15.** Ако  $X/k$  е квази-афинно или квази-проективно многообразие, определено над  $k$ , то степените на трансцендентност

$$\text{trdeg}_{\bar{k}} \bar{k}(X) = \text{trdeg}_k k(X)$$

съвпадат.

**Доказателство:** След евентуално преминаване към афинно Зариски отворено подмножество можем да считаме, че  $X \subseteq \bar{k}^n$  е квази-афинно многообразие. Да означим с  $I(X, k) := I(X) \cap k[x_1, \dots, x_n]$  идеала на  $X$  над  $k$ . Тогава афинният координатен пръстен  $A = k[X] = k[x_1 + I(X, k), \dots, x_n + I(X, k)]$  на  $X$  над  $k$  е крайно породена  $k$ -алгебра без делители на нулата. Ако  $A$  е крайномерно пространство над  $k$ , то  $x_i + I(X, k)$  са цели над  $k$ , а оттам и над  $\bar{k}$ . Следователно крайно породените разширения  $k(X) = k(x_1 + I(X, k), \dots, x_n + I(X, k)) \supseteq k$  и  $\bar{k}(X) = \bar{k}(x_1 + I(X, k), \dots, x_n + I(X, k)) \supseteq \bar{k}$  са алгебрични от степен на трансцендентност  $\text{trdeg}_k k(X) = \text{trdeg}_{\bar{k}} \bar{k}(X) = 0$ .

Отсега натагък ще предполагаме, че размерността на  $A$  над  $k$  е базкрайна и полето от частни  $k(X)$  на  $A$  е от степен на трансцендентност  $\delta = \text{trdeg}_k k(X)$  над  $k$ . По Лемата на Noether за нормализация съществува базис на трансценденост  $\psi_1, \dots, \psi_\delta \in A = k[X]$  на  $k(X)$  над  $k$ , така че

$$A = k[X] = k[x_1 + I(X, k), \dots, x_n + I(X, k)]$$

е цял над  $A_o = k[\psi_1, \dots, \psi_\delta]$ . Следователно  $A = \varphi_1 A_o + \dots + \varphi_m A_o$  е крайно породен  $A_o$ -модул.

Влагането  $k[x_1, \dots, x_n] \hookrightarrow \bar{k}[x_1, \dots, x_n]$  индуцира влагане

$$k[X] = k[x_1, \dots, x_n]/I(X) \cap k[x_1, \dots, x_n] \hookrightarrow \bar{k}[x_1, \dots, x_n]/I(X) = \bar{k}[X]$$

в афинния координатен пръстен  $A_1 = \bar{k}[X] = \bar{k}[x_1 + I(X), \dots, x_n + I(X)]$ . Да напомним, че  $A_1 = \bar{k}[X]$  съвпада с  $\bar{k}$ -линейната обвивка на  $A = k[X]$ ,  $A_1 = l_{\bar{k}}(A)$ . Ако  $A_2 := l_{\bar{k}}(A_o)$  е  $\bar{k}$ -линейната обвивка на  $A_o$ , то

$$A_1 = l_{\bar{k}}A = \varphi_1 l_{\bar{k}}A_o + \dots + \varphi_m l_{\bar{k}}A_o = \varphi_1 A_2 + \dots + \varphi_m A_2$$

е крайно породен  $A_2$ -модул, така че  $A_1$  е цял над  $A_2$ . Следователно всеки пораждащ  $x_i + I(X)$  на  $A_1 = \bar{k}[x_1 + I(X), \dots, x_n + I(X)]$  като  $\bar{k}$ -алгебра е алгебричен над полето от частни  $\bar{k}(\psi_1, \dots, \psi_\delta)$  на  $A_2 = \bar{k}[\psi_1, \dots, \psi_\delta]$ . Функционалното поле  $\bar{k}(X) = \bar{k}(x_1 + I(X), \dots, x_n + I(X)) = F(A_1)$  съвпада с полето от частни на  $A_1$  и е крайно разширение на  $\bar{k}(\psi_1, \dots, \psi_\delta)$ . Остава да докажем, че  $\psi_1, \dots, \psi_\delta$  са трансцендентни над  $\bar{k}$ , за да получим, че  $\psi_1, \dots, \psi_\delta$  е базис на трансцендентност на  $\bar{k}(X)$  над  $\bar{k}$  и

$$\text{trdeg}_{\bar{k}} \bar{k}(X) = \delta = \text{trdeg}_k k(X).$$

Да допуснем, че съществува  $g \in \bar{k}[y_1, \dots, y_\delta] \setminus \{0\}$  с  $g(\psi_1, \dots, \psi_\delta) = 0$ . Нека  $E \supseteq k$  е крайно разширение на Galois, съдържащо всички коефициенти на  $g$ . Тогава  $g \in E[y_1, \dots, y_\delta]$  и

$$\begin{aligned} g_o &:= \prod_{\sigma \in \text{Gal}(E/k)} \sigma(g(y_1, \dots, y_\delta)) \in \bar{k}[y_1, \dots, y_\delta]^{\text{Gal}(E/k)} = \\ &= \bar{k}[y_1, \dots, y_\delta]^{\text{Gal}(\bar{k}/k)} = k[y_1, \dots, y_\delta] \end{aligned}$$

е ненулев полином с коефициенти от  $k$  и  $g_o(\psi_1, \dots, \psi_\delta) = 0$ . Това противоречи на трансцендентността на  $\psi_1, \dots, \psi_\delta$  над  $k$  и доказва тяхната трансцендентност над  $\bar{k}$ , Q.E.D.

**СЛЕДСТВИЕ 10.16.** *Нека  $X/k \subseteq \bar{k}^n$  е квази-афинно многообразие с положителна размерност  $\dim X \geq 1$ , определено над свършено поле  $k$ .*

(i) *Размерността на  $X$  е онова неотрицателно цяло  $d$ , за което съществува краен доминантен  $k$ -морфизъм  $f = (f_1, \dots, f_d) : X \rightarrow \bar{k}^d$ , зададен от елементи  $f_1, \dots, f_d \in k[X]$ .*

(ii) *Размерността на  $X$  е максималното неотрицателно цяло  $d$ , за което съществува доминантен  $k$ -морфизъм  $f = (f_1, \dots, f_d) : X \rightarrow \bar{k}^d$ , зададен от елементи  $f_1, \dots, f_d \in k[X]$ .*

**Доказателство:** Съгласно Лемата на Noether за нормализация и Лема 10.15, съществува базис на трансцендентност  $f_1, \dots, f_d \in k[X]$  на  $k(X)$  над  $k$ , така че  $k[X]$  е цял над  $k[f_1, \dots, f_d]$ . За произволно естествено число  $s \leq d$ , влагенето  $k(f_1, \dots, f_d) \subseteq k(X)$  отговаря на доминантно рационално изображение  $(f_1, \dots, f_s) : X \dashrightarrow \bar{k}^s$ . Това изображение е  $k$ -морфизъм, защото  $f_1, \dots, f_s \in k[X]$ . В случая  $s = d$ , разширението  $k(X) \supseteq k(f_1, \dots, f_d)$  е крайно, така че доминантният  $k$ -морфизъм  $f = (f_1, \dots, f_d) : X \rightarrow \bar{k}^d$  е краен.

Да допуснем, че съществува доминантен  $k$ -морфизъм  $\varphi : X \rightarrow \bar{k}^s$  за някакво естествено  $s > d$ . Тогава  $\varphi$  индуцира влагане  $\varphi : \bar{k}(x_1, \dots, x_s) \hookrightarrow \bar{k}(X)$  на чисто трансцендентното разширение  $\bar{k}(x_1, \dots, x_s)$  на  $\bar{k}$ . В резултат,  $d = \text{trdeg}_{\bar{k}} \bar{k}(X) \geq s > d$ , щом  $\bar{k}(X)$  съдържа трансцендентните над  $\bar{k}$  елементи  $x_1, \dots, x_s \in \bar{k}(x_1, \dots, x_s) \subseteq \bar{k}(X)$ . Противоречието доказва, че  $d = \dim X$  е максималното естествено число, за което съществува доминантен  $k$ -морфизъм  $X \rightarrow \bar{d}$ , Q.E.D.

**ЗАДАЧА 10.17.** *Да се докаже, че ако квази-афинно или квази-прективно многообразие  $X$  има крайно доминантно рационално изображение  $\varphi : X \dashrightarrow k^d$ , то  $X$  е с размерност  $d$ .*

**ЗАДАЧА 10.18.** Нека  $X$  е квази-проективно многообразие с размерност  $\dim(X) = d$ . Да се докаже, че съществува крайно доминантно рационално изображение  $\varphi : X \dashrightarrow \mathbb{P}^d(k)$ .

### 6. Повдигане и спускане на идеали

Нека  $R$  е подпръстен с единица на комутативния пръстен с единица  $S$ ,  $\mathfrak{p} \triangleleft R$ ,  $\mathfrak{q} \triangleleft S$  са идеали. Ако  $\mathfrak{p} = \mathfrak{q} \cap R$ , то казваме, че  $\mathfrak{q}$  лежи над  $\mathfrak{p}$ .

Непосредствено се вижда, че ако  $\mathfrak{q}$  е прост идеал в  $S$ , то  $\mathfrak{q} \cap R$  е прост идеал в  $R$ . По-точно, хомоморфизмът на пръстени  $\pi : R \rightarrow S/\mathfrak{q}$ ,  $\pi(a) = a + \mathfrak{q}$  има ядро  $\ker(\pi) = R \cap \mathfrak{q}$ , така че образът  $\text{im}(\pi) \simeq R/\ker(\pi) = R/R \cap \mathfrak{q}$  е подпръстен на областта  $S/\mathfrak{q}$  и няма делители на нулата. Оттук идеалът  $\mathfrak{q} \cap R \triangleleft R$  е прост.

**ЛЕМА 10.19.** Нека  $R$  е подпръстен с единица на комутативната област с единица  $S$ , а  $\mathfrak{p} \triangleleft R$  е прост идеал. В такъв случай,  $S$  съдържа прост идеал  $\mathfrak{q} \triangleleft S$ , лежащ над  $\mathfrak{p} = \mathfrak{q} \cap R$ , тогава и само тогава, когато  $\mathfrak{p}S$  лежи над  $\mathfrak{p}$ ,  $\mathfrak{p}S \cap R = \mathfrak{p}$ .

**Доказателство:** Ако  $\mathfrak{q} \triangleleft S$  е прост идеал, лежащ над  $\mathfrak{p}$ , то от

$$\mathfrak{p}S \cap R \subseteq \mathfrak{q} \cap R = \mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{p}S \cap R$$

следва  $\mathfrak{p}S \cap R = \mathfrak{p}$ .

Обратно, нека  $\mathfrak{p}S \cap R = \mathfrak{p}$ . Допълнението  $R \setminus \mathfrak{p}$  на простия идеал  $\mathfrak{p}$  е мултипликативно затворено подмножество на  $S$ , така че можем да образуваме локализацията  $S_{\mathfrak{p}} = (R \setminus \mathfrak{p})^{-1}S$  на  $S$ . От  $\mathfrak{p}S \cap (R \setminus \mathfrak{p}) = \emptyset$  следва, че  $1 \notin \mathfrak{p}S_{\mathfrak{p}}$ , защото в противен случай съществува  $r \in R \setminus \mathfrak{p}$  с  $r = r \cdot 1 \in \mathfrak{p}S_{\mathfrak{p}} \cap (R \setminus \mathfrak{p})$ . Следователно съществува максимален идеал  $\mathfrak{M} \triangleleft S_{\mathfrak{p}}$ . Нека  $\mathfrak{q} = \mathfrak{M} \cap S$ . Тогава  $S/\mathfrak{q} = S/(\mathfrak{M} \cap S)$  е подпръстен на полето  $S_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{M}$ , така че  $S/\mathfrak{q}$  е област на цялост и идеалът  $\mathfrak{q} \triangleleft S$  е прост.

От  $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{M}$  следва  $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{M} \cap R = (\mathfrak{M} \cap S) \cap R = \mathfrak{q} \cap R$ . От друга страна, максималният идеал  $\mathfrak{M} \triangleleft S_{\mathfrak{p}}$  е собствен и не пресича множеството  $R \setminus \mathfrak{p}$  на обратимите елементи на  $S_{\mathfrak{p}}$ . В резултат,  $\mathfrak{q} \cap R = (\mathfrak{M} \cap S) \cap R = \mathfrak{M} \cap R \subseteq \mathfrak{p}$ , така че  $\mathfrak{q} \cap R = \mathfrak{p}$  и простият идеал  $\mathfrak{q} \triangleleft S$  лежи над простия идеал  $\mathfrak{p} \triangleleft R$ , Q.E.D.

**ЛЕМА 10.20.** Нека  $S$  е комутативен пръстен с единица,  $R$  е подпръстен с единица на  $S$ ,  $S$  е цял над  $R$  и  $\mathfrak{q}$  е прост идеал в  $S$ . В такъв случай, идеалът  $\mathfrak{q} \triangleleft S$  е максимален тогава и само тогава, когато идеалът  $\mathfrak{p} = \mathfrak{q} \cap R$  е максимален.

**Доказателство:** Ще докажем, че  $R/\mathfrak{p}$  е поле тогава и само тогава, когато  $S/\mathfrak{q}$  е поле. За целта да забележим, че фактор-пръстенът  $S/\mathfrak{q}$  е цял над фактор-пръстена  $R/\mathfrak{p}$ . По-точно, за  $\forall s \in S$  с цяла зависимост

$$s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n = 0$$

над  $R \ni a_1, \dots, a_n$  получаваме равенството

$$(s + \mathfrak{q})^n + (a_1 + \mathfrak{q})(s + \mathfrak{q})^{n-1} + \dots + (a_{n-1} + \mathfrak{q})(s + \mathfrak{q}) + (a_n + \mathfrak{q}) = 0. \quad (10.3)$$

Понеже  $R/\mathfrak{p} = R/\mathfrak{q} \cap R$  е подпръстен на  $S/\mathfrak{q}$ , можем да отъждествим  $a_i + \mathfrak{q}$  с  $a_i + \mathfrak{p}$  за  $a_i \in R$  и да разглеждаме (10.3) като цяла зависимост на  $s + \mathfrak{q}$  над  $R/\mathfrak{p}$ . Да допуснем, че  $R/\mathfrak{p}$  е поле и да разгледаме произволен ненулев елемент  $y \in (S/\mathfrak{q}) \setminus \{\mathfrak{q}\}$ . Ако

$$y^n + \alpha_1 y^{n-1} + \dots + \alpha_{n-1} y + \alpha_n = 0$$

е цялата зависимост на  $y$  над  $R/\mathfrak{p} \ni \alpha_1, \dots, \alpha_n$  от минимална степен, то почленно умножение с  $\alpha_n^{-1} y^{-1}$  за  $\alpha_n^{-1} \in R/\mathfrak{p}$  дава

$$y^{-1} = -\alpha_n^{-1}(y^{n-1} + \alpha_1 y^{n-2} + \dots + \alpha_{n-1}) \in S/\mathfrak{q}.$$

Следователно  $y$  е обратим в  $S/\mathfrak{q}$  и  $S/\mathfrak{q}$  е поле.

Обратно, ако  $S/\mathfrak{q}$  е поле и  $x \in (R/\mathfrak{p}) \setminus \{\mathfrak{p}\}$  е произволен ненулев елемент, то съществува  $x^{-1} \in S/\mathfrak{q}$ . Нека

$$x^{-m} + c_1 x^{-m+1} + \dots + c_{m-1} x^{-1} + c_m = 0$$

е цяла зависимост на  $x^{-1}$  над  $R/\mathfrak{p} \ni c_1, \dots, c_m$ . Умножавайки почленно с  $x^{m-1}$  получаваме

$$x^{-1} = -(c_1 + c_2 x + \dots + c_m x^{m-1}) \in R/\mathfrak{p}.$$

Това доказва, че  $x$  е обратим в  $R/\mathfrak{p}$  и  $R/\mathfrak{p}$  е поле, Q.E.D.

**ЛЕМА 10.21.** *Нека  $S$  е комутативна област с единица,  $R$  е подпръстен с единица на  $S$ ,  $S$  е цял над  $R$  и  $\mathfrak{q}_1 \subsetneq \mathfrak{q}_2$  са различни прости идеали в  $S$ . Тогава*

$$\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{q}_1 \cap R \subsetneq \mathfrak{q}_2 \cap R = \mathfrak{p}_2$$

*са различни прости идеали в  $R$ .*

**Доказателство:** Да допуснем, че  $\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{q}_1 \cap R = \mathfrak{q}_2 \cap R = \mathfrak{p}_2 = \mathfrak{p}$  за различни прости идеали  $\mathfrak{q}_1 \subsetneq \mathfrak{q}_2$  в  $S$ . Локализацията

$$S_{\mathfrak{p}} = \left\{ \frac{s}{r} \mid s \in S, r \in R \setminus \mathfrak{p} \right\}$$

относно  $\mathfrak{p}$  или  $R \setminus \mathfrak{p}$  е цяла над локализацията

$$R_{\mathfrak{p}} = \left\{ \frac{r_1}{r} \mid r_1 \in R, r \in R \setminus \mathfrak{p} \right\},$$

защото произволна цяла зависимост

$$s^m + r_1 s^{m-1} + \dots + r_{m-1} s + r_m = 0$$

на  $s \in S$  над  $R \ni r_1, \dots, r_m$  индуцира цяла зависимост

$$\left( \frac{s}{r} \right)^m + \rho_1 \left( \frac{s}{r} \right)^{m-1} + \dots + \rho_{m-1} \left( \frac{s}{r} \right) + \rho_m = 0$$

на  $\frac{s}{r}$  над  $R_{\mathfrak{p}} \ni \rho_1, \dots, \rho_m$  след почленно умножение с  $r^{-m}$  за  $r \in R \setminus \mathfrak{p}$ .

Твърдим, че локализацията  $(\mathfrak{q}_j)_{\mathfrak{p}} \triangleleft S_{\mathfrak{p}}$  на  $\mathfrak{q}_j \triangleleft S$  относно  $\mathfrak{p}$  са прости идеали, лежащи над локализацията  $\mathfrak{p}_{\mathfrak{p}} \triangleleft R_{\mathfrak{p}}$  на  $\mathfrak{p} \triangleleft R$  относно  $\mathfrak{p}$ . За простотата на  $(\mathfrak{q}_j)_{\mathfrak{p}} \triangleleft S_{\mathfrak{p}}$  да предположим, че  $\frac{s_1 s_2}{r_1 r_2} \in (\mathfrak{q}_j)_{\mathfrak{p}}$  с  $s_1, s_2 \in S$ ,  $r_1, r_2 \in R \setminus \mathfrak{p}$ . Тогава от  $s_1 s_2 \in \mathfrak{q}_j$  следва  $s_1 \in \mathfrak{q}_j$  или  $s_2 \in \mathfrak{q}_j$ . В резултат,  $\frac{s_1}{r_1} \in (\mathfrak{q}_j)_{\mathfrak{p}}$  или  $\frac{s_2}{r_2} \in (\mathfrak{q}_j)_{\mathfrak{p}}$  и идеалът  $(\mathfrak{q}_j)_{\mathfrak{p}} \triangleleft S_{\mathfrak{p}}$  е прост. Относно  $(\mathfrak{q}_j)_{\mathfrak{p}} \cap R_{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}_{\mathfrak{p}}$  забелязваме, че от  $\mathfrak{p} = \mathfrak{q}_j \cap R \subseteq \mathfrak{q}_j$  следва  $\mathfrak{p}_{\mathfrak{p}} \subseteq (\mathfrak{q}_j)_{\mathfrak{p}}$ . Включванията  $\mathfrak{p}_{\mathfrak{p}} \subseteq R_{\mathfrak{p}}$  и  $R_{\mathfrak{p}} \subseteq S_{\mathfrak{p}}$  дават  $\mathfrak{p}_{\mathfrak{p}} \subseteq S_{\mathfrak{p}}$ , а оттам и  $\mathfrak{p}_{\mathfrak{p}} \subseteq (\mathfrak{q}_j)_{\mathfrak{p}} \cap S_{\mathfrak{p}}$ . Обратно, ако  $\frac{s}{r_1} = \frac{r_2}{r_3} \in (\mathfrak{q}_j)_{\mathfrak{p}} \cap R_{\mathfrak{p}}$  с  $s \in \mathfrak{q}_j$ ,  $r_1, r_3 \in R \setminus \mathfrak{p}$ ,  $r_2 \in R$ , то  $x := sr_3 = r_1 r_2 \in \mathfrak{q}_j \cap R = \mathfrak{p}$ . В резултат,  $\frac{r_2}{r_3} = \frac{x}{r_1 r_3} \in \mathfrak{p}_{\mathfrak{p}}$  и  $(\mathfrak{q}_j)_{\mathfrak{p}} \cap R_{\mathfrak{p}} \subseteq \mathfrak{p}_{\mathfrak{p}}$ . Това доказва, че  $(\mathfrak{q}_1)_{\mathfrak{p}} \cap R_{\mathfrak{p}} = (\mathfrak{q}_2)_{\mathfrak{p}} \cap R_{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}_{\mathfrak{p}}$  за простите идеали  $(\mathfrak{q}_1)_{\mathfrak{p}}$ ,  $(\mathfrak{q}_2)_{\mathfrak{p}}$  в  $S_{\mathfrak{p}}$ .

Пръстенът  $R_{\mathfrak{p}}$  е локален с единствен максимален идеал  $\mathfrak{p}_{\mathfrak{p}}$ . Съгласно Лема 10.20, простите идеали  $(\mathfrak{q}_1)_{\mathfrak{p}} \subseteq (\mathfrak{q}_2)_{\mathfrak{p}}$  над  $\mathfrak{p}_{\mathfrak{p}}$  са максимални идеали в  $S_{\mathfrak{p}}$ , защото  $S_{\mathfrak{p}}$  е цял над  $R_{\mathfrak{p}}$ . Следователно  $(\mathfrak{q}_1)_{\mathfrak{p}} = (\mathfrak{q}_2)_{\mathfrak{p}}$  съвпадат. Сега за произволно  $s_2 \in \mathfrak{q}_2 \setminus \mathfrak{q}_1$  съществуват  $s_1 \in \mathfrak{q}_1$  и  $r \in R \setminus \mathfrak{p}$ , така че  $s_2 = \frac{s_1}{r}$ . Оттук,  $s_2 r = s_1 \in \mathfrak{q}_1$  за простия идеал  $\mathfrak{q}_1 \triangleleft S$  с  $s_2 \notin \mathfrak{q}_1$  и  $r \in R \setminus \mathfrak{p} \subseteq S \setminus \mathfrak{q}_1$  е противоречие, доказващо  $\mathfrak{p}_1 \subsetneq \mathfrak{p}_2$  за  $\mathfrak{q}_1 \subsetneq \mathfrak{q}_2$ , Q.E.D.

Ако  $S$  е комутативна област с единица,  $R$  подпръстен с единица на  $S$  и  $\mathfrak{p}$  е прост идеал в  $R$ , то локализацията  $S_{\mathfrak{p}} := (R \setminus \mathfrak{p})^{-1} S$  на  $S$  относно  $\mathfrak{p}$  не винаги е локален пръстен. Следващата задача дава геометричен пример за това.

**ЗАДАЧА 10.22.** *Нека  $k$  е алгебрично затворено поле,  $f \in k[x_1]$  е полином от нечетна степен,*

$$X = \{(x_1, x_2) \in k^2 \mid x_2^2 = f(x_1)\},$$

*$f(0) = a^2$  за някое  $a \in k^* = k \setminus \{0\}$ . Да се докаже, че:*

*(i)  $X$  е афинно многообразие;*

(ii) афинният координатен пръстен  $k[X]$  на  $X$  е цял над полиномиалния пръстен  $k[x_1]$ ;

(iii) подпръстенът

$$k[X]_{\langle x_1 \rangle} = \left\{ \frac{g(\overline{x_1}, \overline{x_2})}{t(\overline{x_1})} \mid g \in k[x_1, x_2], h \in k[x_1], h(0) \neq 0, \overline{x_i} = x_i + I(X) \right\}$$

на функционалното поле

$$k(X) = \left\{ \frac{g(\overline{x_1}, \overline{x_2})}{h(\overline{x_1}, \overline{x_2})} \mid g, h \in k[x_1, x_2], \overline{x_i} = x_i + I(X) \right\}$$

не е локален. По-точно, ако  $I_X((0, a)) \triangleleft k[X]$  и  $I_X((0, -a)) \triangleleft k[X]$  са максималните идеали на точките  $(0, a), (0, -a) \in X$ , то  $\mathfrak{M}_1 := (k[x_1] \setminus \langle x_1 \rangle)^{-1} I_X((0, a))$  и  $\mathfrak{M}_2 := (k[x_1] \setminus \langle x_1 \rangle)^{-1} I_X((0, -a))$  са различни максимални идеали в  $k[X]_{\langle x_1 \rangle}$ .

**Твърдение 10.23.** Нека комутативната област с единица  $S$  е цял над своя подпръстен с единица  $R$ , а  $\mathfrak{p}$  е прост идеал в  $R$ . Тогава съществува прост идеал  $\mathfrak{q} \triangleleft S$  над  $\mathfrak{q} \cap R = \mathfrak{p}$ .

**Доказателство:** Локализацията  $S_{\mathfrak{p}} = \left\{ \frac{s}{r} \mid s \in S, r \in R \setminus \mathfrak{p} \right\}$  на  $S$  относно  $\mathfrak{p}$  е цяла над локализацията  $R_{\mathfrak{p}} = \left\{ \frac{r_1}{r} \mid r_1 \in R, r \in R \setminus \mathfrak{p} \right\}$  на  $R$ , съгласно доказателството на Лема 10.21. Разглеждаме комутативната диаграма

$$\begin{array}{ccc} R & \longrightarrow & S \\ \downarrow \alpha & & \downarrow \beta \\ R_{\mathfrak{p}} & \longrightarrow & S_{\mathfrak{p}} \end{array}$$

от влаганя на области. Произволен максимален идеал  $\mathfrak{N} \triangleleft S_{\mathfrak{p}}$  лежи над максимален идеал  $\mathfrak{N} \cap R_{\mathfrak{p}} \triangleleft R_{\mathfrak{p}}$ , съгласно Лема 10.20. Пръстенът  $R_{\mathfrak{p}}$  е локален, така че

$$\mathfrak{N} \cap R_{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}_{\mathfrak{p}} = \left\{ \frac{r_1}{r} \mid r_1 \in \mathfrak{p}, r \in R \setminus \mathfrak{p} \right\}$$

съвпада с единствения максимален идеал  $\mathfrak{p}_{\mathfrak{p}}$  на  $R_{\mathfrak{p}}$ .

Твърдим, че  $\mathfrak{q} := \mathfrak{N} \cap S$  е прост идеал в  $S$ , защото фактор-пръстенът  $S/\mathfrak{q}$  е подпръстен на полето  $S_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{N}$ . Остава да проверим, че  $\mathfrak{q} \triangleleft S$  лежи над  $\mathfrak{q} \cap R = \mathfrak{p} \triangleleft R$ . Ако  $r \in \mathfrak{N} \cap R \subseteq \mathfrak{N} \cap R_{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}_{\mathfrak{p}}$ , то съществуват  $r_1 \in \mathfrak{p}$  и  $r_0 \in R \setminus \mathfrak{p}$ , така че  $r = \frac{r_1}{r_0}$ . В резултат,  $r_1 = rr_0 \in \mathfrak{p}$  с  $r_0 \notin \mathfrak{p}$  дава  $r \in \mathfrak{p}$  за простия идеал  $\mathfrak{p} \triangleleft R$ . Това доказва включването  $\mathfrak{N} \cap R \subseteq \mathfrak{p}$ . За обратното включване използваме, че  $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{p}_{\mathfrak{p}} = \mathfrak{N} \cap R_{\mathfrak{p}} \subseteq \mathfrak{N}$  и  $\mathfrak{p} \subseteq R$ . Това доказва  $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{N} \cap R$  и  $\mathfrak{p} = \mathfrak{N} \cap R = \mathfrak{q} \cap R$ , Q.E.D.

**Следствие 10.24.** Нека комутативната област с единица  $S$  е цяла над своя подпръстен с единица  $R$  и  $\mathfrak{p}_1 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{p}_m$  е редица от прости идеали в  $R$ . Тогава съществува редица от прости идеали  $\mathfrak{q}_1 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{q}_m$  в  $S$ , така че  $\mathfrak{q}_i \cap R = \mathfrak{p}_i$  за  $\forall 1 \leq i \leq m$ .

**Доказателство:** Твърдение 10.23 дава съществуването на прост идеал  $\mathfrak{q}_1 \triangleleft S$  над  $\mathfrak{q}_1 \cap R = \mathfrak{p}_1$ . В доказателството на Лема 10.20 проверихме, че комутативната област с единица  $S/\mathfrak{q}_1$  е цяла над комутативната област с единица  $R/\mathfrak{p}_1$ . Влагането на  $R/\mathfrak{p}_1$  в  $S/\mathfrak{q}_1$  е по правилото

$$R/\mathfrak{p}_1 \longrightarrow R + \mathfrak{q}_1/\mathfrak{q}_1,$$

$$r + \mathfrak{p}_1 \mapsto r + \mathfrak{q}_1 \quad \text{за } \forall r \in R.$$

Следователно съществува прост идеал  $\overline{\mathfrak{q}}_2 \triangleleft S/\mathfrak{q}_1$  над  $\overline{\mathfrak{q}}_2 \cap (R + \mathfrak{q}_1/\mathfrak{q}_1) = \mathfrak{p}_2 + \mathfrak{q}_1/\mathfrak{q}_1$ . Идеалът  $\overline{\mathfrak{q}}_2 = \mathfrak{q}_2/\mathfrak{q}_1$  е фактор на прост идеал  $\mathfrak{q}_2 \triangleleft S$ , съдържащ  $\mathfrak{q}_1$ . Твърдим, че

от  $(\mathfrak{q}_2/\mathfrak{q}_1) \cap (R + \mathfrak{q}_1/\mathfrak{q}_1) = \mathfrak{p}_2 + \mathfrak{q}_1/\mathfrak{q}_1$  следва  $\mathfrak{q}_2 \cap R = \mathfrak{p}_2$ . Наистина, за  $\forall x \in \mathfrak{p}_2$  имаме  $x + \mathfrak{q}_1 \in \mathfrak{p}_2 + \mathfrak{q}_1/\mathfrak{q}_1 \subseteq \mathfrak{q}_2/\mathfrak{q}_1$ , така че съществува  $y \in \mathfrak{q}_2$  с  $x + \mathfrak{q}_1 = y + \mathfrak{q}_1$ . От  $x - y \in \mathfrak{q}_1 \subseteq \mathfrak{q}_2$  и  $y \in \mathfrak{q}_2$  следва  $x \in \mathfrak{q}_2$  и  $\mathfrak{p}_2 \subseteq \mathfrak{q}_2 \cap R$ . Обратно,  $\forall r \in \mathfrak{q}_2 \cap R$  индуцира елемент  $r + \mathfrak{q}_1 \in (\mathfrak{q}_2/\mathfrak{q}_1) \cap (R + \mathfrak{q}_1/\mathfrak{q}_1) = \mathfrak{p}_2 + \mathfrak{q}_1/\mathfrak{q}_1$ . Следователно съществува  $r_o \in \mathfrak{p}_2$  с  $r + \mathfrak{q}_1 = r_o + \mathfrak{q}_1$ . Оттук  $r - r_o \in \mathfrak{q}_1 \cap R = \mathfrak{p}_1 \subseteq \mathfrak{p}_2$  и  $r \in \mathfrak{p}_2$ . Това доказва  $\mathfrak{q}_2 \cap R \subseteq \mathfrak{p}_2$  и  $\mathfrak{q}_2 \cap R = \mathfrak{p}_2$ . Простият идеал  $\mathfrak{q}_2 \triangleleft S$  съдържа строго простия идеал  $\mathfrak{q}_1 \triangleleft S$ , защото от  $\mathfrak{q}_1 = \mathfrak{q}_2$  следва  $\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{q}_1 \cap R = \mathfrak{q}_2 \cap R = \mathfrak{p}_2$ . Продължавайки по същия начин повдигаме строго растящата редица  $\mathfrak{p}_1 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{p}_m$  от прости идеали в  $R$  до строго растяща редица  $\mathfrak{q}_1 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{q}_m$  от прости идеали в  $S$  с  $\mathfrak{q}_i \cap R = \mathfrak{p}_i$  за  $\forall 1 \leq i \leq m$ , Q.E.D.

### 7. Топологична размерност. Размерност на Krull.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10.25.** *Размерността на неприводимо топологично пространство  $X$  е супремумът на неотрицателните цели  $n$ , за които съществува строго растяща редица*

$$\emptyset \neq Z_0 \subsetneq Z_1 \subsetneq \dots \subsetneq Z_n = X$$

от непразни, неприводими, затворени подмножества  $Z_i \subseteq X$ .

Ако топологичното пространство  $X = \cup_{\alpha \in A} X_\alpha$  е обединение на неприводими подпространства  $X_\alpha$ , то размерността на  $X$  е супремумът

$$\dim(X) = \sup_{\alpha \in A} \dim(X_\alpha)$$

на размерностите на неприводимите компоненти  $\alpha$ .

Размерността на афинно или проективно алгебрично множество  $X$  относно топологията на Зариски се нарича топологична размерност на  $X$  и се бележи с  $\dim_{Zar}(X)$ . Ще докажем, че над алгебрично затворено поле  $k$ , размерността  $\dim(X) = \text{tr deg}_k(k(X))$  на афинно или проективно многообразие  $X$  съвпада с топологичната размерност  $\dim_{Zar}(X)$ .

Твърдим, че всяко афинно или проективно многообразие  $X$  има топологична размерност  $\tau = \dim_{Zar}(X) \leq \dim(X) = d$  и съществува строго растяща редица

$$\emptyset \neq Z_0 \subsetneq Z_1 \subsetneq \dots \subsetneq Z_\tau = X$$

от непразни, неприводими, Зариски затворени подмножества с дължина  $\tau + 1$ . По-точно, по Твърдение 10.3, всяка строго растяща редица

$$\emptyset \neq Z_0 \subsetneq Z_1 \subsetneq \dots \subsetneq Z_m = X \tag{10.4}$$

от непразни, неприводими, Зариски затворени подмножества  $Z_i \subseteq X$  има строго растяща редица от размерности

$$0 \leq \dim(Z_0) < \dim(Z_1) < \dots < \dim(Z_{m-1}) < \dim(X).$$

Сега от  $\dim(Z_i) \in \{0, 1, \dots, d\}$  за  $\forall 0 \leq i \leq m$  следва  $m + 1 \leq d + 1$  и  $d \geq \tau = \dim_{Zar}(X)$ . Ако допуснем, че не съществува строго растяща редица (10.4) с  $m + 1 = \tau + 1$  члена, то всички редици от вида (10.4) са с дължина  $\leq \tau$  и  $\dim_{Zar}(X) \leq \tau - 1$ , противно на избора на  $\tau = \dim_{Zar}(X)$ . Следователно съществува редица (10.4) с  $\tau + 1$  члена. Всяка такава редица е неуплътняема и в нея  $Z_0$  е точка.

Размерността на афинно или проективно алгебрично множество  $X$  относно топологията на Зариски е крайна, защото  $X = X_1 \cup \dots \cup X_l$  е обединение на краен брой неприводими компоненти  $X_i$  с крайни топологични размерности  $\dim_{Zar}(X_i) \in \mathbb{Z}^{\geq 0}$ .

За да докажем равенството  $\dim(X) = \dim_{Zar}(X)$  ще преминем към афинно Зариски отворено подмножество  $X_o \subseteq X$ , за да сравним  $\dim(X_o)$  и  $\dim_{Zar}(X_o)$  с размерността на Krull на афинния координатен пръстен  $k[X_o]$  на  $X_o$ .



**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10.26.** *Размерността на Krull  $\dim_{Krull}(R)$  на комутативен пръстен с единица  $R$  е супремумът на неотрицателните цели числа  $n$ , за които съществува строго растяща редица*

$$\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{p}_m \quad (10.5)$$

от прости идеали  $\mathfrak{p}_i \triangleleft R$ .

**ЛЕМА 10.27.** *Ако  $X \subseteq k^n$  е афинно многообразие над алгебрично затворено поле  $k$ , то топологичната размерност*

$$\dim_{Zar}(X) = \dim_{Krull}(k[X])$$

на  $X$  съвпада с размерността на Krull на афинния координатен пръстен  $k[X]$  на  $X$ . В частност,  $k[X]$  има крайна размерност на Krull.

**Доказателство:** Да означим  $\tau = \dim_{Zar}(X)$ ,  $\kappa = \dim_{Krull}(k[X])$  и да разгледаме някаква строго растяща редица

$$\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{p}_m \quad (10.6)$$

от прости идеали в афинния координатен пръстен  $k[X] = k[x_1, \dots, x_n]/I(X)$ . Всеки идеал  $\mathfrak{p}_i = \mathfrak{q}_i/I(X)$  в  $k[X]$  се повдига до идеал  $\mathfrak{q}_i \triangleleft k[x_1, \dots, x_n]$ , съдържащ идеала  $I(X) \triangleleft k[x_1, \dots, x_n]$  на  $X$ . Идеалите  $\mathfrak{q}_i \triangleleft k[x_1, \dots, x_n]$  са прости, защото фактор-пръстените

$$k[X]/\mathfrak{p}_i = \{k[x_1, \dots, x_n]/I(X)\}/\{\mathfrak{q}_i/I(X)\} \simeq k[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{q}_i$$

са изоморфни. Афинните алгебрични множества  $Y_i := Z(\mathfrak{q}_i)$ , определени от  $\mathfrak{q}_i$  имат идеали  $I(Y_i) = IZ(\mathfrak{q}_i) = r(\mathfrak{q}_i) = \mathfrak{q}_i$  и са неприводими.

Твърдим, че простите полиномиални идеали  $\mathfrak{q}_i$  образуват строго растяща редица

$$I(X) \subseteq \mathfrak{q}_0 \subsetneq \mathfrak{q}_1 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{q}_m.$$

По-точно, от включванията  $\mathfrak{q}_i/I(X) = \mathfrak{p}_i \subsetneq \mathfrak{p}_{i+1} = \mathfrak{q}_{i+1}/I(X)$  получаваме, че за всеки елемент  $s_i \in \mathfrak{q}_i$  съществува  $s_{i+1} \in \mathfrak{q}_{i+1}$ , така че  $s_i + I(X) = s_{i+1} + I(X)$ . Това е в сила точно когато можем да намерим  $\alpha \in I(X) \subset \mathfrak{q}_{i+1}$ , така че  $s_i = s_{i+1} + \alpha \in \mathfrak{q}_{i+1}$ . С това проверихме, че  $\mathfrak{q}_i \subseteq \mathfrak{q}_{i+1}$ . Допускането  $\mathfrak{q}_i = \mathfrak{q}_{i+1}$  води до съвпадение на факторите  $\mathfrak{p}_i = \mathfrak{q}_i/I(X) = \mathfrak{q}_{i+1}/I(X) = \mathfrak{p}_{i+1}$ .

Да отбележим, че афинните многообразия  $Y_i := Z(\mathfrak{q}_i)$  образуват строго намаляваща редица

$$X \supseteq X \cap Y_0 \supseteq X \cap Y_1 \supseteq \dots \supseteq X \cap Y_m \neq \emptyset \quad (10.7)$$

от непразни, неприводими, относително затворени подмножества на  $X$ . За целта да напомним, че от включванията  $\mathfrak{q}_i \subset \mathfrak{q}_{i+1}$  следват обратните включвания  $Y_i = Z(\mathfrak{q}_i) \supset Z(\mathfrak{q}_{i+1}) = Y_{i+1}$  на съответните афинни многообразия. Допускането  $Y_i = Y_{i+1}$  води до съвпадение на идеалите  $\mathfrak{q}_i = r(\mathfrak{q}_i) = IZ(\mathfrak{q}_i) = I(Y_i) = I(Y_{i+1}) = IZ(\mathfrak{q}_{i+1}) = r(\mathfrak{q}_{i+1}) = \mathfrak{q}_{i+1}$ , което е противоречие, доказващо строгостта на включванията в (10.7). От наличието на строго намаляващата редица (10.7) от непразни, неприводими Зариски затворени подмножества на  $X$  следва, че  $m \leq \tau$ . Твърдим, че  $\kappa \leq \tau$ . В противен случай, супремумът на неотрицателните цели  $m$ , за които съществува (10.6) не надминава  $\tau$  и е строго по-малък от  $\kappa$ . При това, съществува строго растяща редица

$$\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{p}_\kappa \quad (10.8)$$

от  $\kappa + 1$  прости идеала в  $k[X]$ , защото в противен случай, супремумът на  $m \in \mathbb{Z}^{\geq 0}$ , за които съществува (10.6) не надминава  $\kappa - 1$ . Редицата (10.8) е неуплътняема.

Нека

$$\emptyset \neq Z_0 \subsetneq Z_1 \subsetneq \dots \subsetneq Z_m = X \quad (10.9)$$

е строго растяща редица от непразни, неприводими, Зариски затворени подмножества на  $X$ . Полиномиалните идеали на тези подмножества образуват строго намаляваща редица

$$I(Z_0) \supseteq I(Z_1) \supseteq \dots \supseteq I(Z_{m-1}) \supseteq I(Z_m) = I(X)$$

от прости идеали, съдържащи  $I(X)$ . Тук използваме, че от  $Z_i \subset Z_{i+1}$  следва  $I(Z_i) \supseteq I(Z_{i+1})$ . Ако предположим, че  $I(Z_i) = I(Z_{i+1})$ , то  $Z_i = ZI(Z_i) = ZI(Z_{i+1})$ , съгласно затвореността на  $Z_j$ . Факторите

$$I(Z_0)/I(X) \supseteq I(Z_1)/I(X) \supseteq \dots \supseteq I(Z_{m-1})/I(X) \supseteq \{0\}$$

образуват строго намаляваща редица от прости идеали в афинния координатен пръстен  $k[X]$  на  $X$ , така че  $m \leq \kappa$ . По-точно, идеалите  $I(Z_i)/I(X) \triangleleft k[X]$  са прости, защото факторите им  $k[X]/\{I(Z_i)/I(X)\} \simeq k[x_1, \dots, x_n]/I(Z_i)$  са области на цялост. Да допуснем, че  $I(Z_i)/I(X) = I(Z_{i+1})/I(X)$  и да изберем елемент  $s_i \in I(Z_i) \setminus I(Z_{i+1})$ . Тогава съществува  $s_{i+1} \in I(Z_{i+1})$ , така че  $s_i + I(X) = s_{i+1} + I(X)$ . В резултат, можем да намерим  $\alpha \in I(X) \subseteq I(Z_{i+1})$ , така че  $s_i = s_{i+1} + \alpha \in I(Z_{i+1})$ , противно на избора на  $s_i \notin I(Z_{i+1})$ . Това доказва строгостта на включванията  $I(Z_i)/I(X) \supseteq I(Z_{i+1})/I(X)$ . От неравенството  $m \leq \kappa$  следва неравенството  $\tau \leq \kappa$  и  $\tau = \kappa$ , защото супремумът  $\tau$  на  $m \in \mathbb{Z}^{\geq 0}$ , за които съществува (10.9) не надминава горната граница  $\kappa$  на тези  $m$ , Q.E.D. Нека  $R$  е комутативен пръстен с единица и размерност на Krull  $\kappa$ . Тогава във всяка неуплътняема строго растяща редица

$$\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{p}_\kappa$$

от  $\kappa + 1$  прости идеали, последният идеал  $\mathfrak{p}_\kappa$  е максимален. Още повече, ако  $R$  е комутативна област с единица, то първият идеал  $\mathfrak{p}_0 = \{0\}$  е нулевият.

**ЛЕМА 10.28.** *Нека  $X \subseteq k^n$  е афинно многообразие над алгебрично затворено поле  $k$ . Тогава размерността*

$$\dim(X) = \dim_{\text{Krull}}(k[X])$$

*на  $X$  съвпада с размерността на Krull на  $k[X]$ .*

**Доказателство:** Нека  $\dim X = \text{trdeg}_k k(X) = d$ . Съгласно Следствие 10.16 от Лемата на Noether за нормализация, съществува краен доминантен морфизъм

$$\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_d) : X \longrightarrow k^d,$$

зададен от полиноми  $\varphi_1, \dots, \varphi_d \in k[x_1, \dots, x_n]$ . Функционалното поле  $k(k^d) = k(x_1, \dots, x_d)$  на афинното пространство  $k^d$  е чисто трансцендентно разширение на  $k$  от степен  $d$ . Достатъчно е да докажем, че

$$\dim_{\text{Krull}}(k[X]) = \dim_{\text{Krull}}(k[x_1, \dots, x_d]) = d,$$

за да установим верността на лемата.

За целта да отбележим, че идеалите  $\mathfrak{p}_i = \langle x_1, \dots, x_i \rangle \triangleleft k[x_1, \dots, x_d]$  са прости за  $\forall 1 \leq i \leq d$ , защото съответните им афинни алгебрични подмножества  $V(\mathfrak{p}_i) = k^{d-i}$  в  $k^d$  са неприводими. Твърдим, че строго растящата редица

$$\{0\} = \mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 = \langle x_1 \rangle \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{p}_d = \langle x_1, \dots, x_d \rangle \subsetneq k[x_1, \dots, x_d] \quad (10.10)$$

от  $d + 1$  прости идеала в полиномиалния пръстен  $k[x_1, \dots, x_d]$  е неуплътняема и  $\dim_{\text{Krull}}(k[x_1, \dots, x_d]) = d$ . В противен случай съществува прост идеал  $\mathfrak{p} \triangleleft k[x_1, \dots, x_d]$ , така че  $\mathfrak{p}_i \subsetneq \mathfrak{p} \subsetneq \mathfrak{p}_{i+1}$  за някое  $0 \leq i \leq d - 1$ . Съответните афинни алгебрични подмножества в  $k^d$  изпълняват строгите включения

$$Z(\mathfrak{p}_{i+1}) = k^{d-i-1} \subsetneq Z(\mathfrak{p}) \subsetneq Z(\mathfrak{p}_i) = k^{d-i}.$$

По Твърдение 10.3, размерностите на тези многообразия образуват строго растяща редица  $d - i - 1 < \dim Z(\mathfrak{p}) < d - i$ . Това противоречи на  $\dim(Z(\mathfrak{p})) \in \mathbb{Z}^{\geq 0}$

и доказва неуплътняемостта на редицата от прости идеали (10.10), а оттам и равенството  $\dim_{Krull}(k[x_1, \dots, x_d]) = d$ .

За  $\dim_{Krull}(k[X]) = \dim_{Krull}(k[x_1, \dots, x_d])$  да отбележим, че комутативната област с единица  $k[X]$  е цяла над своя подпръстен с единица  $k[x_1, \dots, x_d]$ , съгласно доказателството на Следствие 10.16. Неуплътняемата строго растяща редица (10.10) от прости идеали в  $k[x_1, \dots, x_d]$  се повдига до строго растяща редица

$$\{0\} = \mathfrak{q}_0 \subsetneq \mathfrak{q}_1 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{q}_d$$

от прости идеали в  $k[X]$  с  $\mathfrak{q}_i \cap k[x_1, \dots, x_d] = \mathfrak{p}_i$ . Следователно  $d \leq \tau = \dim_{Krull}(k[X])$ . Вече споменахме, че  $\tau = \dim_{Krull}(k[X]) \leq \dim(X) = d$ . В резултат,  $\dim_{Krull}(k[X]) = \tau = d$ , Q.E.D.

**ТЕОРЕМА 12.** *Ако  $X$  е афинно или проективно многообразие над алгебрично затворено поле  $k$ , то размерността*

$$\dim(X) = \dim_{Zar}(X)$$

*на  $X$  съвпада с топологичната размерност  $\dim_{Zar}(X)$  на  $X$ .*

**Доказателство:** Достатъчно е да докажем теоремата за афинно многообразие. По-точно, произволно проективно многообразие  $X \subseteq \mathbb{P}^n(k)$  има афинно отворено подмножество  $X \cap U_i$  със същото функционално поле  $k(X \cap U_i) = k(X)$ , което е афинно многообразие в  $U_i \simeq k^n$ . Оттук  $\dim(X) = \dim(X \cap U_i)$ . Твърдим, че топологичните размерности  $\dim_{Zar}(X) = \dim_{Zar}(X \cap U_i)$  съвпадат. Означаваме  $\tau = \dim_{Zar}(X)$ ,  $\tau_o = \dim_{Zar}(X \cap U_i)$ . Съгласно Твърдение 5.32(i), всяка строго растяща редица

$$\emptyset \neq W_0 \subsetneq W_1 \subsetneq \dots \subsetneq W_{\tau_o} = X \cap U_i$$

от непразни, неприводими, относително затворени подмножества  $W_j \subseteq X \cap U_i$  индуцира строго растяща редица

$$\emptyset \neq \overline{W_0} \subsetneq \overline{W_1} \subsetneq \dots \subsetneq \overline{W_{\tau_o}} = X$$

от подмногообразия на  $X$ , така че  $\tau_o \leq \tau$ . По Твърдение 5.32(ii), всяка строго растяща редица

$$\emptyset \neq Z_0 \subsetneq Z_1 \subsetneq \dots \subsetneq Z_\tau = X$$

от непразни, неприводими, Зариски затворени подмножества на  $X$  пресича някакво стандартно афинно отворено подмножество  $U_i$ , т.е. съществува  $U_i \subseteq \mathbb{P}^n(k)$  с  $Z_0 \cap U_i \neq \emptyset$ . Тогава

$$\emptyset \neq Z_0 \cap U_i \subsetneq Z_1 \cap U_i \subsetneq \dots \subsetneq Z_\tau \cap U_i = X \cap U_i$$

е строго растяща редица от подмногообразия на  $X \cap U_i$ , така че  $\tau \leq \tau_o$ . Следователно  $\tau = \tau_o$ , т.е.  $\dim_{Zar}(X) = \dim_{Zar}(X \cap U_i)$ .

За афинно многообразие  $X \cap U_i \subseteq U_i \simeq k^n$  над алгебрично затворено поле  $k$  знаем, че

$$\dim_{Zar}(X \cap U_i) = \dim_{Krull}(k[X \cap U_i])$$

по Лема 10.27 и

$$\dim_{Krull}(k[X]) = \dim(X \cap U_i)$$

по Лема 10.28. Следователно

$$\dim_{Zar}(X \cap U_i) = \dim(X \cap U_i),$$

откъдето  $\dim_{Zar}(X) = \dim_{Zar}(X \cap U_i) = \dim(X \cap U_i) = \dim(X)$ , Q.E.D.

**ЗАДАЧА 10.29.** *Нека  $k$  е алгебрично затворено поле,  $X \subseteq k^n$  е афинно многообразие,  $Y \subseteq X$  е подмногообразие. Да се докаже, че локалният пръстен  $\mathcal{O}_Y(X)$  на  $Y$  в  $X$  има размерност на Krull  $\dim_{Krull} \mathcal{O}_Y(X) \geq \dim(X) - \dim(Y)$ .*

**Упътване:** Да означим  $d = \dim(Y)$ ,  $d + k = \dim(X)$ . Тогава  $\dim_{Krull} k[Y] = d$  и съществува неуплътняема строго растяща редица от  $d + 1$  прости идеала

$$\mathfrak{q}_0 = I(Y) \subsetneq \mathfrak{q}_1 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{q}_d \subsetneq k[x_1, \dots, x_n],$$

съдържащи полиномиалния идеал  $I(Y)$  на  $Y$ . От  $Y \subseteq X$  следва  $I(X) \subseteq I(Y)$ . Нека

$$I(X) = \mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{p}_m = I(Y)$$

е неуплътняема строго растяща редица от прости идеали, съдържащи  $I(X)$  и съдържащи се в  $I(Y)$ . Тогава

$$I(X) = \mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{p}_m = I(Y) = \mathfrak{q}_0 \subsetneq \mathfrak{q}_1 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{q}_d \subsetneq k[x_1, \dots, x_n]$$

е неуплътняема строго растяща редица от прости идеали в  $k[x_1, \dots, x_n]$ , съдържащи  $I(X)$ . Съгласно  $\dim_{Krull} k[X] = \dim(X) = d + k$ , в тази редица участват точно  $m + 1 + d = d + k + 1$  идеала. Следователно  $m = k$ .

Ако  $I(X) \subsetneq \mathfrak{p} \subseteq I(Y)$  е прост идеал в  $k[x_1, \dots, x_n]$ , съдържащ строго  $I(X)$  и съдържащ се в  $I(Y)$ , то локализацията

$$J = (\mathfrak{p}/I(X))_{I_X(Y)} = (k[X] \setminus I_X(Y))^{-1}(\mathfrak{p}/I(X))$$

на фактора  $\mathfrak{p}/I(X)$  е прост идеал в  $k[X]_{I_X(Y)} = \mathcal{O}_Y(X)$ . По-точно, ако  $r_1, r_2 \in k[X]$ ,  $s_1, s_2 \in k[X] \setminus I_X(Y)$  и  $\frac{r_1 r_2}{s_1 s_2} \in J$ , то съществуват елементи  $r \in \mathfrak{p}/I(X)$  и  $s \in k[X] \setminus I_X(Y)$  с  $\frac{r_1 r_2}{s_1 s_2} = \frac{r}{s}$ . Оттук  $r_1 r_2 s = r s_1 s_2 \in \mathfrak{p}/I(X)$  за простия идеал  $\mathfrak{p}/I(X) \triangleleft k[X]$ . Ако допуснем, че  $s \in \mathfrak{p}/I(X)$ , то  $s \in I(Y)/I(X) = I_X(Y)$ , противно на избора на  $s$ . Следователно  $r_1 r_2 \in \mathfrak{p}/I(X)$ , откъдето  $r_1 \in \mathfrak{p}/I(X)$  или  $r_2 \in \mathfrak{p}/I(X)$ . С това установихме, че  $J$  е прост идеал в  $\mathcal{O}_Y(X)$ .

Може да се докаже, че всеки идеал в локализацията  $k[X]_{I_X(Y)}$  на  $k[X]$  по простия идеал  $I_X(Y)$  е локализация на прост идеал в  $k[X]$ , съдържащ се в  $I_X(Y)$ . Оттук следва, че  $\dim_{Krull}(\mathcal{O}_Y(X)) = \dim(X) - \dim(Y)$ .

**ЗАДАЧА 10.30.** Нека  $k$  е алгебрично затворено поле,  $k[a_1, \dots, a_n]$  е крайно породена  $k$ -алгебра без делители на нулата с размерност на Krull

$$\dim_{Krull}(k[a_1, \dots, a_n]) = d,$$

а  $\mathfrak{M} \triangleleft k[a_1, \dots, a_n]$  е максимален идеал в  $k[a_1, \dots, a_n]$ . Да се докаже, че съществува строго растяща редица

$$0 \subsetneq \mathfrak{q}_1 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{q}_{d-1} \subsetneq \mathfrak{q}_d = \mathfrak{M}$$

от прости идеали  $\mathfrak{q}_i \triangleleft k[a_1, \dots, a_n]$  с  $\mathfrak{q}_d = \mathfrak{M}$ .

**Упътване:** По Лемата на Noether за нормализация, съществува базис на трансцендентност  $b_1, \dots, b_d \in k[a_1, \dots, a_n]$  на полето от частни

$$k(a_1, \dots, a_n) = F(k[b_1, \dots, b_d])$$

на областта  $k[a_1, \dots, a_n]$ , така че  $k[a_1, \dots, a_n]$  е цял над полиномиалния пръстен  $k[b_1, \dots, b_d] \simeq k[x_1, \dots, x_d]$ . Идеалът  $\mathfrak{N} := \mathfrak{M} \cap k[b_1, \dots, b_d]$  е максимален. По-точно, фактор-пръстенът  $k[b_1, \dots, b_d]/\mathfrak{N}$  е подръстен на полето

$$k[a_1, \dots, a_n]/\mathfrak{M} \simeq k.$$

Но  $k \simeq k + \mathfrak{N}/\mathfrak{N}$  е подръстен на  $k[b_1, \dots, b_d]/\mathfrak{N}$ , така че  $k[b_1, \dots, b_d]/\mathfrak{N} = k$  и  $\mathfrak{N} \triangleleft k[b_1, \dots, b_d]$  е максимален идеал. Нека  $\mathfrak{N} = \langle b_1 - s_1, \dots, b_d - s_d \rangle_{k[b_1, \dots, b_d]}$  се поражда от  $b_i - s_i$  за някакви  $s_i \in k$ ,  $1 \leq i \leq d$ . Тогава

$$\mathfrak{p}_i := \langle b_1 - s_1, \dots, b_i - s_i \rangle_{k[b_1, \dots, b_d]} \quad \text{за } \forall 1 \leq i \leq d$$

образуват строго растяща редица

$$0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{p}_{d-1} \subsetneq \mathfrak{p}_d = \mathfrak{N} = \mathfrak{M} \cap k[b_1, \dots, b_d]$$

от прости идеали в  $k[b_1, \dots, b_d]$ . Разгледайте редицата

$$0 \subsetneq \mathfrak{q}_1 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{q}_{d-1} \subsetneq \mathfrak{q}_d = \mathfrak{M}$$

от повдигания на  $\mathfrak{p}_i \triangleleft k[x_1, \dots, x_d]$  до прости идеали  $\mathfrak{q}_i \triangleleft k[a_1, \dots, a_n]$ .

**ЗАДАЧА 10.31.** Нека  $k$  е алгебрично затворено поле, а  $X \subseteq k^n$  е  $d$ -мерно афинно многообразие над  $k$ . Да се докаже, че всяка точка  $a \in X$  се съдържа в строго растяща редица

$$\{a\} \subsetneq Z_1 \subsetneq \dots \subsetneq Z_{d-1} \subsetneq Z_d = X$$

от подмногообразия  $Z_i \subseteq X$  с размерност  $\dim(Z_i) = i$  за  $1 \leq i \leq d-1$ .

**ЗАДАЧА 10.32.** Нека  $k$  е поле,  $k[a_1, \dots, a_n]$  е крайно породена  $k$ -алгебра без делители на нулата с размерност *на Krull*  $\dim_{\text{Krull}}(k[a_1, \dots, a_n]) = d$ , а  $\mathfrak{q}_1$  е минимален ненулев прост идеал в  $k[a_1, \dots, a_n]$ , т.е. не съществува прост идеал  $0 \subsetneq \mathfrak{q} \subsetneq \mathfrak{q}_1$  в  $k[a_1, \dots, a_n]$ . Да се докаже, че  $\mathfrak{q}_1$  се влага в строго растяща редица

$$0 \subsetneq \mathfrak{q}_1 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{q}_d \triangleleft k[a_1, \dots, a_n]$$

от прости идеали  $\mathfrak{q}_i \triangleleft k[a_1, \dots, a_n]$ .

**Упътване:** Ако  $\mathfrak{q}_1 \subsetneq \mathfrak{q}_2 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{q}_s \triangleleft k[a_1, \dots, a_n]$  е неуплътняема строго растяща редица от прости идеали в  $k[a_1, \dots, a_n]$ , то

$$0 \subsetneq \mathfrak{q}_1 \subsetneq \mathfrak{q}_2 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{q}_s \triangleleft k[a_1, \dots, a_n]$$

е неуплътняема строго растяща редица от прости идеали в  $k[a_1, \dots, a_n]$ .

**ЗАДАЧА 10.33.** Нека  $k$  е алгебрично затворено поле,  $X \subseteq k^n$  е афинно многообразие с размерност  $\dim(X) = d$ , а  $Y \subsetneq X$  е максимално собствено подмногообразие. Да се докаже, че  $\dim(Y) = d-1$  и съществува строго растяща редица

$$\emptyset \neq Z_0 \subsetneq Z_1 \subsetneq \dots \subsetneq Z_{d-1} = Y \subsetneq X$$

от подмногообразия  $Z_i \subseteq Y$  с размерност  $\dim(Z_i) = i$ .

**ЗАДАЧА 10.34.** Нека  $k$  е поле, а  $k[a_1, \dots, a_n]$  е крайно породена  $k$ -алгебра без делители на нулата с размерност *на Krull*  $\dim_{\text{Krull}}(k[a_1, \dots, a_n]) = 1$ . Да се докаже, че:

(i) за произволен полином  $f \in k[a_1, \dots, a_n]$ , пръстенът  $k[a_1, \dots, a_n]$  а  $k[f]$ -модул;

(ii) съществува полином  $f \in k[a_1, \dots, a_n]$ , така че  $k[a_1, \dots, a_n]$  е крайно породен  $k[f]$ -модул.