

Тема 4

Държавен изпит



специалност

Приложна математика

Граница, непрекъснатост, производна и примитивна на
функция на една променлива. Геометрични
интерпретации.

АНОТАЦИЯ

Граница, непрекъснатост, производна и примитивна на функция на една променлива. Геометрични интерпретации.

1. Дефиниции на Хайне и Коши за *граница на функция* (в крайна точка и в безкрайността); доказателство на еквивалентността на двете дефиниции. Да се дефинира *непрекъснатост* на функция в дадена точка от дефиниционната област чрез дефинициите на Хайне и Коши.

2. Дефиниция на *производна* на функция в дадена точка като граница на *диференчните частни*. Да се обясни физичната интерпретация на производната (моментна скорост) и геометричната ѝ интерпретация (ъглов коефициент на *допирателната* към графиката на функцията в съответната точка, при което допирателната права се въвежда като гранично положение на *секущите* прави).

3. Формули (с доказателствата им) за производна на сума, произведение, частно и *суперпозиция (съставна функция)* на две диференцируеми функции. Намиране на производните на някои елементарни функции (*степенна функция, показателна функция, основни тригонометрични функции*). От формулата за производна на съставна функция се извежда (формално) формулата за производна на *обратна функция* и се прилага за намиране на производните на функциите *логаритъм* и *аркуссинус*).

4. Дефиниция на *примитивна* на дадена функция и доказателство, че ако дефиниционната област на една функция е интервал, то разликата между всеки две нейни примитивни е константа.

Тема 4

Преди да дефинираме понятието граница на функция, да припомним някои понятия.

Дефиниция 1.1 (редица от реални числа)

Казваме, че е зададена редица от R ако на всяко естествено $n \in N$ е съпоставено реално $a_n \in R$.

Дефиниция 1.2 (граница на редица)

Казваме, че редицата $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ от реални числа е сходяща и клони към числото $a \in R$

ако за всяко $\epsilon > 0$ съществува такова $v \in N$, че за всяко $n > v$ да е изпълнено

$$|a_n - a| < \epsilon.$$

Записано иначе,

$$\forall \epsilon > 0 \exists v \in N: n > v \rightarrow |a_n - a| < \epsilon$$

Дефиниция 1.3 (точка на съгъстяване за множество $M \subset R$)

Казваме, че x_0 е точка на съгъстяване за множеството M ако във всяка околност на x_0 има поне един елемент от M , различен от x_0 .

Дефиниция 1.4 (дефиниция на Хайне за граница на функция)

Казваме, че реалнозначната функция $f(x)$ клони към числото a при x клонящо към x_0 (тук x_0 е точка на съгъстяване за дефиниционното множество D_f на f), ако за всяка редица

$$x_n \rightarrow x_0, x_n \in D_f \text{ имаме } f(x_n) \rightarrow a, \text{ в смисъл на дефиниция 1.2.}$$

Дефиниция 1.5 (дефиниция на Коши за граница на функция)

Казваме, че реалнозначната функция $f(x)$ клони към числото a при x клонящо към x_0 (тук x_0 е точка на съгъстяване за дефиниционното множество D_f на f) ако за всяко $\epsilon > 0$ може

да се намери $\delta > 0$,

$$\text{че } x \in D_f \wedge |x - x_0| < \delta \rightarrow |f(x) - a| < \epsilon$$

Теорема 1.1.

Дефинициите на Хайне и Коши за граница на функция са еквивалентни.

Доказателство:

(\Rightarrow) Нека $f(x) \rightarrow a$ спрямо дефиницията на Хайне. Допускаме, че не е вярно, че $f(x) \rightarrow a$ спрямо дефиницията на Коши. Тогава съществува

$$\epsilon_0 > 0: \forall \delta > 0 \exists x_\delta \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \wedge x_\delta \neq x_0 \wedge |f(x_\delta) - a| \geq \epsilon_0$$

Тема 4

Нека последователно вземаме $\delta = \frac{1}{n}$ и да означим $X_\delta = X_1 \subset X_n$. Получихме редица

$\{X_n\}_{n=1}^\infty$, такава, че $X_n \neq X_0$ & $|X_n - X_0| < \delta$ & $\exists f(x_n) - a \forall \geq \epsilon_0$. Но тази редица е сходяща към x_0 и следователно е нарушена дефиницията на Хайне.

(\Leftarrow) Нека $f(x) \rightarrow a$ спрямо дефиницията на Коши. Нека $X_n \rightarrow X$ $_{x_n \neq x_0, x_n \in D_f}^0$. Искаме да

докажем, че редицата $f(X_n) \rightarrow a$. Нека $\epsilon > 0$. От дефиницията на Коши избираме

$\delta > 0$, че $x \in D_f \wedge |x - x_0| < \delta$ и $|f(x) - a| < \epsilon$. Но от това, че $X_n \rightarrow X$ $_{x_n \neq x_0, x_n \in D_f}^0$

имаме, че има такова $\forall \epsilon \in \mathbb{N}$, че за всяко $n > \epsilon$ да е изпълнено $|X_n - X_0| < \delta$. Така

доказахме, че от $X_n \rightarrow X$ $_{x_n \neq x_0, x_n \in D_f}^0$ следва $f(X_n) \rightarrow a$.

Дефиниция 1.6 (непрекъснатост на функция в точка по Хайне)

Казваме, че $f(x)$ е непрекъсната в точката си на съгъстяване x_0 ако за всяка редица

$X_n \rightarrow X$ $_{x_n \neq x_0, x_n \in D_f}^0$ редицата $\{f(X_n)\}_{n=1}^\infty$ е сходяща и границата ѝ е $f(x_0)$.

Дефиниция 1.7 (непрекъснатост на функция в точка по Хайне)

Казваме, че $f(x)$ е непрекъсната в точката си на съгъстяване x_0 ако за всяко $\epsilon > 0$ може да

се намери $\delta > 0$, че $x \in D_f \wedge |x - x_0| < \delta \rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \epsilon$

Да отбележим, че може да имаме само „лява“ или само „дясна“ непрекъснатост. Това е по-слаб случай, когато разглеждаме клонящи редици от x към x_0 съответно само от ляво или само от дясно

($x < x_0$ / $x > x_0$). От тази гледна точка можем да дефинираме непрекъснатост в точка по нов начин: една функция е непрекъсната в точка x_0 ако е непрекъсната в точката от ляво и от дясно.

2.

Дефиниция 2.1 (производна)

Казваме, че функцията $f(x)$ има *производна* в точка x_0 – точка на съгъстяване за D_f , ако

диференчното частно $\frac{f(x) - f(x_n)}{x - x_n}$ има граница при $x \rightarrow x_0$. Когато тази граница

Тема 4

съществува, ще я наричаме *производна* на f в x_0 . Бележим по няколко начина :


$$f'(x_0), \frac{d}{dx} f|_{x=x_0}$$

Физичен смисъл на производната: Нека разгледаме някоя физична величина f , зависеща от времето (най- често се взема изминатото разстояние от материална точка – път). *Средна*

скорост на изменение на f в интервала $[t_0, t_1]$ се нарича $\frac{f(t_1) - f(t_0)}{t_1 - t_0}$. *Моментна скорост*

на величината f в момента t_0 наричаме стойността на средната скорост за t_1 произволно близко до t_0 . Оказва се, че именно това е производната на f в точката x_0 . В случая на $f=S(t)$ – изминат път, $S'(t)=V(t)$ е скоростта на движение. $V'(t)=A(t)$ пък е ускорението.

Геометричен смисъл на производната:



Нека разгледаме функция, дефинирана в $[a, b]$ и нека $a \leq x_0 < x_1 \leq b$. Да разгледаме точките $(x_0, f(x_0))$ и $(x_1, f(x_1))$ от графиката на функцията и през тях прекараме права. Тя има уравнение

$$y = f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} (x - x_0)$$

Частното $\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$ е равно на тангенса на ъгъла, който правата сключва с Ox^+ .

Оставяйки x_1 да клони към x_0 получаваме, че този коефициент клони към производната на функцията в точка x_0 , а геометрично правата, която построихме „клони“ към допирателната към графиката на функцията в точката $(x_0, f(x_0))$.

3.

Теорема 3.1.

Тема 4

Нека f, g са диференцируеми в отворен интервал, съдържащ т. x_0 . Тогава

$$3.1.1 (f \pm g)'(x_0) = f'(x_0) \pm g'(x_0)$$

$$3.1.2 (f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0)$$

$$3.1.3 \text{ Ако } g(x) \neq 0 \text{ близо до } x_0. \left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}$$

$$3.1.4 (f \circ g)'(x_0) = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

Доказателство:

3.1.1:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(f \pm g)(x) - (f \pm g)(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \pm \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) \pm g'(x_0)$$

3.1.2:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(f \cdot g)(x) - (f \cdot g)(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{[(f \cdot g)(x) - f(x_0) \cdot g(x)] + [f(x_0)g(x) - (f \cdot g)(x_0)]}{x - x_0} = \dot{}$$

$$\dot{=} \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + f(x_0) \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$$

3.1.3:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\frac{f}{g}(x) - \frac{f}{g}(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\frac{f(x)g(x_0) - f(x_0)g(x)}{g(x)g(x_0)}}{x - x_0} = \dot{}$$

$$\dot{=} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{[f(x)g(x_0) - f(x_0)g(x_0)] + [f(x_0)g(x_0) - f(x_0)g(x)]}{x - x_0} = \dot{}$$

$$\dot{=} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)g(x_0)}{g(x)g(x_0)} = \dot{}$$

$$\dot{=} \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x_0) \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)g(x_0)} = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}$$

3.1.4:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(g(x)) - f(g(x_0))}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(g(x)) - f(g(x_0))}{g(x) - g(x_0)} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = \dot{}$$

Тема 4

$$\lim_{y \rightarrow y_0} f(y) - f(y_0) \stackrel{!}{=} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = f'(g(x_0)) g'(x_0)$$

(Тук използваме непрекъснатостта на $g(x)$, която е следствие от диференцируемостта и.
Забележка: Навсякъде в доказателствата използвахме свойствата на границите, а именно, че граница от сума/разлика/произведение/частно е сума/разлика/произведение/частно от граници.

Теорема 3.2. В сила са следните равенства

$$3.2.1 \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}, \quad x > 0$$

$$3.2.2 \quad (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}, \quad x > 0$$

$$3.2.3 \quad (e^x)' = e^x$$

$$3.2.4 \quad (\sin x)' = \cos x$$

$$3.2.5 \quad (\cos x)' = -\sin x$$

Доказателство:

3.2.1.

$$\ln'(x_0) = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} \ln(x) - \ln(x_0)}{x - x_0} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} \ln\left(1 + \frac{x - x_0}{x_0}\right)}{x - x_0} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} \ln\left(1 + \frac{x - x_0}{x_0}\right)}{\frac{x - x_0}{x_0} \cdot x_0} = \frac{1}{x_0}$$

3.2.2.

$$(\log_a(x_0))' = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} \log_a(x) - \log_a(x_0)}{x - x_0} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} \log_a\left(\frac{x}{x_0}\right)}{x - x_0} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln\left(\frac{x}{x_0}\right)}{\ln a}}{x - x_0} = \frac{1}{\ln a} \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} \ln(x) - \ln(x_0)}{x - x_0} \stackrel{3.2.1}{=} \frac{1}{x_0 \ln a}$$

3.2.3 Използваме правилото за диференциране на сложна функция.

$$x = \ln e^x \quad \vee \quad \frac{d}{dx} \ln e^x \leftrightarrow 1 = \frac{1}{e^x} \cdot (e^x)' \leftrightarrow (e^x)' = e^x$$

3.2.4

Тема 4

$$\sin'(x_0) = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} \sin(x) - \sin(x_0)}{x - x_0} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} 2 \sin \frac{(x-x_0)}{2} \cos \frac{(x+x_0)}{2}}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \cos \frac{(x+x_0)}{2} \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} \sin \frac{(x-x_0)}{2}}{\frac{x-x_0}{2}} = \cos(x_0)$$

3.2.5 $\cos'(x_0) = \sin'(\frac{\pi}{2} - x_0) \stackrel{\text{сложна функция}}{=} \cos(\frac{\pi}{2} - x_0)(-1) = -\sin(x_0)$

Теорема 3.3. Нека $y=f(x)$ е непрекъснато- диференцируема в околност на x_0 . Нека обратната и в тази околност е $x=f^{-1}(y)$ и $y_0=f(x_0)$. Тогава за производната на обратната функция на y имаме

$$(f^{-1}(y_0))' = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))} = \frac{1}{f'(x_0)}$$

Доказателство:

От обратимостта имаме, че $x = f(f^{-1}(x))$. Диференцираме това равенство в т. x_0 , прилагайки правилото за диференциране на обратна функция.

Следствие(Пример):

$$x \in (-1,1) \rightarrow (\arcsin(x))' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Наистина, $\sin(\arcsin(x)) = x$. По теорема 3.3

$$(\arcsin(x))' = \frac{1}{\cos(\arcsin(x))} = \frac{1}{\sqrt{1-(\sin(\arcsin(x)))^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

4.

Дефиниция 4.1 Нека $f: \Delta \rightarrow R$. Казваме, че функцията $F: \Delta \rightarrow R$ е примитивна на f , ако $F'(x)=f(x)$.

Теорема 4.1. Нека $f: \Delta \rightarrow R$. Нека $F: \Delta \rightarrow R$ е примитивна на f , тогава

4.1.1 Функцията $F+C$ също е примитивна за f (C е произволна реална константа).

4.1.2 Обратното, ако Φ е някаква примитивна за f , то съществува константа C , че $\Phi = F+C$.

Доказателство:

4.1.1 Нека C е константа. Понеже производна от константа е 0, то $(F+C)' = F' + 0 = f$.

4.1.2 Да разгледаме $\Psi = \Phi - F \rightarrow \Psi' = \Phi' - F' = f - f = 0$. Но тогава $\Psi = C$.

Тема 4

Дефиниция 4.2 Изразът $F(x)+C$, където F е примитивна на f в Δ , ще наричаме неопределен интеграл на f в Δ и ще бележим с нотацията

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

Забележка: В темата е доказана първо формулата за производна на логаритъм, а после експонента, не както в анотацията.

Литература:

- [1] Математически анализ, Дойчинов
- [2] Диференциално и интегрално смятане. Функции на една променлива
- [3] Записки от лекциите по ДИС1 ,спец. ПМ, на Людмила Николова

Темата е разработена от Велико Дончев, уч. 2011/2012 г.