



СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
„БАКАЛАВЪР“
СПЕЦИАЛНОСТ „СТАТИСТИКА“

7 септември 2022 г.

Задача 1. Нека $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ е стандартният базис в евклидовото пространство \mathbb{R}^3 и $\varphi \in Hom(\mathbb{R}^3)$ е линеен оператор, действащ по правилото:

$$\varphi(\xi_1 \mathbf{e}_1 + \xi_2 \mathbf{e}_2 + \xi_3 \mathbf{e}_3) = (-3\xi_1 - 4\xi_2 - 2\xi_3)\mathbf{e}_1 + (-4\xi_1 - 3\xi_2 - 2\xi_3)\mathbf{e}_2 + (-2\xi_1 - 2\xi_2)\mathbf{e}_3$$

- Да се намери матрицата A на оператора φ в този базис;
- Да се намери ортонормиран базис от собствени вектори $\mathbf{v} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ на \mathbb{R}^3 , в който матрицата D на линейния оператор φ е диагонална;
- Да се напише матрицата на прехода $T_{e \rightarrow v}$ и диагоналната матрица D на оператора φ ;
- Да се пресметне A^n ;
- Нека B е симетрична матрица с реални елементи (т.e. $B \in M_n(\mathbb{R})$), за която $B^3 + B = 0$. Докажете, че следата на B е равна на 0, т.e. $\text{tr } B = 0$. (Следата на квадратна матрица е равна на сумата от елементите по главния ѝ диагонал).

Задача 2. **Задача 2.** В равнината е въведена декартова координатна система и е даден ромб $ABCD$, чиито диагонали (AC и BD) се пресичат в точка $M(1, 6)$. Точките $P(3, 0)$, $Q(6, 6)$ и $R(5, 9)$ лежат съответно върху правите AB , BC и CD . Да се намерят координатите на точките P' , Q' и R' – симетрични, относно точката M съответно на точките P , Q и R , както и уравненията на страните на робма.

Задача 3. Нека X_1, X_2, \dots, X_n са независими наблюдения над експоненциално разпределена сл.в. $X \in Ex(\frac{1}{\theta})$ с плътност

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

където $\theta > 0$ е неизвестен параметър.

- Намерете максимално правдоподобна оценка за θ .
- Намерете ефективна оценка за математическото очакване EX и дисперсията на оценката.
- Докажете, че разпределението на първата порядкова статистика $X_{(1)} = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$ също е експоненциално с параметър $\frac{n}{\theta}$.
- Докажете, че $\hat{\theta} = nX_{(1)}$ е неизместена оценка за θ .

Време за работа 3 часа.

Оценяват се двете най-добре решени задачи!
Изпитната комисия ви пожелава успешна работа!