

# 1. Изследване на функция и построяване на графика.

(Примерна и незадължителна схема)

## 1. Дефиниционно множество.

Представяме  $DM$  като крайно обединение на интервали.

## 2. Симетрии в графиката на функцията.

Тук проверяваме дали:

a)  $f(-x) = f(x) \quad \forall x \in DM$ . Тогава имаме четна функция или от геометрична гледна точка осева симетрия.

b)  $f(-x) = -f(x) \quad \forall x \in DM$ . Тогава имаме нечетна функция или от геометрична гледна точка централна симетрия.

c)  $\exists T > 0; f(x+T) = f(x) \quad \forall x \in DM$ . Тогава имаме периодична функция или от геометрична гледна точка трансляция.

## 3. Знак на $f(x)$ .

Тук изследваме разположението на графиката относно координатните оси и евентуалните пресечни точки с тях.

## 4. Поведение на функцията в краищата на интервалите на дефиниционното множество.

Тези изследвания включват и намирането на:

a) Вертикални асимптоти: Ако например  $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = +\infty$ , то имаме лява вертикална асимптота  $x = a$ .

b) Хоризонтални асимптоти: Ако например  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a; |a| < \infty$ , то имаме хоризонтална асимптота  $y = a$ .

c) Наклонени асимптоти: Ако например  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

и съществуват границите:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = k$  и  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - kx = n$ ,

то имаме наклонена асимптота  $y = kx + n$ .

## 5. Знак на $f'(x)$ .

Тук определяме интервалите на растене и намаляване на функцията. Точките в които функцията е непрекъсната и имаме смяна на знака на производната са точки на локален екстремум. Желателно е да знаем кои са допирателните (евентуално различни) отляво и отдясно в такива точки.

## 6. Знак на $f''(x)$ .

Тук определяме интервалите на вдлъбнатост и изпъкналост на функцията. Точките в които функцията е непрекъсната и имаме смяна на знака на втората производна са инфлексни точки. Желателно е да знаем кои са допирателните (евентуално различни) отляво и отдясно в такива точки.

### Полезни съвети:

1. Използвайте работен чертеж и нанасяйте цялата информация която имате до момента на него!

2. В точки 3), 5) и 6) използвайте числова ос и нанасяйте отгоре информацията за знака, а отдолу съответната информация за функцията!

3. Проверявайте за противоречия между информацията от различните точки !

## II. Неопределени интеграли.

### 1. Таблични интеграли.

$$1) \int x^\alpha dx = \begin{cases} \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c & \alpha \neq -1; \\ \ln|x| + c & \alpha = -1. \end{cases}$$

$$2) \int e^x dx = e^x + c, \quad \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c \quad (0 < a \neq 1).$$

$$3) \int \sin x dx = -\cos x + c, \quad \int \operatorname{sh} x dx = \operatorname{ch} x + c.$$

$$4) \int \cos x dx = \sin x + c, \quad \int \operatorname{ch} x dx = \operatorname{sh} x + c.$$

$$5) \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \operatorname{tg} x + c, \quad \int \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x} dx = \operatorname{th} x + c.$$

$$6) \int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\operatorname{ctg} x + c, \quad \int \frac{1}{\operatorname{sh}^2 x} dx = \operatorname{cth} x + c.$$

$$7) \int \frac{1}{1+x^2} dx = \begin{cases} \operatorname{arctg} x + c; \\ -\operatorname{arcctg} x + c. \end{cases}$$

$$\text{Ако } a \neq 0 \quad \int \frac{1}{a^2+x^2} dx = \begin{cases} \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + c; \\ -\frac{1}{a} \operatorname{arcctg} \frac{x}{a} + c. \end{cases}$$

$$8) \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \begin{cases} \operatorname{arcsin} x + c; \\ -\operatorname{arccos} x + c. \end{cases}$$

$$\text{Ако } a \neq 0 \quad \int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \begin{cases} \operatorname{arcsin} \frac{x}{a} + c; \\ -\operatorname{arccos} \frac{x}{a} + c. \end{cases}$$

$$9) \text{ Ако } a \neq 0 \quad \int \frac{1}{\sqrt{x^2+a}} dx = \ln \left| x + \sqrt{x^2+a} \right| + c.$$

**2. Интегриране чрез "непосредствено внасяне под знака на диференциала".**

$$\text{Ако } \int \varphi(y) dy = \Phi(y) + c, \quad \text{то } \int \varphi(g(x)) g'(x) dx = \Phi(g(x)) + c.$$

**3. Интегриране чрез субституции.**

Нека  $\varphi(y)$  е диференцуема, като  $\varphi'(y)$  е с постоянен знак,  $\phi(x)$  е нейната обратна функция. В интеграла  $\int f(x) dx$  извършваме смяна:  $x = \varphi(y)$ .

$$\text{Имаме } \int f(x) dx = \int f(\varphi(y)) \varphi'(y) dy.$$

Тогава, ако  $\Phi(y)$  е примитивната на функцията  $f(\varphi(y)) \varphi'(y)$ , то

$$\int f(x) dx = \Phi(\phi(x)).$$

#### 4. Интегриране "по части".

1) Правило:

$$\begin{aligned}\int f(x)g'(x) dx &= \int f(x)dg(x) = f(x)g(x) - \int g(x)df(x) \\ &= \int g(x)f'(x) dx.\end{aligned}$$

2) Приложения:

a) Ако  $P(x)$  е алгебричен полином, а  $f$  е някоя от  $\{e^{ax+b}; \sin(ax+b); \cos(ax+b)\}$ , където  $a, b \in \mathbb{R}$ , то

$$\begin{aligned}\int P(x)f(x) dx &= \int P(x)dF(x) = P(x)F(x) - \int F(x)dP(x) \\ &= \int F(x)P'(x) dx,\end{aligned}$$

където  $F(x)$  е примитивна на  $f(x)$ .

b) Ако  $P(x)$  е алгебричен полином (може и за някои рационални функции), а  $f$  е някоя от  $\{\ln(ax+b); \arcsin(ax+b); \operatorname{arctg}(ax+b)\}$  където  $a, b \in \mathbb{R}$ , то

$$\int P(x)f(x) dx = \int f(x)dQ(x) = f(x)Q(x) - \int Q(x)df(x) = \int Q(x)f'(x) dx,$$

където  $Q(x)$  е примитивна на  $P(x)$ .

c) Пресмятане чрез получаване на подходящи рекурентни формули:  
c<sub>1</sub>) "Четиринадесетхилядник:"

$$\begin{aligned}I_n(x) &= \int \frac{1}{(1+x^2)^n} dx = \int \frac{1+x^2-x^2}{(1+x^2)^n} dx = I_{n-1}(x) - \int \frac{x^2}{(1+x^2)^n} dx = \\ &= I_{n-1}(x) - \frac{1}{2(n-1)} \int x d\left(\frac{1}{(1+x^2)^{n-1}}\right) = \\ &= I_{n-1}(x) + \frac{1}{2(n-1)} \left(\frac{x}{(1+x^2)^{n-1}} - I_{n-1}(x)\right) = \\ &= \frac{1}{2(n-1)} \frac{x}{(1+x^2)^{n-1}} - \frac{2n-3}{2(n-1)} I_{n-1}(x).\end{aligned}$$

c<sub>2</sub>) Интегралите от произведение на степени на  $\sin x$  и  $\cos x$ :

Нека  $m, n \in \mathbf{Z}$ . Тогава:

$$S_n(x) = \int \sin^n x dx = -\frac{1}{n} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n-1}{n} S_{n-2}(x); \quad n \neq 0;$$

$$S_n(x) = \int \sin^n x dx = \frac{1}{n+1} \sin^{n+1} x \cos x + \frac{n+2}{n+1} S_{n+2}(x); \quad n \neq -1;$$

$$C_n(x) = \int \cos^n x dx = \frac{1}{n} \sin x \cos^{n-1} x + \frac{n-1}{n} C_{n-2}(x); \quad n \neq 0;$$

$$C_n(x) = \int \cos^n x dx = -\frac{1}{n+1} \sin x \cos^{n+1} x + \frac{n+2}{n+1} C_{n+2}(x); \quad n \neq -1;$$

$$SC_{n,m}(x) = \int \sin^n x \cos^m x dx = \frac{1}{n+1} \sin^{n+1} x \cos^{m-1} x + \frac{m-1}{n+1} SC_{n+2,m-2}(x),$$

за  $n \neq -1$ ;

$$SC_{n,m}(x) = \int \sin^n x \cos^m x dx = -\frac{1}{m+1} \sin^{n-1} x \cos^{m+1} x + \frac{n-1}{m+1} SC_{n-2,m+2}(x),$$

за  $m \neq -1$ .

d) Пресмятане чрез получаване на подходящи рекурсивни формули:

При интегралите  $\int \sqrt{1-x^2} dx$  и  $\int \sqrt{x^2 \pm 1} dx$ , както и за интегралите от произведение на две функции от множеството в приложение а).

## 5. Интегриране на рационални функции

Ако рационалната функция е неправилна, то тя трябва да бъде представена като сума на полином и правилна рационална функция. Всяка правилна рационална функция се представя като сума на елементарни рационални функции.

1) Директен метод:

Нека

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x)}{\prod_{i=1}^n (x-x_i)^{\nu_i} \prod_{j=1}^m (x^2 + b_j x + c_j)^{\mu_j}},$$

където  $b_j^2 - 4c_j < 0 \forall j = 1, \dots, m$ .

Тук  $\deg Q = N = \sum_{i=1}^n \nu_i + 2 \sum_{j=1}^m \mu_j$ ,  $\deg P \leq N - 1$ . Тогава:

$$R(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{l=1}^{\nu_i} \frac{A_{il}}{(x - x_i)^l} + \sum_{j=1}^m \sum_{s=1}^{\mu_j} \frac{B_{js}x + C_{js}}{(x^2 + b_jx + c_j)^s},$$

където  $\{A_{il}\}_{i=1, l=1}^n, \nu_i$ ,  $\{B_{js}\}_{j=1, s=1}^m, \mu_j$  и  $\{C_{js}\}_{j=1, s=1}^m, \mu_j$  са неизвестни коефициенти, които се получават по метода на неопределените коефициенти след привеждане към общ знаменател в дясната страна на горното равенство. Това е линейна система от  $N$  уравнения с  $N$  неизвестни. От Линейната алгебра е известно, че тази система има единствено решение.

2) Комбиниран метод от метода на Остроградски-Ермит и метода на заместването:

Метод на Остроградски-Ермит: Представяме

$$(O - E) \int R(x) dx = \frac{P_1(x)}{Q_1(x)} + \int \frac{P_2(x)}{Q_2(x)} dx,$$

$$\text{където } Q_2(x) = \prod_{i=1}^n (x - x_i) \cdot \prod_{j=1}^m (x^2 + b_jx + c_j),$$

$Q_1(x) = \frac{Q(x)}{Q_2(x)}$ , а полиномите  $P_1$  и  $P_2$  са с неизвестни коефициенти и такива, че  $\deg P_1 = \deg Q_1 - 1$  и  $\deg P_2 = \deg Q_2 - 1$ . Коефициентите се получават след диференциране на  $(O - E)$ , привеждане към общ знаменател в дясната страна и решаване на линейна система.

Метод на заместването:

За пресмятане на интеграли от вида  $\int \frac{P_2(x)}{Q_2(x)} dx$ , като този в дясната страна на метода Остроградски-Ермит, където

$$Q_2(x) = \prod_{i=1}^n (x - x_i) \cdot \prod_{j=1}^m (x - z_j)(x - \bar{z}_j), \quad z_j, \bar{z}_j \in \mathbb{C}.$$

Представяме

$$\frac{P_2(x)}{Q_2(x)} = \sum_{i=1}^n \frac{A_i}{x - x_i} + \sum_{j=1}^m \frac{M_j}{x - z_j} + \sum_{j=1}^m \frac{\bar{M}_j}{x - \bar{z}_j},$$

където:

$$A_i = F_i(x_i), F_i(x) = (x - x_i) \frac{P_2(x)}{Q_2(x)} \text{ и } M_j = G_j(z_j), G_j(x) = (x - z_j) \frac{P_2(x)}{Q_2(x)}.$$

След като се намерят неизвестните коефициенти остава да се сумират  $\frac{M_j}{x-z_j} + \frac{\bar{M}_j}{x-\bar{z}_j}$  във вида:  $\frac{B_j x + C_j}{x^2 + b_j x + c_j}$ . Това за всяко  $j = 1, \dots, m$ .

## 6. Интегриране на ирационални функции

1) Нека  $R(x_1, x_2, \dots, x_{n+1})$  е рационална функция на  $n + 1$  променливи. Разглеждаме интегралите от вида

$$\int R \left( x, \left( \frac{ax + b}{cx + d} \right)^{\frac{p_1}{q_1}}, \left( \frac{ax + b}{cx + d} \right)^{\frac{p_2}{q_2}}, \dots, \left( \frac{ax + b}{cx + d} \right)^{\frac{p_n}{q_n}} \right),$$

където  $q_1, q_2, \dots, q_n$  са цели и положителни,  $p_1, p_2, \dots, p_n \in \mathbf{Z}$ ,  $a, b, c, d \in \mathbf{R}$ ;  $ad - bc \neq 0$ .

Извършваме субституцията:  $\frac{ax + b}{cx + d} = t^{\text{НОК}\{q_1, q_2, \dots, q_n\}}$ .

2) Интегралите от диференциален бином.

Разглеждаме интегралите от вида

$\int x^m (ax^n + b)^p dx$ , където  $a, b \in \mathbf{R}$ ;  $a \neq 0$  и  $p, q, r \in \mathbf{Q}$ . Този интеграл се свежда до интеграл от рационална функция само в следните три случая:

а)  $p \in \mathbf{Z}$ . Това е задача от предната точка.

б)  $\frac{m+1}{n} \in \mathbf{Z}$ . Тогава полагаме  $ax^n + b = t^k$ , където  $k$  е знаменателят на  $p$ .

в)  $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbf{Z}$ . Тогава преобразуваме

$$\int x^m (ax^n + b)^p dx = \int x^{m+np} (a + bx^{-n})^p dx \text{ и имаме случай б).}$$

3) Субституции на Л. Ойлер.

Разглеждаме интегралите от вида

$$\int R \left( x, \sqrt{ax^2 + bx + c} \right) dx,$$

където  $a \neq 0$  и  $b^2 - 4ac \neq 0$ . Този интеграл се свежда до интеграл от рационална функция по следните три начина:

- а)  $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm\sqrt{ax} \pm t$ , ако  $a > 0$ .  
 б)  $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm xt \pm \sqrt{c}$ , ако  $c > 0$ .  
 в)  $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm(x - x_i)t$ , ако  $b^2 - 4ac > 0$  и  $x_i$  е някоя от нулите на квадратния тричлен.

## 7. Интегриране на рационални функции на $\sin x$ и $\cos x$ .

1) Нека  $R(x_1, x_2)$  е рационална функция на две променливи. Разглеждаме интеграли от вида  $\int R(\sin x, \cos x) dx$ . С помощта на субституции свеждаме до интеграл от рационална функция на новата променлива.

а) Универсална тригонометрична субституция:  $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$ .

Тогава:  $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$ ,  $\cos x = \frac{1-x^2}{1+x^2}$  и  $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$ .

В следните три случая може да се използват и субституциите:

б) Ако  $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$ , полагаме  $t = \cos x$ .

в) Ако  $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$ , полагаме  $t = \sin x$ .

г) Ако  $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$ , полагаме  $t = \operatorname{tg} x$ .