

Елементи на Делонé: Лема 6

Лема 6. Декартовите координати на $J^*(x_1, x_2, x_3)$ се изразяват чрез шесте елиптични елемента $(a, e, i, l, g + \theta, \theta)$ по формулата

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos i & -\sin i \\ 0 & \sin i & \cos i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos g & -\sin g & 0 \\ \sin g & \cos g & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a(\cos u - e) \\ a\sqrt{1-e^2}\sin u \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \cos i & \sin \theta \sin i \\ \sin \theta & \cos \theta \cos i & -\cos \theta \sin i \\ 0 & \sin i & \cos i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos g & -\sin g & 0 \\ \sin g & \cos g & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a(\cos u - e) \\ a\sqrt{1-e^2}\sin u \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos \theta \cos g - \sin \theta \cos i \sin g & -\cos \theta \sin g - \sin \theta \cos i \cos g & \sin \theta \sin i \\ \sin \theta \cos g + \cos \theta \cos i \sin g & -\sin \theta \sin g + \cos \theta \cos i \cos g & -\cos \theta \sin i \\ \sin i \sin g & \sin i \cos g & \cos i \end{pmatrix} \times \\ &\quad \times \begin{pmatrix} a(\cos u - e) \\ a\sqrt{1-e^2}\sin u \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

По координатно,

$$\begin{aligned} x_1 &= a(\cos u - e)(\cos \theta \cos g - \sin \theta \cos i \sin g) - a\sqrt{1-e^2}\sin u (\cos \theta \sin g - \cos \theta \cos i \cos g) \\ x_2 &= a(\cos u - e)(\sin \theta \cos g + \cos \theta \cos i \sin g) - a\sqrt{1-e^2}\sin u (\sin \theta \sin g - \cos \theta \cos i \cos g) \\ x_3 &= a(\cos u - e) \sin i \sin g + a\sqrt{1-e^2}\sin u \sin i \cos g. \end{aligned}$$

Доказателство. Ако $\theta = 0$ то

$$\begin{aligned} x_1 &= r \cos \psi, \\ x_2 &= r \sin \psi \cos i, \\ x_3 &= r \sin \psi \sin i. \end{aligned}$$

За $\theta \neq 0$ трябва да завъртим равнината на ъгъл θ , а от тук следва

$$\begin{aligned} x_1 &= r \cos \psi \cos \theta - r \sin \psi \cos i \sin \theta, \\ x_2 &= r \cos \psi \sin \theta + r \sin \psi \cos i \cos \theta, \\ x_3 &= r \sin \psi \sin i. \end{aligned}$$

В Лема 5 доказвахме, че $g = \psi - v$, т. е.

$$\psi = g + v,$$

както и

$$\begin{aligned} r \cos v &= a(\cos u - e) \\ r \sin v &= a\sqrt{1 - e^2} \sin u. \end{aligned}$$

Използвайки горните формули, пресмятаме

$$\begin{aligned} x_1 &= r \cos(g + v) \cos \theta - r \sin(g + v) \cos i \sin \theta \\ &= r(\cos g \cos v - \sin g \sin v) \cos \theta - r(\sin g \cos v + \cos g \sin v) \cos i \sin \theta \\ &= r \cos v \cos g - r \sin v \sin g \cos \theta - r \cos v \sin g \cos i \sin \theta - r \sin v \cos g \cos i \sin \theta \\ &= a(\cos u - e) \cos g \cos \theta - a\sqrt{1 - e^2} \sin u \sin g \cos \theta \\ &\quad - a(\cos u - e) \sin g \cos i \sin \theta - a\sqrt{1 - e^2} \sin u (\sin g \cos \theta + \cos g \cos i \sin \theta) \\ &= a(\cos u - e)(\cos g \cos \theta - \sin g \cos i \cos \theta) \\ &\quad - a\sqrt{1 - e^2} \sin u (\sin g \cos \theta + \cos g \cos i \sin \theta). \end{aligned}$$

Аналогично,

$$\begin{aligned} x_2 &= r \cos(g + v) \sin \theta + r \sin(g + v) \cos i \cos \theta \\ &= a(\cos u - e)(\cos g \sin \theta + \sin g \cos \theta \cos i) \\ &\quad + a\sqrt{1 - e^2} \sin u (-\sin g \sin \theta + \cos g \cos \theta \cos i), \\ x_3 &= r \sin(g + v) \sin i \\ &= a(\cos u - e) \sin g \sin i + a\sqrt{1 - e^2} \sin u \cos g \sin i. \end{aligned}$$

Лема 6 е доказана.

Ивета Момчилова, *ivetkata@abv.bg*
 Цветомира Димитрова, *cucihi@mail.bg*
 Неделчо Иванов